

1001 QUESTÕES DE ENFERMAGEM

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS



NÃO PERCA MAIS TEMPO PROCURANDO QUESTÕES

Questões para você responder em formato de simulado
Questões separadas por assunto
Gabarito de todas as questões

EnfConcursos

1001 QUESTÕES DE ENFERMAGEM

QUESTÕES APLICADAS EM
CONCURSOS NOS ÚLTIMOS
4 ANOS



2019

OLÁ, FAMÍLIA!

Parabéns por ter adquirido esse livro de questões específicas de Enfermagem para EBSERH.

Ele tem o objetivo de te economizar um dos recursos mais importante no processo de preparação: TEMPO!

A resolução de questões e simulados é **EXTREMAMENTE** importante no seu processo de preparação. O ideal é que essas questões estejam separadas por disciplina e estejam distribuídas por todo o conteúdo como nesse livro.

Neste livro, você tem acesso às questões e ao gabarito. Se você é aluno do curso completo, **UM DIFERENCIAL: TODAS AS QUESTÕES** serão comentadas em vídeo por nossos professores!

Se você não é aluno, quero te dar um **desconto** na aquisição utilizando o link abaixo:

<http://enfconcursos.com/l/livro-ebserh>

Agora vem a grande dica! Aquilo que diferencia os aprovados. Quando estiver conferindo o gabarito, marque o seu desempenho/impressão em cada questão. Siga a seguinte regra:

- Tenho domínio do assunto: se você domina o assunto e a maior parte das questões;
- Reler/Rever o comentário: se, apesar de ter resolvido corretamente, precisar fixar algum ponto;
- Refazer essa questão: se você precisa re-estudar o assunto e voltar à questão;
- Encontrei dificuldade para responder: se você não sabia como responder ou não estudou este assunto.



- TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO
- REFAZER ESSA QUESTÃO
- RELER O COMENTÁRIO
- ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Isso vai dar a você uma ideia do que já sabe e o que precisa melhorar em cada disciplina!

Sucesso! E bons estudos.

Vamos pra Cima!



GEDA VALENTIM

"Editor Chefe e Coach para Concursos de Enfermagem"



SÚMARIO

Disciplinas:

Diabetes Mellitus.....	1	Doenças Infecciosas e parasitárias.....	160
Saúde da Mulher.....	2	Administração em Enfermagem.....	166
Legislação de Enfermagem.....	8	Atenção Básica e Saúde da Família.....	169
Saúde da Criança e do Adolescente.....	14	Cuidados de Enfermagem.....	173
Enfermagem em Centro Cirúrgico.....	23	Bioética.....	176
Doenças Crônicas Não Transmissíveis.....	31	Exames Laboratoriais.....	178
Legislação em Saúde.....	38	Teorias da Enfermagem.....	181
Urgência e emergência.....	47	Assistência de Enfermagem no Processo	
Enfermagem e Saúde do Trabalhador.....	55	Nutricional.....	183
Administração de medicamentos.....	64	Anatomia.....	186
Imunização.....	71	Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de	
Processo de Enfermagem e Sistematização da		Saúde.....	187
Assistência de Enfermagem.....	80	Saúde do Idoso.....	190
Enfermagem em UTI.....	90	Assistência com Animais.....	193
Fundamentos e Procedimentos de		Assistência de Enfermagem a Queimaduras..	194
Enfermagem.....	97	Clínica Médica.....	195
Auditoria e Gestão de Qualidade em		Gabarito.....	199
Enfermagem.....	105		
Enfermagem em Oncologia.....	114		
Epidemiologia e Vigilância Epidemiológica.....	120		
Farmacologia.....	125		
Saúde Mental.....	131		
Fisiologia.....	137		
Enfermagem em Central de Material			
Esterilizado.....	143		
Infecção Hospitalar.....	148		
Assistência de Enfermagem em Feridas e			
Curativos.....	155		



Diabetes Mellitus

1. (2015/ CESPE)

Julgue o item a seguir com relação a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes melito (DM).

O diagnóstico de HAS é definido quando, em pelo menos três aferições de pressão arterial realizadas em um intervalo mínimo de uma semana entre cada medida, a média aritmética é maior ou igual a 140 mmHg × 90 mmHg.

- b) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

2. (2015/ CESPE)

Julgue o item a seguir com relação a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes melito (DM).

A HAS em pacientes jovens está diretamente relacionada à história familiar de acidente vascular encefálico, doença arterial coronariana prematura (homens com idade abaixo de cinquenta e cinco anos e mulheres de até sessenta e cinco anos de idade) e morte prematura e súbita de familiares próximos.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

3. (2018/ CESPE/ EBSERH)

A respeito do SUS e do papel do enfermeiro na vigilância em saúde, julgue o item seguinte.

A prevalência de diabetes e hipertensão arterial está aumentando paralelamente ao aumento do excesso de peso da população; por isso, a assistência de enfermagem deve ter como objetivo a intervenção sobre as mudanças desfavoráveis na dieta e na atividade física das pessoas.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

4. (2016/ CESPE)

Julgue o próximo item, relativo à assistência de enfermagem a pacientes com alterações das funções cardiovascular e circulatória.

Na primeira avaliação de um paciente hipertenso, devem ser feitas aferições da pressão arterial em ambos os braços e, em caso de diferença, deve-se utilizar como referência para as aferições subsequentes o braço com o maior valor.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

5. (2019/ CEPUERJ/ UERJ)

Um grupo de familiares chegou à UBS para verificar a pressão arterial (PA), já que um parente em comum faleceu devido a um acidente vascular cerebral. Os profissionais da saúde têm papel primordial nas estratégias de prevenção, diagnóstico, monitorização e controle da hipertensão arterial. Na atenção básica de saúde, entre as ações que os técnicos de enfermagem realizam como parte integrante da equipe, inclui-se o(a):

a) verificação da PA limítrofe como um procedimento fundamental, pois tem o objetivo de trabalhar o processo de educação em saúde para a prevenção primária da doença e prescrever adoção de hábitos saudáveis de vida.

b) rastreamento da hipertensão arterial em todo adulto com 18 anos ou mais e registro no prontuário e, se não tiver ocorrido ao menos uma verificação da PA nos últimos dois anos, esta deverá ser verificada e registrada.

c) rastreamento da hipertensão arterial em todo adulto a partir dos 30 anos e registro no prontuário e, se não tiver ocorrido ao menos uma verificação da PA nos últimos dois anos, esta deverá ser verificada e registrada.

d) verificação da PA como um procedimento fundamental, pois tem o objetivo de trabalhar o processo de educação em saúde e avaliar e estratificar o risco para doenças cardiovasculares.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

6. (2013/ CESPE)

Julgue os itens subsequentes, relativos a cuidados, procedimentos e situações clínicas.

Os pacientes com diabetes mellito do tipo I devem ser orientados quanto à realização de atividade física por, no máximo, duas vezes na semana, à utilização de calçados fechados, à redução de carboidratos na alimentação e ao controle semanal da glicemia de jejum.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Saúde da Mulher

7. (CESPE/2018/EBSERH)

Paula, com vinte e seis anos de idade, compareceu a unidade básica de saúde com queixa de amenorreia havia cerca de vinte dias, mas não tinha certeza da data da última menstruação. Nessa oportunidade, ela informou ter vida sexual ativa, fazer uso de anticoncepcional oral de forma irregular e nunca ter engravidado.

Acerca desse caso clínico, julgue o item que segue. Nesse caso, é indicado o teste rápido de gravidez.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

8. (CESPE/2018/EBSERH)

Paula, com vinte e seis anos de idade, compareceu a unidade básica de saúde com queixa de amenorreia havia cerca de vinte dias, mas não tinha certeza da data da última menstruação. Nessa oportunidade, ela informou ter vida sexual ativa, fazer uso de anticoncepcional oral de forma irregular e nunca ter engravidado. Acerca desse caso clínico, julgue o item que segue. Paula deverá receber, com antecedência, informações sobre a maternidade, o parto e o direito de escolher um acompanhante, necessariamente mulher, para esse momento.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

9. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca de assuntos relacionados a anatomia e fisiologia da gestação, julgue o próximo item. Um feto normal de vinte semanas (com intervalo de confiança de mais ou menos duas semanas) deve apresentar, entre outros, coração com as quatro câmaras definidas, estômago, rins, bexiga e face com lábios.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

10. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca de assuntos relacionados a anatomia e fisiologia da gestação, julgue o próximo item. Decorridas vinte semanas de gestação, o líquido amniótico consiste, em grande parte, em urina fetal.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

11. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca de assuntos relacionados a anatomia e fisiologia da gestação, julgue o próximo item. Microcefalia fetal pode ser resultado de diabetes gestacional não controlada.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

12. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca de assuntos relacionados a anatomia e fisiologia da gestação, julgue o próximo item. A coléstase obstétrica é uma doença benigna, que não apresenta riscos para o feto.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

13. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca de assuntos relacionados a anatomia e fisiologia da gestação, julgue o próximo item. Os problemas congênitos associados à hepatite B na gestação incluem a hipoplasia de membro.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

14. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item subsequente, concernente à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM). Mulheres podem sofrer, adoecer ou morrer em decorrência de comportamentos associados aos padrões sociais prevalentes de masculinidade e feminilidade.

- c) CERTO
E) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

15. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item subsequente, concernente à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM). A PNAISM prevê atenção diferenciada do Sistema Único de Saúde (SUS) às mulheres em razão de faixas etárias; porém, essa política não prevê atenção especial para a mulher em razão de raça ou etnia.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

16. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca de recomendações de acolhimento em ginecologia e obstetrícia no âmbito do SUS, julgue o item a seguir. Inclui-se na estratégia Rede Cegonha do SUS a atenção a crianças de até vinte e quatro meses de idade.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

17. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca de recomendações de acolhimento em ginecologia e obstetrícia no âmbito do SUS, julgue o item a seguir. A classificação de risco realizada no acolhimento em maternidades deve priorizar o atendimento burocrático, justo e eficaz, por ordem de chegada.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

18. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca de recomendações de acolhimento em ginecologia e obstetrícia no âmbito do SUS, julgue o item a seguir.

Uma recomendação para o acolhimento da usuária e de seus familiares na porta de entrada de um hospital geral dotado de maternidade é que se construa um fluxo de entrada dirigido especificamente para a maternidade.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

19. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca de recomendações de acolhimento em ginecologia e obstetrícia no âmbito do SUS, julgue o item a seguir.

Entre as atribuições dos profissionais envolvidos no acolhimento e na classificação de risco em obstetrícia, é considerado atribuição específica do enfermeiro o preenchimento da ficha de notificação de violência, nos casos em que houver suspeita ou confirmação, de acordo com o protocolo específico.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

20. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito de epidemiologia no contexto da obstetrícia, julgue o item que se segue.

A principal causa de anemia na gravidez é a derivada da deficiência de ferro.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

21. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito de epidemiologia no contexto da obstetrícia, julgue o item que se segue.

Os acidentes vasculares cerebrais são mais raros em mulheres no período pós-parto.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

22. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item seguinte, tendo como referência os protocolos de avaliação clínica em enfermagem obstétrica. A primeira etapa da classificação de risco consiste em verificar a ventilação e a respiração.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

23. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item seguinte, tendo como referência os protocolos de avaliação clínica em enfermagem obstétrica. A classificação de risco das pacientes imunodeprimidas somente será elevada se elas estiverem em trabalho de parto.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

24. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item seguinte, tendo como referência os protocolos de avaliação clínica em enfermagem obstétrica.

Vítima de violência física e sexual, com dor abdominal ou perda de líquido ou de sangue via vaginal, se não apresentar condições que a classifiquem como vermelho, será classificada como laranja.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

25. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item seguinte, tendo como referência os protocolos de avaliação clínica em enfermagem obstétrica.

O protocolo de avaliação clínica que se refira exclusivamente a parada ou redução de movimentos fetais não inclui condições que elevem a classificação da paciente ao nível vermelho.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

26. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o próximo item, com relação a diagnóstico laboratorial e de imagem no contexto da enfermagem obstétrica.

Os exames de imagem que podem contribuir para o diagnóstico da coléstase obstétrica incluem a ultrassonografia do fígado e da árvore biliar.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	REFAZER ESSA QUESTÃO	RELER O COMENTÁRIO	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

27. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o próximo item, com relação a diagnóstico laboratorial e de imagem no contexto da enfermagem obstétrica. Entre os métodos mais confiáveis para se confirmar tendência de parto prematuro está o teste de fibronectina fetal.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	REFAZER ESSA QUESTÃO	RELER O COMENTÁRIO	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

28. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o próximo item, com relação a diagnóstico laboratorial e de imagem no contexto da enfermagem obstétrica. Os teores de ureia e de creatinina na urina da gestante costumam apresentar-se elevados durante a gravidez normal.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	REFAZER ESSA QUESTÃO	RELER O COMENTÁRIO	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

29. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item subsequente, no que tange a dor e analgesia no parto. Uma das vantagens da analgesia epidural é a possibilidade de contribuir para a redução da secreção de catecolaminas maternas, algo que pode ser positivo para o feto.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	REFAZER ESSA QUESTÃO	RELER O COMENTÁRIO	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

30. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item subsequente, no que tange a dor e analgesia no parto. Consideradas técnicas anestésicas para cirurgias cesarianas, a raquidiana ou espinal é tecnicamente mais complexa ou difícil de realizar que a epidural ou peridural.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	REFAZER ESSA QUESTÃO	RELER O COMENTÁRIO	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

31. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item subsequente, no que tange a dor e analgesia no parto. Informar a gestante de forma adequada sobre o que esperar do parto, isso pode contribuir para reduzir a estressante sensação de perda de controle.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	REFAZER ESSA QUESTÃO	RELER O COMENTÁRIO	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

32. (CESPE/2018/EBSERH)

Em relação aos cuidados mediatos e imediatos do recém-nascido, julgue o item subsequente. O teste de triagem neonatal biológica, conhecido popularmente como teste do pezinho, apresenta em seu escopo várias doenças, que incluem deficiência da biotinidase, hiperplasia adrenal congênita e hipotireoidismo congênito.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	REFAZER ESSA QUESTÃO	RELER O COMENTÁRIO	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

33. (CESPE/2018/EBSERH)

Em relação aos cuidados mediatos e imediatos do recém-nascido, julgue o item subsequente. De acordo com o parâmetro atual preconizado pelo Ministério da Saúde, a coleta do material para o teste do pezinho deve ser feita até o sétimo dia de vida do recém-nascido.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	REFAZER ESSA QUESTÃO	RELER O COMENTÁRIO	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

34. (CESPE/2018/EBSERH)

Em relação aos cuidados mediatos e imediatos do recém-nascido, julgue o item subsequente. A profilaxia da oftalmia neonatal deve ser realizada de rotina nos cuidados com o recém-nascido, sendo a utilização de nitrato de prata a 1% a recomendação ideal segundo as atuais diretrizes nacionais de assistência ao parto normal.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	REFAZER ESSA QUESTÃO	RELER O COMENTÁRIO	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

35. (CESPE/2018/EBSERH)

Em relação aos cuidados mediatos e imediatos do recém-nascido, julgue o item subsequente. Todos os recém-nascidos devem receber vitamina K para a profilaxia da doença metabólica.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

36. (CESPE/2018/EBSERH)

Em relação aos cuidados mediatos e imediatos do recém-nascido, julgue o item subsequente. Durante a recepção do recém-nascido em sala de parto, a frequência respiratória (FR) é o principal parâmetro de indicação de manobras de reanimação, sendo necessária a intubação traqueal quando a FR for inferior a 60 iprm.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

37. (CESPE/2018/EBSERH)

As altas taxas de mortalidade materna representam um desafio à saúde pública no Brasil. Para evitar as mortes, é fundamental o atendimento adequado e ágil às emergências obstétricas. Acerca desse tema, julgue o item seguinte. Apesar de o indicador de mortalidade materna por causas evitáveis continuar elevado, o Brasil atingiu o quinto objetivo de desenvolvimento do milênio, especialmente a meta de reduzir em três quartos a razão de mortalidade materna entre 1990 e 2015.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

38. (CESPE/2018/EBSERH)

As altas taxas de mortalidade materna representam um desafio à saúde pública no Brasil. Para evitar as mortes, é fundamental o atendimento adequado e ágil às emergências obstétricas. Acerca desse tema, julgue o item seguinte. Em urgência ou emergência hipertensiva que requeira hospitalização, além do monitoramento intensivo, faz-se necessária a administração parenteral de anti-hipertensivos — preferencialmente, a metildopa.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

39. (CESPE/2018/EBSERH)

As altas taxas de mortalidade materna representam um desafio à saúde pública no Brasil. Para evitar as mortes, é fundamental o atendimento adequado e ágil às emergências obstétricas. Acerca desse tema, julgue o item seguinte. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a massagem uterina contínua é recomendada como intervenção para prevenir a hemorragia pós-parto em mulheres que tenham recebido ocitocina profilática.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

40. (CESPE/2018/EBSERH)

As altas taxas de mortalidade materna representam um desafio à saúde pública no Brasil. Para evitar as mortes, é fundamental o atendimento adequado e ágil às emergências obstétricas. Acerca desse tema, julgue o item seguinte. A conduta ativa no terceiro período do parto — como, por exemplo, a tração controlada do cordão umbilical, na presença de qualificados profissionais de assistência ao parto — está associada ao menor risco de hemorragia e transfusão sanguínea.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

41. (CESPE/2018/EBSERH)

O projeto *Apice On* — aprimoramento e inovação no cuidado e ensino em obstetrícia e neonatologia — foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 2017, servindo como nova ferramenta para melhoria das condições de vida e saúde integral das mulheres e de seus bebês. Com referência a esse projeto, julgue o item a seguir. Segundo esse projeto, os hospitais de ensino são considerados os mais favoráveis para a promoção de mudanças no ensino, na gestão e nos modelos de atenção.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

42. (CESPE/2018/EBSERH)

O projeto *Apice On* — aprimoramento e inovação no cuidado e ensino em obstetrícia e neonatologia — foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 2017, servindo como nova ferramenta para melhoria das condições de vida e saúde integral das mulheres e de seus bebês. Com referência a esse projeto, julgue o item a seguir. O projeto *Apice On* e a Rede Cegonha apresentam estratégias semelhantes no contexto da mudança de práticas relacionadas ao parto e nascimento; entretanto, possuem necessidades divergentes relativamente à formação de novos profissionais, a partir da prática.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

43. (CESPE/2018/EBSERH)

A atenção em saúde reprodutiva é uma ação básica de saúde e deve levar em consideração o contexto de vida de cada pessoa, e o direito de todos poderem tomar decisões sobre a reprodução sem discriminação, coerção ou violência. Considerando esse assunto, julgue o próximo item, relativo ao planejamento reprodutivo. O termo planejamento reprodutivo pode ser substituído pela expressão controle de natalidade, uma vez que ambos preveem o respeito e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

44. (CESPE/2018/EBSERH)

A atenção em saúde reprodutiva é uma ação básica de saúde e deve levar em consideração o contexto de vida de cada pessoa, e o direito de todos poderem tomar decisões sobre a reprodução sem discriminação, coerção ou violência. Considerando esse assunto, julgue o próximo item, relativo ao planejamento reprodutivo. O anticoncepcional oral combinado não deve ser indicado para mulheres infectadas com o HIV, que tenham AIDS ou estejam em terapia antirretroviral.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

45. (CESPE/2018/EBSERH)

Segundo as recomendações de rotina no pré-natal, julgue o item a seguir. A dose de dTpa deve ser administrada em todas as gestações, independentemente de já ter sido realizada em gestações anteriores.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

46. (CESPE/2018/EBSERH)

O projeto *Apice On* — Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia — foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 2017, servindo como nova ferramenta para melhoria das condições de vida e saúde integral das mulheres e de seus bebês. Com referência a esse projeto, julgue o item a seguir. O objetivo geral do projeto *Apice On* é qualificar os processos de atenção, gestão e formação relativos ao parto, nascimento e abortamento nos hospitais de ensino, incorporando um modelo com práticas fundamentadas em evidências científicas, humanização, segurança e garantia de direitos.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

47. (CESPE/2018/EBSERH)

A atenção em saúde reprodutiva é uma ação básica de saúde e deve levar em consideração o contexto de vida de cada pessoa, e o direito de todos poderem tomar decisões sobre a reprodução sem discriminação, coerção ou violência. Considerando esse assunto, julgue o próximo item, relativo ao planejamento reprodutivo. O DIU de Cobre pode ser inserido até 48 h após o parto ou após a quarta semana pós-parto. Segundo o disposto nas resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, o enfermeiro, após treinamento específico, estará apto a realizar a consulta clínica, prescrever e inserir o DIU.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Ética em Enfermagem

48. (CESPE/ 2018/ EBSERH)

Julgue o item a seguir, utilizando uma análise crítica dos aspectos bioéticos e dilemas relativos ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem. De acordo com o caráter ético das pesquisas, o Código de Ética e Deontologia da Enfermagem permite aos seus membros a participação e realização de pesquisas que ponham em risco a saúde e a integridade do ser humano.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

49. (CESPE/2018/EBSERH)

Considerando as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue o item subsequente. O acesso às informações relacionadas à pessoa, sua família e sua coletividade é necessário ao exercício profissional da enfermagem.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

50. (CESPE/2018/EBSERH)

Considerando as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue o item subsequente.

Devem ser registradas no prontuário do paciente apenas as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, de forma objetiva, cronológica, legível e sem rasuras.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

51. (CESPE/2018/EBSERH)

Considerando as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue o item subsequente. É prerrogativa do profissional de enfermagem recusar-se, mesmo em situação de emergência, a executar prescrição médica na qual não constem assinatura e número de registro profissional do prescritor.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

52. (CESPE/2018/EBSERH)

Considerando as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue o item subsequente. Na prestação da assistência em enfermagem, o profissional deve buscar proporcionar qualidade de vida à pessoa e a sua família, inclusive no processo de luto, em caso de morte.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

53. (CESPE/2018/EBSERH)

Considerando as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue o item subsequente.

É facultada ao profissional de enfermagem a decisão de participar de prática destinada a antecipar a morte de paciente em fase terminal, a chamada eutanásia.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

54. (CESPE/2018/EBSERH)

Considerando as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue o item subsequente.

É proibido disponibilizar o acesso a informações e documentos a terceiros que não estejam diretamente envolvidos na prestação da assistência de saúde ao paciente.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

55. (CESPE/2018/EBSERH)

Com base na Lei n.º 7.498/1986 e no Decreto n.º 94.406/1987, que dispõem sobre o exercício da enfermagem, julgue o item a seguir.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

56. (CESPE/2018/EBSERH)

Com base na Lei n.º 7.498/1986 e no Decreto n.º 94.406/1987, que dispõem sobre o exercício da enfermagem, julgue o item a seguir. Cabe ao técnico de enfermagem assistir o enfermeiro na prevenção e no controle sistemático de infecção hospitalar.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

57. (CESPE/2018/EBSERH)

Tendo em vista que o Conselho Federal de Enfermagem publicou recentemente o Novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem por meio da Resolução COFEN n.º 564/2017, julgue o item a seguir à luz das prescrições dessa nova norma. No caso de prontuários eletrônicos, o profissional de enfermagem deve apor assinatura certificada, conforme legislação vigente.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

58. (CESPE/2018/EBSERH) (REPETIDA)

Tendo em vista que o Conselho Federal de Enfermagem publicou recentemente o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem por meio da Resolução COFEN n.º 564/2017, julgue o item a seguir à luz das prescrições dessa nova norma. No caso de prontuários eletrônicos, o profissional de enfermagem deve apor assinatura certificada, conforme legislação vigente.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

59. (CESPE/2018/EBSERH)

Tendo em vista que o Conselho Federal de Enfermagem publicou recentemente o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem por meio da Resolução COFEN n.º 564/2017, julgue o item a seguir à luz das prescrições dessa nova norma. Nos casos de violência doméstica contra criança, adolescente, idoso ou mulher, o profissional de enfermagem deverá informar os órgãos de responsabilização criminal, mesmo sem autorização do paciente ou de seu representante legal.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

60. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca das atribuições privativas do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. O enfermeiro participa de bancas de concursos para o provimento de cargos de técnico ou auxiliar de enfermagem, exceto no recrutamento e seleção para o graduado em enfermagem.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

61. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca das atribuições privativas do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. Cabe ao enfermeiro, privativamente, a execução de partos com ou sem distocias.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

62. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca das atribuições privativas do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. O enfermeiro está autorizado a prescrever medicamentos em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde em que exerce suas atividades.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

63. (CESPE/2018/EBSERH)

Acera das atribuições privativas do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. O enfermeiro poderá exercer cargos de direção e chefia nas instituições de saúde pública; nas instituições privadas de saúde, entretanto, os cargos de direção e chefia de enfermagem estão subordinados ao diretor médico.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

64. (CESPE/2018/EBSERH)

Acera das atribuições privativas do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. O enfermeiro tem o dever de cuidar de pacientes graves com risco de vida.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

65. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item a seguir, utilizando uma análise crítica dos aspectos bioéticos e dilemas relativos ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem. O Código de Ética e Deontologia da Enfermagem permite a prática da eutanásia, a fim de antecipar a morte em pacientes submetidos a cuidados paliativos oncológicos.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

66. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item a seguir, utilizando uma análise crítica dos aspectos bioéticos e dilemas relativos ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem. De acordo com os códigos de ética das profissões de saúde, a reprodução humana deve observar a defesa à vida e o respeito à dignidade e à autonomia do ser humano.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

67. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item a seguir, utilizando uma análise crítica dos aspectos bioéticos e dilemas relativos ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem. De acordo com o caráter ético das pesquisas, o Código de Ética e Deontologia da Enfermagem permite aos seus membros a participação e realização de pesquisas que ponham em risco a saúde e a integridade do ser humano.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

68. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item a seguir, utilizando uma análise crítica dos aspectos bioéticos e dilemas relativos ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem. Os profissionais de enfermagem estão livres de responsabilidades civis e penais quando executam, mesmo contra sua vontade, uma transfusão sanguínea em uma situação de risco de vida.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

69. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item subsequente, relativo ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem. Considera-se infração ética a inobservância das normas prescritas pelo Conselho Federal e pelos conselhos regionais de enfermagem.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

70. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item subsequente, relativo ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem. Considera-se infração disciplinar a ação, omissão ou convivência que implique em desobediência e(ou) inobservância das disposições do Código de Ética e Deontologia da Enfermagem.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

71. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item subsequente, relativo ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem. É proibido ao profissional de enfermagem delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde que não seja enfermeiro.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

72. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item subsequente, relativo ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem. É direito do profissional de enfermagem recusar-se a executar, exceto em situações de urgência e emergência, prescrição medicamentosa e terapêutica com base em documentos e formulários nos quais não constem a assinatura e o número de registro do profissional.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

73. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca de administração dos serviços de enfermagem, julgue o item a seguir, com fundamentação na legislação e na normatização em vigor. Um técnico de enfermagem somente poderá ser indicado como responsável técnico se os serviços de enfermagem prestados pela empresa ou instituição se limitarem à execução de ações de enfermagem que lhe caibam, por lei, executar.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

74. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca de administração dos serviços de enfermagem, julgue o item a seguir, com fundamentação na legislação e na normatização em vigor. O profissional de enfermagem que exerça responsabilidade técnica em uma empresa ou instituição poderá fazê-lo como empregado ou servidor dessa pessoa jurídica ou como prestador de serviços autônomo.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

75. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito do posicionamento do enfermeiro como líder e agente de mudança, julgue o item subsequente, tendo como referência a legislação e a normatização em vigor. Nos casos de suspensão das atividades profissionais motivadas por reivindicações da categoria, o enfermeiro, ainda que seja um agente de mudança, deve garantir a continuidade da assistência de enfermagem, desde que em condições que ofereçam segurança.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

76. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito do posicionamento do enfermeiro como líder e agente de mudança, julgue o item subsequente, tendo como referência a legislação e a normatização em vigor. No papel de liderança, o enfermeiro, em caso de emergência, poderá realizar serviços que, por sua natureza, competiriam a outro profissional.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

77. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito do posicionamento do enfermeiro como líder e agente de mudança, julgue o item subsequente, tendo como referência a legislação e a normatização em vigor. É dever do enfermeiro responsabilizar-se por falta cometida no exercício da profissão, ainda que tenha sido praticada coletivamente.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

78. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item a seguir, utilizando uma análise crítica dos aspectos bioéticos e dilemas relativos ao Código de Ética e Deontologia da Enfermagem. Deontologicamente, o aborto é proibido por esse código de ética, embora o Código Penal o permita nos casos de estupro e risco de vida para a mãe.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

79. (CESPE/2018/EBSERH)

Com base no código de ética dos profissionais de enfermagem, julgue o item que segue. O enfermeiro poderá recusar a comunicação formal ao conselho regional de enfermagem de fatos que envolvam sua recusa ou demissão de cargo, função ou emprego.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

80. (CESPE/2018/EBSERH)

Com base no código de ética dos profissionais de enfermagem, julgue o item que segue. O enfermeiro poderá recusar a comunicação formal ao conselho regional de enfermagem de fatos que envolvam sua recusa ou demissão de cargo, função ou emprego.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

81. (CESPE/2018/EBSERH)

Com base no código de ética dos profissionais de enfermagem, julgue o item que segue. O enfermeiro deverá denunciar aos órgãos competentes e posicionar-se contra ações e procedimentos de membros da equipe de saúde, se houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

82. (IBFC/2017/EBSERH)

O técnico de enfermagem estava prestando cuidados de enfermagem para um paciente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Durante a mudança de decúbito, o paciente perdeu a sonda nasointestinal (SNE). O técnico de enfermagem, que tinha 10 anos de trabalho na UTI, não avisou o Enfermeiro e reintroduziu a SNE para instalação da dieta enteral no paciente. Posteriormente, o paciente apresentou Parada Cardiorrespiratória (PCR), sendo atendido pelo médico e constatado que o procedimento de recolocação da SNE foi realizado de forma inadequada. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é correto afirmar que:

- a) O profissional de enfermagem agiu com imprudência.
b) O profissional de enfermagem agiu com negligência.
c) O profissional de enfermagem causou um dano ao paciente, sem intenção de matar. Portanto, não houve infração ética.
d) O profissional de enfermagem agiu com imperícia.
e) O profissional de enfermagem agiu corretamente em adotar a conduta de recolocação da SNE, pois possui capacitação e habilitação para o procedimento em questão.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

83. (IBFC/2017/EBSERH)

De acordo com Decreto no 94.406/87, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

a) O Técnico de Enfermagem é o titular de certificado de Enfermeiro Prático ou Prático de Enfermagem, expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde

b) Ao Enfermeiro e ao Técnico de Enfermagem incumbem privativamente as atividades de planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem

c) O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe assistir ao Enfermeiro na execução de todas as atividades de assistência de Enfermagem

d) O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe assistir ao Enfermeiro na participação em bancas examinadoras, em matérias específicas de Enfermagem, nos concursos para provimento de cargo ou contratação de pessoal Técnico e Auxiliar de Enfermagem.

e) O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe assistir ao Enfermeiro na participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

84. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)

Segundo a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem nº 7.498/1986, Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987, é considerada uma atividade privativa do enfermeiro

- a) a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública.
- b) a execução de parto com distocia.
- c) a participação na programação da assistência de Enfermagem.
- d) a realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando necessária.
- e) a organização e direção dos serviços de enfermagem.

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO <input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO <input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

85. (IBFC/2017/EBSERH)

O técnico de enfermagem solicitou a medicação prescrita pelo médico ao Setor de Farmácia. Na pressa, o técnico de enfermagem não checou a medicação recebida, preparou e administrou no paciente. A seguir o paciente apresentou uma parada cardiorrespiratória (PCR) e foi atendido pelo médico e encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva do hospital. O médico constatou que a PCR foi resultante da medicação errada administrada. Considerando os aspectos éticos, nesse caso ocorreu:

- a) Uma imprudência.
- b) Uma negligência.
- c) Uma imperícia.
- d) Um indulto.
- e) Uma atitude incorreta, mas considerada acidental. Portanto, não houve infração ética.

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO <input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO <input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

86. (IBFC/2017/EBSERH)

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução do COFEN 311/2007, capítulo II, do sigilo profissional, assinale a alternativa que apresenta uma proibição:

a) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento, em razão de seu exercício profissional, à pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.

b) O segredo profissional referente ao menor de idade deve ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis.

c) Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial.

d) Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso não deve ser revelado, mesmo quando necessário à prestação da assistência.

e) O profissional de enfermagem, intimado como testemunha, comparecer perante a autoridade e declarar seu impedimento de revelar o segredo.

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO <input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO <input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

87. (IBFC/2017/EBSERH)

Sobre as atividades de Enfermeiro Auditor, segundo a Resolução do COFEN nº 266/2001, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() É uma atividade privativa do Enfermeiro Auditor prestar consultoria, auditoria e emissão de pareceres sobre os serviços de Auditoria de Enfermagem.

() É uma atividade privativa do Enfermeiro Auditor atuar no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde.

() É uma atividade do Enfermeiro Auditor como integrante da equipe de Auditoria em Saúde atuar na elaboração, execução e avaliação dos planos assistências de saúde.

() O Enfermeiro Auditor exerce suas atividades, exclusivamente, a partir de prévia autorização por parte do auditor médico.

- a) F,V,F,V
- b) V,V,V,V
- c) V,F,F,F
- d) V,F,V,F
- e) F,V,V,F

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO <input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO <input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

88. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre os direitos e deveres do profissional de Enfermagem, assinale a alternativa incorreta, em relação ao que expressa o Código de Ética.

a) Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional é reponsabilidade e dever do profissional de Enfermagem.

b) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica é um direito do profissional de Enfermagem.

c) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional, não se inclui entre os direitos e deveres do profissional de enfermagem.

d) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional é um direito do profissional de Enfermagem.

e) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais é dever e responsabilidade do profissional de Enfermagem.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Saúde da Criança e do Adolescente

89. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito da assistência à criança sadia, julgue o item que segue.

A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam que o aleitamento materno seja exclusivo nos primeiros seis meses de vida do bebê e complementado até os dois anos de vida ou mais.

c) CERTO

e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

90. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito da assistência à criança sadia, julgue o item que segue. A proteção do leite materno contra infecção respiratória, assim como ocorre contra a diarreia, é maior quando a amamentação é exclusiva nos primeiros seis meses de vida.

c) CERTO

e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

91. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito da assistência à criança sadia, julgue o item que segue. A amamentação é um excelente método anticoncepcional nos primeiros doze meses após o parto, desde que a mãe ainda não tenha menstruado e a criança esteja sendo alimentada exclusiva ou predominantemente com leite materno.

c) CERTO

e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

92. (INSTITUTO AOC/2017/EBSERH)

Crianças que recebem leite materno com quantidade suficiente de vitamina A suprem facilmente a necessidade dessa vitamina com a alimentação complementar. Porém, após a introdução dos alimentos complementares, o técnico de enfermagem, a fim de que os lactentes (5-12 meses) tenham quantidade suficiente de vitamina A, poderá orientar a mãe para

a) oferecer 50g de fígado de boi semanalmente.

b) levar as crianças para passeios em dias de sol.

c) oferecer frutas como caju, goiaba e acerola semanalmente.

d) oferecer leite e derivados semanalmente.

e) oferecer gema de ovo e cereais quinzenalmente.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

93. (IBFC/2017/EBSERH)

Considerando o procedimento para medição antropométrica, é correto afirmar que, a verificação do comprimento deve ser realizada na mesa ou superfície plana com o auxílio de uma régua antropométrica em crianças de:

a) 0 a 36 meses – deitada

b) 12 a 72 meses – em pé

c) 0 a 23 meses – deitada

d) 24 a 72 meses – em pé

e) 6 a 96 meses – deitada

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

94. (IBFC/2017/EBSERH)

Assinale a alternativa correta que contemple os índices de Apgar, que no quinto minuto de vida do recém-nascido, relacionam-se a maior risco de mortalidade e leve aumento de risco para paralisia cerebral.

- a) 4 a 6
- b) 7 a 10
- c) 3 a 5
- d) 0 a 3
- e) 5 a 7

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

95. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

O aleitamento materno é a estratégia isolada que mais previne mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta. As mães que retornam ao trabalho podem continuar oferecendo leite materno ordenhado. Seguindo a técnica correta de ordenha e armazenamento o leite cru, pode ser guardado em geladeira por

- a) até 12 horas.
- b) até 24 horas.
- c) até 48 horas.
- d) no máximo 5 dias.
- e) no máximo 10 dias.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

96. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando o atendimento ao recém-nascido na sala de parto, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. O escore de Apgar deve ser realizado no primeiro e quinto minuto de vida para avaliar a vitalidade neonatal.
- II. O escore de Apgar é considerado o melhor parâmetro para determinar a necessidade de reanimação neonatal.
- III. O escore de Apgar avalia os sinais de frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor.
- IV. O escore de Apgar é realizado, imediatamente, após o nascimento, antes mesmo de iniciar a reanimação cardiopulmonar, nos momentos 0, 8 e 12 minutos de vida.

- a) As frases I e III estão corretas
- b) As frases I, II e III estão corretas
- c) As frases II, III e IV estão corretas
- d) Apenas a frase I está correta
- e) Apenas a frase IV está correta

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

97. (IBFC/2016/EBSERH)

Para profilaxia da doença hemorrágica precoce e tardia do recém-nascido, deve-se administrar:

- a) 2 mg de Vitamina C
- b) 1 mg de Vitamina K
- c) 2 mg de Concentrado de complexo protrombínico
- d) 1 mg de Vitaminas A e D
- e) 2 mg de Fator VIII de coagulação

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

98. (IBFC/2016/EBSERH)

É correto afirmar que o recém-nascido ao nascer:

- a) Receberá as vacinas BCG e contra Hepatite B
- b) Receberá apenas a vacina BCG
- c) Receberá apenas a vacina contra Hepatite A
- d) Receberá vacina a partir dos 3 meses de vida
- e) Receberá as vacinas BCG e Tetraviral

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

99. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando a assistência de enfermagem ao recém-nascido na sala de parto, assinale a alternativa correta.

- a) A pontuação do escore de Apgar varia de 0 a 5, considerando que a nota 5 indica melhor sucesso neonatal.
- b) O escore de Apgar tem a finalidade de avaliar a vitalidade neonatal.
- c) O escore de Apgar deve ser realizado obrigatoriamente antes de iniciada a reanimação cardiopulmonar (RCP), pois é um parâmetro para determinar a necessidade de RCP.
- d) O escore de Apgar avalia três sinais: frequência cardíaca, esforço respiratório e cor.
- e) O escore de Apgar deve ser realizado no terceiro e décimo minutos de vida.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

100. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Uma nutriz doadora do Banco de Leite Humano (BLH) é orientada pelo Enfermeiro que o leite cru congelado no domicílio deve ser transportado para o BLH no prazo máximo de:

- a) 05 dias após sua obtenção.
- b) 10 dias após sua obtenção.
- c) 15 dias após sua obtenção.
- d) 20 dias após sua obtenção.
- e) 30 dias após sua obtenção.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

101. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Paciente, 11 meses, apresenta febre, prostração, náusea e vômito, associado a sinais de irritação meníngea. Após avaliação do responsável, foi diagnosticado como meningite bacteriana. Considerando que a meningite é uma doença grave, com taxas significativas de morbi-mortalidade, o enfermeiro deve estar ciente das principais complicações que incluem:

- a) abscesso cerebral, hipertensão intracraniana, secreção inapropriada de hormônio antidiurético, complicações anatômicas, sequelas neurológicas e convulsão.
- b) abscesso cerebral, hipotensão intracraniana, secreção inapropriada de hormônio antidiurético, complicações anatômicas, sequelas neurológicas e convulsão.
- c) abscesso cerebral, hipertensão intracraniana, secreção apropriada de hormônio antidiurético, complicações anatômicas, sequelas neurológicas e convulsão.
- d) abscesso cerebral, hipotensão intracraniana, secreção apropriada de hormônio antidiurético, complicações anatômicas, sequelas neurológicas e convulsão.
- e) abscesso cerebral, hipotensão intracraniana, secreção apropriada de hormônio antidiurético, complicações anatômicas, sequelas cardiológicas e convulsão.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

102. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

O acompanhamento hemodinâmico em pacientes pediátricos críticos é fundamental para o desfecho favorável de cada indivíduo. Assim, o enfermeiro deve se familiarizar com alguns conceitos para organizar suas atividades e detectar alterações no quadro evolutivo de cada caso. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Volume sistólico: também compreendido como capacitância, é a quantidade total de sangue que pode ser armazenada em uma dada proporção da circulação para cada milímetro de mercúrio da elevação da pressão.
- b) Pós-carga: corresponde ao grau de estiramento pericárdico ao final da sístole. Também pode ser entendido como volume de sangue presente no átrio antes da contração.
- c) Pré-carga: é a impedância ou resistência oferecida ao enchimento atrial. Também pode ser entendido como resistência de ejeção do átrio.
- d) Débito cardíaco (DC): quantidade de sangue bombeada pelo ventrículo a cada minuto (volume sistólico x frequência cardíaca).
- e) Complacência vascular: corresponde ao volume de sangue ejetado em cada sístole ventricular.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

103. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Criança de 8 anos, 40kg, asmática, refere dispnéia iniciada há 8 horas. Ao exame físico, o paciente encontra-se ansioso, pálido, cianótico, com frequência respiratória de 48 rpm, retrações intercostais, subcostais e de fúrcula e esforço expiratório. O diagnóstico é de asma aguda grave com falência respiratória. Sem melhora após atendimento inicial, evolui para intubação orotraqueal (IOT) e ventilação mecânica (VM). Em geral, o enfermeiro deve estar atento às principais complicações da intubação e da ventilação mecânica em pediatria que são, exceto:

- a) asfixia e Parada Cardiorrespiratória (PCR) por obstrução do tubo ou extubação acidental.
- b) atelectasias.
- c) agenesia broncopulmonar.
- d) extravasamento de ar: pneumotórax, pneumomediastino, enfisema intersticial, etc.
- e) infecções (pneumonias).

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

104. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), leia as afirmativas e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância, receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o crescimento e desenvolvimento em todas áreas, com exceção da psíquica.

II. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

III. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, excluindo as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência, em tempo integral, de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente.

IV. A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada, inicialmente, antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e, posteriormente, no sexto e no décimo segundo anos de vida, com orientações sobre saúde bucal.

- a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- b) As afirmativas II, III e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa IV está correta
- e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

105. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando a avaliação da vitalidade ao nascer e da necessidade de reanimação neonatal, é correto afirmar que:

a) A frequência cardíaca (FC) é o principal determinante da decisão de indicar as diversas manobras de reanimação. Logo após o nascimento, o recém-nascido (RN) deve apresentar uma FC menor que 100 batimentos por minuto.

b) O boletim de Apgar deve ser utilizado para determinar o início da reanimação e das manobras a serem instituídas no decorrer do procedimento.

c) O recém-nascido (RN) apresenta boa vitalidade e não necessita de qualquer manobra de reanimação, se, ao nascimento, verifica-se que ele é a termo, está respirando ou chorando e com tônus muscular em flexão, sem a presença de líquido amniótico meconial.

d) A avaliação da coloração da pele e das mucosas do RN é a principal medida para decidir procedimentos na sala de parto, pois diversos estudos mostram a relação com a saturação de oxigênio ao nascimento.

e) A classificação da idade gestacional adequada e a ausência de sofrimento fetal são as únicas medidas para a decisão de indicar as diversas manobras de reanimação.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

106. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando-se o preconizado para monitoração de crescimento e desenvolvimento da criança, assinale a alternativa incorreta.

a) A suplementação de ferro deve ser prescrição para todas as idades, até para as crianças com menos de 6 meses em aleitamento materno exclusivo.

b) No primeiro ano de vida, o acompanhamento de puericultura visa, basicamente, identificar precocemente as alterações de crescimento e desenvolvimento, nutrição e vacinação.

c) Nas consultas pediátricas, deve-se acompanhar o crescimento (peso, altura, IMC, perímetro cefálico) com a utilização dos gráficos produzidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

d) A prevenção de acidentes é um tópico muito importante durante a puericultura, que rotineiramente é negligenciada.

e) Realizar a checagem dos marcos principais de desenvolvimento, para avaliação neurológica e detectar possíveis atrasos no desenvolvimento.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

107. (IBFC/2016/EBSERH)

O brinquedo terapêutico é uma modalidade efetiva, indireta de ajudar as crianças a lidar com suas preocupações e medos, além de ajudar os enfermeiros a ganhar conhecimento das necessidades e sentimentos das crianças. Considerando os tipos de brinquedos e suas funções, relacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.

- (A) Dramático ou catártico
- (B) Instrucional
- (C) Capacitador de funções
- () Preparar a criança para os procedimentos a que será submetida.
- () Potencializar o uso da fisiologia da criança de acordo com a sua condição.
- () Permitir a descarga emocional da criança.

- a) B,C,A
- b) A,B,C
- c) C,B,A
- d) C,A,B
- e) A,C,B

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

108. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando os cuidados pós-drenagem de tórax do recém-nascido (RN), leia as frases abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- I. Observar se há oscilação no circuito. Caso não ocorra, verificar obstrução por coágulo, fibrina, vazamento ou irregularidades no sistema.
- II. Posicionar o frasco de drenagem bem fixado à superfície e localizado em nível inferior ao tórax do RN.
- III. Recomenda-se o pinçamento do dreno a cada 3 horas, favorecendo a retirada precoce do mesmo.
- IV. Deve-se manter a drenagem torácica ou a aspiração contínua enquanto o selo d'água não estiver borbulhando e se não forem percebidas oscilações no circuito.

- a) As frases II e IV estão corretas
- b) As frases I e II estão corretas
- c) As frases I e III estão corretas
- d) As frases II, III e IV estão corretas
- e) Apenas a frase II está correta

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

109. (IBFC/2016/EBSERH)

Uma criança do sexo feminino, 6 anos de idade, internada na Unidade de Pediatria, foi diagnosticada com Doença Meningocócica. O Enfermeiro responsável orientou a equipe para:

- a) Colocar a criança em quarto privativo e adotar precauções para aerossóis.
- b) Colocar a criança em quarto privativo e adotar precauções para gotículas.
- c) Manter a criança em quarto coletivo e adotar precauções para contato.
- d) Manter a criança em quarto coletivo e adotar precauções-padrão.
- e) Colocar a criança em quarto coletivo, com corte de 1 metro e adotar precauções para aerossóis.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

110. (IBFC/2016/EBSERH)

Durante a consulta de enfermagem, a avaliação dos reflexos é uma parte importante do exame neurológico. É correto afirmar que, friccionar o dorso da criança, vertebralmente, com o dedo ou cotonete e a cessação ocorre por volta dos dois meses, relaciona-se ao reflexo de:

- a) Babinski
- b) Moro
- c) Galant
- d) Landau
- e) Marcha

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

111. (IBFC/2016/EBSERH)

A Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR) é a afecção respiratória mais frequente no recém-nascido (RN) pré-termo. Considerando a SDR, leia as frases abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- I. O diagnóstico da SDR é, essencialmente, radiológico, uma vez que os sinais e sintomas clínicos podem estar ausentes ou serem pouco específicos.
- II. É uma síndrome clínica caracterizada por hipoxemia grave e refratária, proveniente da diminuição do fluxo sanguíneo pulmonar e shunt direito-esquerdo por meio do forame oval e/ou canal arterial.
- III. A evolução clássica da SDR pode ser modificada por meio da administração antenatal de corticoide, assistência ventilatória precoce e uso de surfactante exógeno.
- IV. A principal causa é a deficiência quantitativa e qualitativa do surfactante alveolar.

- a) As frases I e IV estão corretas
- b) As frases III e IV estão corretas
- c) Apenas a frase II está correta
- d) Apenas a frase I está correta
- e) Apenas a frase IV está correta

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHOU DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

112. (IBFC/2016/EBSERH)

A pele atua como órgão de proteção, não só mecânica (física), mas também imunológica. Considerando os cuidados com a pele do recém-nascido, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() Os cuidados devem envolver limpeza suave com material neutro não tóxico e não abrasivo.

() Para a limpeza, é recomendado o uso de compostos contendo hexaclorofeno.

() Para higienização do cordão umbilical, o mais seguro é o uso de clorexidina ou álcool a 70%.

() Para higienização do cordão umbilical, não se deve usar iodo-povidona rotineiramente pelo risco de absorção sistêmica do iodo e surgimento de hipotireoidismo transitório.

- a) V,V,V,V
- b) V,F,V,F
- c) F,F,F,F
- d) V,V,V,F
- e) V,F,V,V

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHOU DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

113. (IBFC/2016/EBSERH)

As medidas a serem adotadas no manejo do ingurgitamento mamário incluem:

a) Compressas quentes (ou bolsa de água quente) nas mamas nos intervalos ou logo após as mamadas; em situações de maior gravidade, podem ser feitas de 2 em 2 horas.

b) Deixar as mamas livres, sem uso de sutiã, para alívio da dor e manutenção dos ductos em posição natural.

c) Massagens delicadas das mamas, com movimentos circulares, particularmente, nas regiões mais afetadas pelo ingurgitamento, pois elas fluidificam o leite viscoso acumulado, facilitando sua retirada, e são importantes estímulos do reflexo de ejeção do leite.

d) Ordenha mecânica da aréola uma vez por dia, e se estiver tensa, antes de cada mamada.

e) Mamadas frequentes, com horários preestabelecidos de 3 em 3 horas.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHOU DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

114. (IBFC/2016/EBSERH)

São manifestações sistêmicas da dor, no período neonatal:

a) Sistema cardiovascular: aumento da frequência cardíaca e pressão arterial e variação de pressão intracraniana.

b) Sistema respiratório: redução do consumo de oxigênio, elevação na saturação de oxigênio e alteração na relação ventilação/perfusão.

c) Sistema digestivo: aumento da motilidade gástrica.

d) Alterações hormonais: perante dor intensa ocorre redução da liberação de glucagon, hormônio de crescimento e supressão da produção de insulina, tanto durante como após o episódio doloroso.

e) Alterações hormonais: perante dor intensa ocorre redução da liberação de corticosteroides, retenção de hormônio antidiurético e hipocoagulabilidade, tanto durante como após o episódio doloroso.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHOU DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

115. (IBFC/2016/EBSERH)

O Método Canguru é um modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado humanizado que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial. Leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I. É um método substitutivo das unidades de terapia intensiva neonatal e da utilização de incubadoras.

II. O contato pele a pele, no Método Canguru, começa com o toque evoluindo até a posição canguru. Inicia-se de forma precoce e crescente, por livre escolha da família, pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente.

III. A posição canguru consiste em manter o recém nascido de baixo peso, em contato pele a pele, na posição vertical junto ao peito dos pais ou de outros familiares.

IV. O método objetiva aprimorar a atenção perinatal além de economizar recursos humanos e recursos técnicos.

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- b) As afirmativas II e III estão corretas
- c) As afirmativas I e IV estão corretas
- d) As afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa II está correta

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

116. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Ao realizar parto sem distócia em situação de emergência, o enfermeiro, para avaliar a vitalidade fetal, aplica o teste de Apgar:

- a) do quinto ao décimo minuto de vida.
- b) no quinto e no vigésimo minuto de vida.
- c) no terceiro e no décimo minuto de vida.
- d) no segundo e no quinto minuto de vida.
- e) no primeiro, no quinto e, se necessário, no décimo minuto de vida.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

117. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Paciente masculino, 06 anos, sofreu queda da própria altura, apresentando pequeno corte contuso em região parietal. A criança chorava e começava a nausear. Na avaliação pupilar, observou-se anisocoria de 2,0mm à esquerda e de 4,0mm à direita. Posto isso, é correto afirmar que:

- a) a isocoria observada indica provável Trauma Cranioencefálico.
- b) as pupilas só indicam intercorrências severas quando em midríase paralytica bilateral.
- c) pode ter ocorrido lesão cerebral localizada devido a Trauma Cranioencefálico.
- d) a anisocoria observada indica provável diminuição da pressão intracraniana.
- e) devido às náuseas, as pupilas podem se tornar anisocóricas.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

118. (IBFC/2016/EBSERH)

O esquema alimentar para crianças amamentadas, do nascimento até completar 6 meses de vida, deve ser o aleitamento materno exclusivo em livre demanda. Sobre o esquema alimentar dessa criança, a partir dos 6 meses de vida, assinale a alternativa correta.

- a) Ao completar 10 meses, deve-se oferecer para a criança durante o dia: leite de vaca e refeição básica da família 2 vezes ao dia.
- b) Ao completar 12 meses, deve-se oferecer para a criança durante o dia: leite de vaca, papa de fruta 2 vezes ao dia e papa salgada 2 vezes ao dia.
- c) Ao completar 6 meses, deve-se oferecer para a criança durante o dia: leite materno por livre demanda, papa de fruta, papa salgada, papa de fruta e leite materno.
- d) Ao completar 6 meses, deve-se oferecer leite materno por livre demanda, papa de fruta 1 vez ao dia e refeição básica da família 2 vezes ao dia.
- e) Ao completar 12 meses, deve-se oferecer para a criança durante o dia: leite de vaca, papa de fruta apenas 1 vez ao dia e papa salgada 2 vezes ao dia.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

119. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre o rastreamento para criptorquidia, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () A migração espontânea dos testículos ocorre geralmente nos primeiros 12 meses de vida.
 - () Se os testículos não forem palpáveis na primeira consulta ou forem retráteis, o rastreamento deve ser realizado nas visitas rotineiras de puericultura.
 - () Se aos 15 meses não forem encontrados testículos palpáveis no saco escrotal, será necessário encaminhar a criança à cirurgia pediátrica.
- a) V,F,V
 - b) V,V,V
 - c) F,F,V
 - d) F,V,F
 - e) V,V,F

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

120. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Durante a primeira consulta de puericultura do recém-nascido, o enfermeiro, ao examinar a pele do RN, notou a presença do sinal de arlequim. O que esse achado significa?

- a) Iatrogenia por uso de coloides ou cristaloides em excesso.
- b) Presença de doença hemolítica perinatal.
- c) Palidez em um hemitorço e eritema do lado oposto, por alteração vasomotora.
- d) Indicativo de doença cardiorrespiratória grave.
- e) Possível trauma no momento do parto.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

121. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Durante o exame físico do RN pelo enfermeiro do serviço de saúde, na avaliação da boca, foi observada a presença de macroglossia. Qual é o significado desse termo?

- a) Alteração na coloração do palato.
- b) Formato irregular da úvula.
- c) Alteração no formato do freio lingual.
- d) Crescimento anormal da língua.
- e) Formato irregular dos lábios superiores.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

122. (IBFC/2016/EBSERH)

A técnica de amamentação não está adequada quando:

- a) A cabeça do bebê está no mesmo nível da mama da mãe e o queixo está tocando-a.
- b) A boca está bem aberta.
- c) O lábio inferior está virado para fora.
- d) Durante a mamada vê-se muito a aréola (tanto a aréola superior quanto a inferior).
- e) As bochechas estão arredondadas ou achatadas contra a mama.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

123. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando o alojamento conjunto, leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Após a finalização dos procedimentos de sala de parto, a mãe, junto com o RN, deve ir para um local dentro da maternidade que permita a eles ficarem juntos 24 horas por dia até a alta hospitalar.
- II. É facultado ao hospital a manter alojamento conjunto em suas instalações.
- III. Existência de lei que garante às parturientes o direito à presença de acompanhante, indicado por ela, durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato (até dez dias após o parto).

IV. Para permanência junto com a mãe, o recém-nascido deve apresentar boa vitalidade, capacidade de sucção e controle térmico, devendo obrigatoriamente ter mais de 3.000g, mais de 37 semanas de gestação e índice de Apgar maior que nove no quinto minuto.

- a) As frases I, III e IV estão corretas.
- b) As frases I, II, III e IV estão corretas.
- c) As frases I e III estão corretas.
- d) Apenas a frase I está correta.
- e) Apenas a frase IV está correta.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

124. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

No serviço de assistência de enfermagem pediátrica, usa-se medidas antropométricas. Quais são elas?

- a) Temperatura, perímetro cefálico e torácico.
- b) Perímetro cefálico e respiração.
- c) Peso, altura, perímetros cefálico, torácico e abdominal.
- d) Pressão arterial, pulso, respiração e temperatura.
- e) Saturação de oxigênio e pressão arterial.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

125. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Para evitar resultados falso-negativos para fenilcetonúria, o teste do pezinho deve ser realizado:

- a) a partir do 3º dia de vida da criança.
- b) imediatamente após o nascimento da criança.
- c) a partir do 2º dia de vida da criança.
- d) a partir do 1º dia de vida da criança.
- e) com 12 horas de vida da criança.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

126. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

No sentido de detectar alterações auditivas, o profissional de saúde deverá orientar as mães para acompanhar os marcos do desenvolvimento de seus filhos até os 12 meses de vida, de acordo com a Caderneta de Saúde da Criança. Além disso, faz-se necessário conhecer os indicadores de risco para perdas auditivas congênitas ou progressivas na infância, que são os seguintes, exceto:

- a) traumatismos cranioencefálicos (TCE), especialmente fraturas do osso temporal.
- b) anomalias craniofaciais.
- c) história familiar de perda auditiva congênita.
- d) permanência da criança na UTI por mais de cinco dias com quadro de citomegalovírus.
- e) crianças nascidas de parto com apresentação pélvica.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

127. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Paciente masculino, 9 meses de idade, compareceu à Unidade Básica de Saúde acompanhado de sua mãe para realização da puericultura. Ao exame físico, o enfermeiro observou que os testículos apresentavam-se retráteis. Considerando que a criptorquidia isolada é a anomalia mais comum ao nascimento, assinale a correta:

- a) Será necessário o encaminhamento à cirurgia pediátrica para diminuir o risco de câncer de testículo.
- b) O caso deve ser monitorado a cada 6 a 12 meses, entre os 4 e os 10 anos do menino.
- c) O rastreamento não é realizado durante a Puericultura, somente no hospital logo após o nascimento.

d) A cirurgia deve ser realizada o mais rápido possível para evitar problemas com a infertilidade quando adulto.

- e) Não há necessidade de monitoramento e encaminhamento à cirurgia, pois, nessa idade, é comum os testículos serem retráteis.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

128. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Durante a puericultura, a mãe de uma paciente (2 meses) questionou o enfermeiro sobre a melhor posição para sua filha dormir. Considerando o risco de morte súbita de crianças nos primeiros anos de vida, sobretudo nos primeiros 6 meses de vida, o enfermeiro orientou que:

- a) a melhor maneira de prevenir casos assim é colocá-la para dormir de lado, preferencialmente do lado esquerdo.
- b) a melhor maneira de prevenir casos assim é colocá-la para dormir de lado, preferencialmente do lado direito.
- c) a melhor maneira de prevenir casos assim é colocá-la para dormir de bruços.
- d) a melhor maneira de prevenir casos assim é colocá-la para dormir de barriga para cima.
- e) a posição não interfere. O importante é não ter lençóis ou cobertores frouxos em volta da criança.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

129. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Quanto às contraindicações ao aleitamento materno, é correto afirmar que:

- a) mães portadoras do vírus HIV, lactentes com galactosemia, recém-nascido de mãe portadora de hepatite B que recebeu imunoglobulina logo após o parto.
- b) lactentes com galactosemia e mães portadoras de drogas ilícitas, recém-nascido de mãe portadora de hepatite B que recebeu imunoglobulina logo após o parto.
- c) mães portadoras do vírus do HIV, lactentes com galactosemia, recém-nascidos doentes, mães usuárias de drogas ilícitas.

d) mães com tuberculose em atividade, mães portadoras de Hepatite B, lactente com refluxo gastroesofágico, mães portadoras do vírus do HIV

e) mães portadoras do vírus do HIV, mães com tuberculose em atividade, lactentes com galactosemia, usuárias de drogas ilícitas, recém-nascido de mãe portadora de hepatite B e que não recebeu imunoglobulina logo após o parto.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Enfermagem em Centro Cirúrgico

130. (CESPE/2018/EBSERH)
Com referência à atuação da equipe de enfermagem em centro cirúrgico, julgue o item que segue.

É função do técnico de enfermagem auxiliar no posicionamento cirúrgico correto do paciente.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

131. (CESPE/2018/EBSERH)
Com referência à atuação da equipe de enfermagem em centro cirúrgico, julgue o item que segue.

É função do técnico de enfermagem auxiliar no posicionamento cirúrgico correto do paciente.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

132. (CESPE/2018/EBSERH)
Com referência à atuação da equipe de enfermagem em centro cirúrgico, julgue o item que segue.

O objetivo do manejo de enfermagem para o paciente em unidade de recuperação pós-anestésica restringe-se, basicamente, à avaliação da função renal.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

133. (CESPE/2018/EBSERH)
Com referência à atuação da equipe de enfermagem em centro cirúrgico, julgue o item que segue.

A sala de recuperação pós-anestésica deve ser equipada com leitos para o atendimento dos pacientes no pós-operatório até que eles estejam em condições de receber alta hospitalar.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

134. (CESPE/2018/EBSERH)
Com referência à atuação da equipe de enfermagem em centro cirúrgico, julgue o item que segue.

Áreas semirrestritas correspondem àquelas que têm limites definidos para a circulação de pessoal e de equipamentos, e que são destinadas ao uso privativo do pessoal vestido com a indumentária cirúrgica completa, com rígido controle de trânsito e de assepsia.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

135. (CESPE/2018/EBSERH)
Com referência à atuação da equipe de enfermagem em centro cirúrgico, julgue o item que segue.

Na preparação do paciente antes da cirurgia, deve-se auxiliá-lo a colocar meias de compressão elástica, quando indicado, pois elas são importantes na prevenção de trombose venosa profunda.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

136. (CESPE/2018/EBSERH)

Com referência à atuação da equipe de enfermagem em centro cirúrgico, julgue o item que segue. O expurgo é o local destinado à eliminação de matéria orgânica proveniente das salas de cirurgia, como secreções e excreções do paciente.

- c) CERTO
- e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

137. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca dos indicadores hospitalares, julgue o próximo item. O indicador de antisepsia do campo operatório com solução adequada para pele será considerado adequado quando o preparo do campo operatório for feito com antisséptico aquoso.

- c) CERTO
- e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

138. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)

De um modo geral, as intervenções cirúrgicas são realizadas em quatro tempos básicos: diérese, hemostasia, exérese e síntese. Dentre os instrumentos utilizados na fase de hemostasia, está:

- a) tesoura mayo.
- b) bisturi.
- c) porta-agulhas.
- d) pinça kelly.
- e) afastador de farabeuf.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

139. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)

Em uma cirurgia de drenagem de abscesso anal, qual é a classificação por potencial de contaminação?

- a) Potencialmente contaminada.
- b) Contaminada.
- c) Infectada.
- d) Limpa.
- e) Colonizada.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

140. (IBFC/2017/EBSERH)

_____ compreende o período de tempo que tem início no momento em que se reconhece a necessidade de uma cirurgia e termina no momento em que o paciente chega à sala de cirurgia. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

- a) Consulta de avaliação de risco perioperatório.
- b) Pós-operatório.
- c) Transoperatório.
- d) Pré-operatório.
- e) Intraoperatório.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

141. (IBFC/2017/EBSERH)

Ao posicionar o paciente para cirurgia é importante que a equipe permaneça atenta, protegendo o paciente. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Permitir a hiperextensão das terminações nervosas, prevenindo paralisias e/ou parestesias.

II. Proteger proeminências ósseas, principalmente em pacientes obesos, idosos e desnutridos, para evitar a formação de úlceras de pressão e trombozes.

III. Cuidar para que os membros inferiores e superiores não permaneçam pendentes na mesa de operação.

IV. Evitar utilização de múltiplos apoios para acomodar o paciente e evitar compressões, pois podem atrapalhar o posicionamento no momento do ato cirúrgico.

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- b) As afirmativas II e III estão corretas
- c) As afirmativas II e IV estão corretas
- d) As afirmativas I e IV estão corretas
- e) As afirmativas II, III e IV estão corretas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

142. (IBFC/2016/EBSERH)

Analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() Em unidade de clínica cirúrgica (UCC) cujos pacientes exijam cuidados intensivos, legalmente, apenas o técnico de enfermagem deve prestar cuidados de enfermagem, juntamente com os enfermeiros.

() O técnico de enfermagem recebe o plantão com o restante da equipe, ajuda a levantar as necessidades de enfermagem dos pacientes, colaborando com o enfermeiro na elaboração do plano de assistência.

() Depois de acompanhar a passagem do plantão, o técnico de enfermagem presta cuidados de enfermagem relativos a higiene, conforto, mobilização e alimentação, de acordo com a escala de serviço estabelecida pelo enfermeiro de turno.

() Entre as atribuições e responsabilidades do técnico de enfermagem, destaca-se a ajuda na elaboração do pedido semanal do material de consumo e no controle dos equipamentos.

- a) V,V,V,V.
- b) V,V,F,V.
- c) F,V,F,V.
- d) V,F,V,F.
- e) F,V,V,F.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

143. (IBFC/2016/EBSERH)
Os itens de uma Sala de Operação (SO) podem ser classificados em fixos e móveis. Assinale a alternativa que contemple um exemplo de item fixo:

- a) Monitor cardíaco.
- b) Mesa auxiliares.
- c) Suportes de braço para o paciente.
- d) Foco central.
- e) Aspirador elétrico.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

144. (IBFC/2016/EBSERH)
Segundo os termos cirúrgicos existentes, assinale a alternativa que contemple o significado do termo Anastomose:

- a) Conexão de dois órgãos tubulares, geralmente por sutura.
- b) Remoção total ou parcial de uma parte do corpo.

- c) Fixação cirúrgica de articulações.
- d) Remoção de um tecido vivo para exame.
- e) Hérnia da bexiga por defeito na musculatura do períneo.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

145. (IBFC/2016/EBSERH)
Assinale a alternativa que contemple o nome da pinça mostrada na figura abaixo.

- a) Pinça Kocher.
- b) Pinça Crille.
- c) Pinça Kelly.
- d) Pinça Rochester.
- e) Pinça Mixer.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

146. (IBFC/2016/EBSERH)
Na avaliação que precede a alta da Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) para a unidade de origem, são levados em consideração parâmetros que demonstram a estabilidade das condições orgânicas do paciente.
Assinale a alternativa correta:

- a) Desorientação no tempo e no espaço.
- b) Ausência de sensibilidade cutânea após bloqueio raquidiano ou peridural e movimentação ativa de dois membros.
- c) Presença de sangramento apenas na ferida operatória.
- d) Valor de escala de Aldrete e Kroulik, entre 8 e 10.
- e) Sinais vitais estáveis e saturação de oxigênio abaixo dos limites de normalidade.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

147. (IBFC/2016/EBSERH)
Sobre a Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. A temperatura ambiente e a ventilação quase sempre são controladas na SRPA, a qual precisa ser dotada, ainda, de oxigênio, ar comprimido e vácuo canalizados.
- II. Os equipamentos básicos da SRPA são aqueles de uso individual, que ficam fixados na parede acima da cabeceira de cada leito.

III. Os monitores cardíacos e oxímetros de pulso fazem parte dos equipamentos básicos da SRPA.

IV. O técnico de enfermagem apresenta muitas atribuições na SRPA, dentre elas destaca-se a avaliação do estado do paciente, utilizando para isso o índice de Aldrete e Kroulik.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II apenas.
- c) I apenas.
- d) I, II e III, apenas.
- e) I, II, III e IV.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

148. (IBFC/2016/EBSERH)

Analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() O pré-operatório pode ser longo nas cirurgias eletivas, curto nas cirurgias de urgência e praticamente não existir nas de emergência.

() O pré-operatório imediato começa no momento da indicação da cirurgia e termina 24 horas depois do seu início.

() A etapa do pré-operatório mediato pode acontecer em vários locais: no domicílio do paciente, no ambulatório do hospital, no posto de saúde, entre outros.

() O pré-operatório imediato corresponde às 24 horas que antecedem a cirurgia.

- a) V,V,V,V.
- b) V,F,V,V.
- c) F,V,F,V.
- d) V,F,V,F.
- e) V,V,V,F.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

149. (IBFC/2016/EBSERH)

O Centro Cirúrgico é o conjunto de áreas e instalações que permitem efetuar a cirurgia nas melhores condições de segurança para o paciente, e de conforto para a equipe de saúde. Assinale a alternativa incorreta.

a) Material cirúrgico é todo o conjunto de objetos, instrumentos e equipamentos que entram em contato direto ou indireto com a região operatória, utilizados para a execução de determinado procedimento cirúrgico.

b) A classificação dos materiais cirúrgicos é de acordo com a sua função ou uso principal, visto que muitos equipamentos têm mais de uma utilidade. Basicamente, um procedimento cirúrgico segue 3 etapas principais: diérese, hemostasia e síntese.

c) A sala de cirurgia deve abrigar, obrigatoriamente, dentre outros, mesa para o anestesista e seus medicamentos; aparelhos de anestesia e respiradores, foco de luz, bisturi elétrico e aparelho de ultrassom.

d) Historicamente, sobre a paramentação cirúrgica, o objetivo primário das barreiras de proteção em sala operatória sempre se dirigiu para a proteção dos pacientes à exposição de microorganismos presentes e liberados pelos trabalhadores.

e) A sala de cirurgia deve ter estruturalmente, dentre outros, pisos de superfície lisa; paredes anti-acústicas e teto de material lavável.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

150. (IBFC/2016/EBSERH)

O técnico de Enfermagem que atua no Centro Cirúrgico deve ter conhecimento específico e conhecer os termos formados por prefixos utilizados no dia-a-dia cirúrgico, indicando o órgão e o ato cirúrgico a ser realizado.

Assinale a alternativa correta.

a) Colostomia é a abertura do cólon intestinal através da parede abdominal.

b) Apêndicectomia é a abertura do apêndice através da parede abdominal.

c) Histeropexia é a retirada do útero.

d) Gastrorrafia é a abertura do estômago através da parede abdominal.

e) Mastectomia é a redução da mama esteticamente.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

151. (IBFC/2016/EBSERH)

A Recuperação Anestésica (RA) é o local destinado a receber o paciente no pós-operatório imediato até que recupere a consciência e tenha seus sinais vitais estáveis. Leia as afirmativas a seguir.

I. A Assistência prestada ao paciente na RA requer cuidados constantes, necessitando de monitorização e controle rigoroso de sua evolução.

II. A assistência prestada na RA é de cuidados críticos e necessita de uma equipe de enfermagem sempre alerta para atuar de maneira rápida e eficiente diante das complicações.

III. As complicações na RA são raras, as mais comuns são: choque cardiogênico, choque séptico e hipóxia grave.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I e II estão corretas
- b) As afirmativas I, II e III estão corretas
- c) Apenas a afirmativa III está correta
- d) As afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

152. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Foi atendido no pronto atendimento um paciente de 25 anos, sexo masculino, com ferimento por arma branca na região abdominal, que apresenta sangramento intenso, sendo encaminhado para laparotomia exploradora. Essa cirurgia pode ser classificada como:

- a) eletiva.
- b) paliativa.
- c) de urgência.
- d) de emergência.
- e) requerida.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

153. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Durante o preparo físico do paciente no período pré-operatório mediato, a equipe de enfermagem deverá:

- a) administrar o pré-anestésico para diminuir a ansiedade, ter sono relaxante e diminuir o metabolismo basal.

b) realizar exame físico, atentando para as condições que podem atuar negativamente: idade, outras doenças e infecções.

c) realizar a transferência do cliente da unidade de internação para o centro cirúrgico.

d) realizar o posicionamento do cliente na mesa cirúrgica, monitorizando-o e estruturando a sala cirúrgica.

e) certificar-se de que o material utilizado na cirurgia esteja no centro cirúrgico ao término do procedimento, realizar contagem do material, conferência de gazes, compressas e outros.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

154. (IBFC/2016/EBSERH)

O modelo de assistência de enfermagem perioperatória, com base no processo de enfermagem e nas Necessidades Humanas Básicas, estruturado por Wanda de Aguiar Horta, sendo o mais difundido no Brasil é:

- a) Modelo Perioperatório focado no paciente.
- b) Sistema de Enfermagem de Assistência Perioperatória (SAEP).
- c) Gerenciamento de caso (case management).
- d) Modelo baseado no enfoque risco.
- e) Planejamento baseado na programação cirúrgica.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

155. (IBFC/2016/EBSERH)

Nos diferentes tipos de cirurgias, o tempo cirúrgico que consiste na aproximação das bordas dos tecidos seccionados ou ressecados é chamado de:

- a) Exérese.
- b) Hemostasia.
- c) Diérese.
- d) Aférese.
- e) Síntese.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

156. (IBFC/2016/EBSERH)
_____ é uma das principais infecções relacionadas à assistência à saúde no Brasil, ocupando a terceira posição entre todas as infecções em serviços de saúde e compreendendo 14% a 16% daquelas encontradas em pacientes hospitalizados. Preencha a lacuna e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC)
- b) Infecção do Trato-Urinário (ITU)
- c) Infecção do Trato-respiratório (ITR)
- d) Infecção da Corrente Sanguínea (ICS)
- e) Infecção em Cirurgias e Implantes (ICI)

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

157. (IBFC/2016/EBSERH)
Considerando a classificação e critérios definidores de Infecção Cirúrgica (IC), Osteomielite do Esterno, após cirurgia cardíaca ou endoftalmite são consideradas infecções de:

- a) Órgão/Cavidade.
- b) Incisional Profunda.
- c) Incisional Superficial.
- d) Inespecífica.
- e) Prótese.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

158. (IBFC/2016/EBSERH)
Um dos indicadores de processo para a prevenção de infecção do Sítio Cirúrgico (pré e intra-operatório) é a:

- a) Duração da antibioticoprofilaxia \leq 72 horas.
- b) Realização da antibioticoprofilaxia até 6 horas antes da incisão cirúrgica.
- c) Duração da antibioticoprofilaxia \leq 48 horas.
- d) Realização da antibioticoprofilaxia até 24 horas antes da incisão cirúrgica.
- e) Realização da antibioticoprofilaxia até 1 hora antes da incisão cirúrgica.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

159. (IBFC/2016/EBSERH)
De acordo com a RDC nº 15, de 15 de Março de 2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências, o serviço de saúde que realize mais de _____, deve constituir um Comitê de Processamento de Produtos para Saúde - CPPS, composto minimamente, por um representante _____.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) Mil cirurgias/mês, excluindo partos - do responsável pelo CME; do serviço de enfermagem; da equipe médica; e da equipe de farmácia.
- b) Duas mil cirurgias/mês, incluindo partos - do responsável pelo CME; do serviço de enfermagem; da equipe médica; da equipe de farmácia; e da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar).

c) Duzentas cirurgias/mês, excluindo partos - do responsável pelo CME; do serviço de enfermagem; da equipe médica; da equipe de farmácia; e do Núcleo de Segurança do Paciente.

d) Trezentos e cinquenta cirurgias/mês, incluindo partos - do serviço de enfermagem; da equipe médica; da Gerência de Risco; e do Núcleo de Segurança do Paciente.

e) Quinhentas cirurgias/mês, excluindo partos - da diretoria do serviço de saúde; do responsável pelo CME; do serviço de enfermagem; da equipe médica; e da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar)

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

160. (IBFC/2016/EBSERH)

A Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) é uma das principais IRAS (Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde) no Brasil. A cirurgia endovascular compreende quando o paciente é submetido a um procedimento terapêutico realizado por acesso percutâneo, via endovascular, com inserção de prótese, exceto stents.

De acordo com a definição de infecções do sítio cirúrgico para cirurgias endovasculares, assinale a alternativa que apresenta critérios para Infecção do Sítio de Entrada:

a) Inserção percutânea de prótese endovascular até um ano após a inserção.

b) Diagnóstico exclusivamente pelo cirurgião.

c) Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia e envolve apenas pele e subcutâneo do sítio de inserção percutânea da prótese endovascular.

d) Evidência de infecção exclusivamente por exames de imagem (ultra-sonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética nuclear, cintilografia ou tomografia por emissão de pósitrons (PETscan).

e) Êmbolos sépticos à distância, na ausência de outra fonte de infecção.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

161. (IBFC/2016/EBSERH)

Para montagem da mesa para procedimento cirúrgico, é importante ter conhecimento dos instrumentais cirúrgicos utilizados. A figura abaixo representa:

- a) Afastador de Farabeuf
- b) Afastador de Volkman
- c) Afastador de Finocchietto
- d) Pinça de Kocher
- e) Pinça de Backaus

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

162. (IBFC/2016/EBSERH)

O anestesiologista dispõe de várias técnicas anestésicas. Sobre a anestesia geral, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. Todas as drogas analgésicas causarão em um grau mais ou menos importante, os efeitos secundários da morfina, que são: depressão respiratória, sedação, náuseas e vômitos.

II. A narcose pode ser obtida por duas vias de administração diferentes, que podem ser associadas: inalação ou intravenosa.

III. Certas intervenções exigem um relaxamento muscular completo ou uma imobilidade perfeita e para obtê-la, o anestesiologista dispõe de um grande número de miorelaxantes ou curares.

IV. O único analgésico que pode ser utilizado atualmente durante uma anestesia geral é o fentanil.

- a) I e II, apenas
- b) I, II, III e IV
- c) II e IV, apenas
- d) I, apenas
- e) I, II e III, apenas

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

163. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre as cirurgias do ânus, assinale a alternativa correta.

a) Para a cirurgia de hemorroidas, o paciente deve estar em posição de perineostomia, as nádegas ultrapassando o plano da mesa.

b) Na cirurgia de hemorroidas, uma pinça Kelly reta é colocada em cada hemorroida de modo a colocá-la de volta no reto.

c) Para as cirurgias de fistulas anais, o paciente deve estar em posição de Sims.

d) Alguns tumores pediculados, mas igualmente os sésseis, não podem ser removidos por via baixa.

e) Para realizar exérese dos tumores benignos do reto por via baixa, o paciente deve ser colocado em posição de Fowler.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

164. (IBFC/2016/EBSERH)

Muitos são os materiais usados em Centros Cirúrgicos. Assinale a alternativa que contemple o nome da pinça mostrada na figura abaixo.

- a) Pinça Bergeret
- b) Pinça Kelly Curva
- c) Pinça de Farabeuf
- d) Pinça Deakey
- e) Pinça Kocher Reta

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

165. (IBFC/2016/EBSERH)

A traqueostomia é um procedimento cirúrgico realizado em situação de emergência ou programado, que consiste em uma abertura na traqueia para colocação de uma cânula que ajuda na passagem do ar. Sobre os cuidados específicos de enfermagem no pós-operatório, assinale a alternativa correta:

- a) Nunca desinsuflar o balonete das cânulas descartáveis.
- b) Manter o ambiente limpo e seco, ou seja, não umidificar o local.
- c) Colocar o paciente em posição de trendelenburg reversa para facilitar a ventilação, minimizar a ocorrência de edema no local da cirurgia.
- d) Monitorar a frequência respiratória e a traqueostomia para detectar sangramentos que possam dificultar a respiração.
- e) A cânula metálica interna deve ser trocada ou limpa ao menos uma vez por semana.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

166. (IBFC/2016/EBSERH)

O tratamento da catarata é unicamente cirúrgico e está indicado quando o paciente passa a ter limitações para realizar suas atividades habituais, comprometendo sua qualidade de vida. Sobre os cuidados específicos de enfermagem no pós-operatório, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Utilizar os colírios prescritos pelo cirurgião após a retirada do curativo.
- () Evitar o contato direto com a água, realizando a higiene conforme recomendado pelo cirurgião.
- () Minimizar a exposição do olho operado a ambientes poluídos, poeiras e vapores.
- () Não há necessidade de reduzir as atividades físicas e tarefas domésticas.

- a) V,V,V,F
- b) V,F,V,F
- c) F,V,F,V
- d) V,V,V,V
- e) V,F,V,V

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

167. (IBFC/2016/EBSERH)

O serviço de saúde que realiza mais de quinhentas cirurgias/mês, excluindo partos, deve constituir um Comitê de Processamento de Produtos para Saúde (CPPS). Assinale a alternativa correta.

- a) Composto minimamente, por um representante: da diretoria do serviço de saúde; responsável pelo Centro de Material e Esterilização (CME); do serviço de enfermagem; da equipe médica; e da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar).
- b) Composto exclusivamente por profissionais do Centro de Material e Esterilização (CME) e da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar).
- c) Composto por três representantes: responsável pelo Centro de Material e Esterilização (CME); do serviço de enfermagem; e da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar).
- d) Composto por no máximo representantes do serviço de enfermagem; da equipe médica; do setor de compras; e da farmácia.
- e) Composto exclusivamente por representantes do Centro de Material e Esterilização (CME) e do serviço de enfermagem.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

168. (IBFC/2016/EBSERH)

As cirurgias são classificadas em cirurgias de emergência, de urgência e eletivas. Considerando os conceitos, assinale a alternativa que apresenta cirurgias de urgência:

- a) Hemorragias e perfuração de vísceras por trauma.
- b) Ferimento por arma branca ou arma de fogo.
- c) Cirurgias de abdome agudo inflamatório e retirada de tumores.
- d) Cirurgias de varizes de membros inferiores e de adenoide.
- e) Hemorragias e ferimento por arma branca.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

169. (IBFC/2016/EBSERH)

Correlacione a primeira coluna com a segunda coluna, enumerando de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.

- (A) Colectomia
- (B) Orquiectomia
- (C) Histeropexia.
- (D) Colectomia
- (E) Esplenectomia

() Remoção total ou parcial do cólon.

() Suspensão e fixação do útero à parede abdominal.

() Remoção da vesícula biliar.

() Remoção do baço.

() Extirpação de um ou dos dois testículos.

- a) A,C,D,E,B
- b) D,C,A,E,B
- c) A,B,D,C,E
- d) D,C,A,B,E
- e) E,D,C,B,A

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

170. (IBFC/2016/EBSERH)

Assinale a alternativa que apresenta os materiais utilizados para diálise:

a) Afastador de Doyen, Afastador de Volkmann, Afastador de Farabeuf, Afastador de Gosset, Afastador de Finocchietto, Pinça de Kocher e Pinça de Backaus.

b) Pinça de Kelly, Pinça de Halsted curva, Pinça de Halsted reta e Pinça de Allis.

c) Porta agulhas de Mathiew, Agulhas, Porta agulhas de Hegar, Pinça dente de rato e Pinça anatômica.

d) Tesoura de Mayo curva, Afastador de Doyen, Pinça de Halsted curva, Pinça dente de rato e Tesoura para fios.

e) Bisturi, Tesoura de Mayo curva, Tesoura de Mayo reta, Tesoura para fios, Tesoura de Metzbaum e Tesoura de Potts.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Doenças Crônicas Não Transmissíveis

171. (CESPE/2018/EBSERH)

Com relação à diálise com circulação extracorpórea, julgue o item subsequente. A anticoagulação extracorpórea com enoxaparina deve ser realizada em todos os casos de diálise com circulação extracorpórea, pelo baixo risco de evento adverso.

- c) CERTO
- e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

172. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item a seguir, acerca de lesão renal aguda (LRA). No paciente com LRA, os valores de creatinina sérica chegam a aumentar de 1,5 a 1,9 vezes o valor basal ou atingem, pelo menos, 0,3 mg/dL acima do valor absoluto de creatinina.

- c) CERTO
- e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

173. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item a seguir, acerca de lesão renal aguda (LRA). Por um período de seis horas, os valores do fluxo urinário de pacientes com LRA geralmente são iguais ou maiores que 1 mL/kg/h.

- c) CERTO
- e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

174. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item a seguir, acerca de lesão renal aguda (LRA). O estadiamento da lesão renal aguda pode ser realizado de acordo com as variações de creatinina em um período de 48 horas ou conforme haja redução do ritmo de filtração glomerular em sete dias.

- c) CERTO
- e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

175. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item a seguir, acerca de lesão renal aguda (LRA).

A hipovolemia é a principal causa da lesão renal pós-renal.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

176. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item a seguir, acerca de lesão renal aguda (LRA). A lipocalina associada à gelatinase neutrofílica (NGAL) é utilizada como marcador biológico de lesão renal, por ser uma molécula proteica predominantemente expressa na parte distal do néfron lesionado.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

177. (CESPE/2018/EBSERH)

Com relação à diálise com circulação extracorpórea, julgue o item subsequente.

O acesso vascular indicado ao paciente com insuficiência renal crônica é realizado por cateteres venosos de duplo lúmen, por via percutânea em veia jugular interna, subclávia ou femoral.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

178. (CESPE/2018/EBSERH)

Com relação à diálise com circulação extracorpórea, julgue o item subsequente.

Os valores de pH menor que 7,1, sódio plasmático superior a 160 mEq/L ou inferior a 115 mEq/L e potássio maior que 6,5 mEq/L são indicativos de diálise com circulação extracorpórea.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

179. (CESPE/2018/EBSERH)

Com relação à diálise com circulação extracorpórea, julgue o item subsequente. Em UTI, os métodos dialíticos contínuos possibilitam o manejo de pacientes hemodinamicamente instáveis.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

180. (CESPE/2018/EBSERH)

Com relação à diálise com circulação extracorpórea, julgue o item subsequente.

Na anticoagulação com citrato trissódico a 4%, o valor sérico de cálcio iônico pós-filtro deve estar entre 0,25 mmol/L e 0,35 mmol/L, e o valor do cálcio iônico, entre 1,1 mmol/L e 1,29 mmol/L.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

181. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito de infecção em serviços de diálise, julgue o item que se segue.

A saída de secreção purulenta não é, isoladamente, indicativo de sinal clínico de infecção do acesso vascular, sendo necessário, nesses casos, primeiramente avaliar o hemograma do paciente.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

182. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito de infecção em serviços de diálise, julgue o item que se segue.

A água captada da rede de fornecimento pública para a hemodiálise deve ser insípida, incolor e inodora, com pH de 6,0 a 9,5.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

183. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito de infecção em serviços de diálise, julgue o item que se segue. O profissional que não tenha apresentado soroconversão após a vacinação contra o vírus da hepatite B é proibido de atuar na sessão de hemodiálise e no processamento de dialisadores e das linhas arterial e venosa de pacientes com sorologia positiva para hepatite B.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

184. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito de infecção em serviços de diálise, julgue o item que se segue.

Os dialisadores podem ser utilizados para o mesmo paciente por, no máximo, dez vezes, após esse dialisador ser submetido ao processamento automático, observando-se a medida mínima permitida do volume interno das fibras.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

185. (CESPE/2018/EBSERH)

No que se refere à assistência de enfermagem ao paciente com lesão renal aguda (LRA), julgue o próximo item. Pressão arterial média maior que 65 mmHg viabiliza a perfusão renal.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

186. (CESPE/2018/EBSERH)

No que se refere à assistência de enfermagem ao paciente com lesão renal aguda (LRA), julgue o próximo item.

É recomendada a avaliação do débito urinário do paciente a cada 24 horas, para identificação precoce de alteração da função renal.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

187. (CESPE/2018/EBSERH)

No que se refere à assistência de enfermagem ao paciente com lesão renal aguda (LRA), julgue o próximo item. A peritonite é uma das complicações frequentes em diálise peritoneal, por isso é inviável a realização desse procedimento em domicílio.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

188. (CESPE/2018/EBSERH)

No que se refere à assistência de enfermagem ao paciente com lesão renal aguda (LRA), julgue o próximo item.

Nas hemodiálises sem anticoagulação, recomenda-se a lavagem do sistema extracorpóreo com 100 mL a 200 mL de solução fisiológica a 0,9%, em intervalos de trinta minutos.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

189. (CESPE/2018/EBSERH)

Com relação à diálise com circulação extracorpórea, julgue o item subsequente.

Fluxo de sangue de 300 mL/min a 350 mL/min e dialisato de 500 mL/min a 800 mL/min são parâmetros da hemodiálise em pacientes críticos.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

190. (IBFC/2017/EBSERH)

Sobre a Síndrome Nefrítica Aguda, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. É caracterizada por alterações inflamatórias difusas no glomérulo, que se manifestam, clinicamente, pelo início abrupto de hematuria e proteinúria leve e, frequentemente, hipertensão, edema e azotemia.

II. A intoxicação ocupacional aguda por solventes, particularmente pelos hidrocarbonetos alifáticos halogenados, pode cursar como síndrome nefrítica aguda.

III. O tetracloreto de carbono (CCl₄) é o composto mais frequentemente responsável por esse quadro.

IV. O quadro clínico é caracterizado por hematuria assintomática e proteinúria leve, as formas exuberantes de nefrite não ocorrem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV
- b) I, II e IV, apenas
- c) I, II e III, apenas
- d) II e III, apenas
- e) II, III e IV, apenas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

191. (IBFC/2016/EBSERH)

As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) são doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração, elas são consideradas um grave problema de saúde pública. Assinale a alternativa incorreta.

- a) A Doença coronariana é uma DCNT.
- b) A Doença renal crônica é uma DCNT.
- c) A Doença vascular periférica é uma DCNT.
- d) O Câncer é uma DCNT.
- e) A Hanseníase é uma DCNT.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

192. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Dona Helena, 66 anos, obesa, diabética e hipertensa, apresentou, em seu último ultrassom renal, rins policísticos. Com esse histórico, a paciente está propensa a apresentar um quadro de:

- a) lúpus eritematoso sistêmico.
- b) doença renal crônica.
- c) hemofilia.
- d) pancreatite.
- e) cirrose.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

193. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Quanto aos cuidados de enfermagem no Edema Agudo de Pulmão, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() Manter paciente sentado com as pernas fle-tidas.

() Administrar Oxigênio (O₂), sob conduta mé-dica.

() Verificar acesso venoso e puncionar veia ca-librosa.

() Instalar oximetria de pulso e verificar sinais vi-tais.

() Não há necessidade de preparar material de entubação.

- a) F – V – V – V – F.
- b) F – V – V – F – F.
- c) V – F – V – V – F.
- d) V – V – F – V – V.
- e) V – V – V – V – F.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

194. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O Plano de Ações Estratégicas para o Enfren-tamento das doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022 tem como objetivo prevenir e controlar seus fatores de risco e forta-lecer os serviços de saúde voltados para a aten-ção aos portadores de doenças crônicas.

Das alternativas apresentadas a seguir, qual apresenta um fator de risco para as DCNT?

- a) Doenças do aparelho circulatório.
- b) Câncer.
- c) Diabetes.
- d) Doenças respiratórias crônicas.
- e) Tabagismo.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

195. (AOCP/2015/EBSERH)

As máquinas de hemodiálise devem apresentar um desempenho que resulte na eficiência do tratamento e na minimização dos riscos para os pacientes e operadores. Para tanto, as máquinas devem possuir todos os dispositivos a seguir, ex-ceto:

- a) controlador de temperatura corporal do pa-ciente e manguito de pressão.
- b) detector de ruptura do dialisador e suspensão automática do funcionamento da bomba de san-gue.
- c) monitor contínuo da condutividade da vazão da solução, com alarmes sonoros e visuais.

d) monitor de pressão de linha venosa e arterial.

e) proteção contra operação em modo de diálise quando estiver em modo de desinfecção.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

196. (AOCP/2015/EBSERH)

Os pacientes renais crônicos apresentam elevado risco de fraturas ósseas e, entre os fatores que justificam esse risco aumentado, estão, exceto:

- a) fraqueza muscular.
- b) hipotensão pós-hemodiálise.
- c) neuropatia diabética.
- d) distúrbios visuais.
- e) hipertensão pós-hemodiálise.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

197. (AOCP/2015/EBSERH)

Paciente feminina de 25 anos, portadora de Diabetes Mellitus, iniciou treinamento para diálise peritoneal (DP) e apresenta algumas dúvidas em relação ao procedimento. Qual das alternativas a seguir está correta em relação às complicações da DP?

- a) A atividade sexual está contraindicada.
- b) A infecção de óstio de saída do cateter só pode ser tratada com retirada do mesmo.
- c) O uso de solução com dextrose pode levar a um descontrole glicêmico.
- d) A DP é contraindicada para gestantes.
- e) A peritonite bacteriana pode ser evitada com uso de mupiricina no óstio do cateter.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

198. (AOCP/2015/EBSERH)

Em relação ao procedimento de punção de fístula artério-venosa para sessão de hemodiálise, podemos afirmar que os seguintes cuidados e orientações são necessários, exceto:

- a) o uso de luvas pela enfermagem é facultativo no caso de alergia ao material da luva (látex).
- b) o paciente deve ser orientado a lavar o membro a ser punccionado com água e sabão.

c) o local da punção não deve apresentar sinais flogísticos evidentes.

d) a distância entre as punções deve ser respeitada, evitando recirculação sanguínea.

e) a assepsia com álcool 70% deve obrigatoriamente ser realizada antes da punção.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

199. (AOCP/2015/EBSERH)

Paciente de 40 anos, vítima de acidente automobilístico, foi submetido a procedimentos cirúrgicos com necessidade de infusão de grande quantidade de líquidos e transfusão sanguínea, além de monitorização em ambiente de UTI. Em relação ao volume de diurese e indicação de diálise, podemos afirmar que:

- a) pacientes que mantêm diurese maior que 1000 mL/24 horas não tem indicação de hemodiálise, independente de outros parâmetros.
- b) pacientes com pressão arterial invasiva menor que 60mmHg não apresentam condição para diálise por qualquer modalidade.
- c) os critérios de diagnóstico da lesão renal aguda são baseados em exames laboratoriais, mas o volume de diurese também deve ser considerado.
- d) pacientes em ambiente de UTI não podem ser submetidos à diálise peritoneal automatizada.
- e) os procedimentos de hemodiálise contínua não podem ser usados em pacientes críticos, pela necessidade de anticoagulação contínua.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

200. (AOCP/2015/EBSERH)

Paciente iniciando programa de hemodiálise apresenta a seguinte sorologia para hepatites virais:

AgHbs-negativo / AntiHbsAg- positivo/
AntiHCV- negativo / AntiHIV- negativo

Em relação à sala adequada para diálise desse paciente e reuso de seu dialisador, podemos afirmar que:

a) esse paciente deve dialisar em sala branca (sem hepatite), visto que já tem imunidade contra vírus o hepatite B.

b) esse paciente deve ter todo material (linhas e dialisador) descartável, visto que não tem sorologia definida.

c) o paciente pode ser dialisado em sala junto com pacientes portadores de HIV, e o reuso desses pacientes (com HIV e hepatite B) também pode ser compartilhado.

d) o paciente deve ser vacinado antes de iniciar programa de diálise.

e) todo material (linhas e dialisador) deve ser reutilizado por apenas 15 vezes, independente da forma de reuso.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

201. (AOC/P/2015/EBSEH)

As intercorrências durante as sessões de hemodiálise crônica ocorrem por várias causas. Dentre as citadas a seguir, assinale a alternativa incorreta.

a) O reuso dos hemodialisadores pode ser causa de choques anafiláticos, tanto por contaminação com substâncias esterilizadoras quanto bactérias ou endotoxinas.

b) A síndrome do desequilíbrio inclui manifestações como náuseas, vômitos, agitação e cefaleia, que ocorrem durante, ou mesmo após, a sessão de diálise.

c) As causas mais comuns de hipotensão são relacionadas ao decréscimo excessivo e rápido da volemia.

d) A hipertensão durante as sessões de diálise podem ser tratadas aquecendo o dialisato acima de 37 °C.

e) A hipoglicemia pode ser contornada com uso de soluções de diálise com glicose.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

202. AOC/P/2015/EBSEH)

As principais causas de falência renal terminal no Brasil são, respectivamente:

a) hipertensão arterial, diabetes mellitus e glomerulopatias.

b) diabetes mellitus, uso de anti-inflamatórios e hipertensão arterial.

c) infecções urinárias de repetição, diabetes mellitus e hipertensão arterial.

d) cálculos renais, baixa ingestão hídrica e diabetes mellitus.

e) uso de anti-inflamatórios, cálculos urinários e glomerulopatias.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

203. (INSTITUTO AOC/P/2015/EBSEH)

De acordo com a estratificação de risco da população com DRC (Doença Renal Crônica), pela Portaria 389 de 13 de março de 2014, qual exame laboratorial serve de referência para classificação do estágio clínico do paciente?

a) Taxa de Filtração Glomerular (TFG).

b) Ureia.

c) Creatinina.

d) Potássio.

e) Hemograma.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

204. (INSTITUTO AOC/P/2015/EBSEH)

Quais estágios de DRC são considerados pré-diálise?

a) Estágios 4 e 5.

b) Estágios 1 e 5.

c) Estágios 3 e 4.

d) Estágios 2 e 5.

e) Estágios 3 e 5.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

205. (INSTITUTO AOC/P/2015/EBSEH)

À Unidade Especializada em DRC com TRS (Terapia Renal Substitutiva) diálise, responsável pela atenção de Média e Alta Complexidade, compete:

a) manter o paciente em tratamento conservador.

b) ofertar as modalidades (Hemodiálise, Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua, Diálise Peritoneal Intermitente e Transplante Renal).

c) ofertar as modalidades (Hemodiálise, Transplante Renal).

d) ofertar pelo menos uma modalidade de TRS.

e) ofertar as modalidades (Hemodiálise, Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua e Diálise Peritoneal Intermitente).

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

206. INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A fístula arteriovenosa é o acesso definitivo para pacientes em Hemodiálise. Em qual estágio os pacientes em tratamento conservador devem ser submetidos à confecção dessa fístula?

- a) Quando a TFG for < que 20 ml/min.
- b) Quando a TFG for < que 15 ml/min.
- c) Quando a TFG for < que 10 ml/min.
- d) Quando o paciente apresentar sintomas de Uremia.
- e) Quando o paciente apresentar taxa elevada de K.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

207. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

De acordo com a tabela de incrementos nos procedimentos financeiros no Componente Serviço Ambulatorial (SA), quantas sessões de hemodiálise são autorizadas por semana para pacientes adultos?

- a) No máximo 4 sessões.
- b) No máximo 5 sessões.
- c) No máximo 3 sessões.
- d) No máximo 2 sessões.
- e) Quantas sessões forem necessárias.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

208. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

No quesito Controle de Qualidade dos Dialisadores, o que significa “Priming”?

- a) Tipo de membrana do dialisador.
- b) Determinação do volume interno dos capilares do dialisador.
- c) Nome do funcionário responsável pelo reuso do dialisador.
- d) Número de vezes em que o dialisador foi reutilizado.
- e) Nome do produto esterilizante do dialisador.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

209. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Ainda sobre Controle de Qualidade dos Dialisadores, quantas vezes o dialisador e as linhas de sangue podem ser reutilizados, quando o processamento for automatizado?

- a) 12 vezes.
- b) 10 vezes.
- c) 20 vezes.
- d) 5 vezes.
- e) Nenhuma vez.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

210. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Após a medida do volume interno das fibras, qual resultado torna obrigatório o descarte do dialisador?

- a) Redução superior a 20%.
- b) Redução superior a 10%.
- c) Redução superior a 15%.
- d) Redução superior a 25%.
- e) Redução superior a 5%.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

211. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Segundo a Portaria nº 389 de 13 de Março de 2014, a Unidade Especializada em DRC (Doença Renal Crônica) deverá ter a seguinte equipe mínima:

- a) Médico Nefrologista, Enfermeiro, Assistente Social.
- b) Médico Nefrologista, Enfermeiro, Assistente Social e Técnico de Enfermagem.
- c) Médico Nefrologista, Enfermeiro, Psicólogo.
- d) Médico Nefrologista, Enfermeiro, Nutricionista, Psicólogo e Assistente Social.
- e) Médico Nefrologista e Enfermeiro.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Legislação em Saúde

212. (CESPE/2018/EBSERH)

Em relação à gestão da qualidade dos recursos humanos de enfermagem, julgue o item seguinte.

O dimensionamento do quadro de profissionais da enfermagem nas unidades de internação considera os tipos de cuidados exigidos pelos pacientes. Os pacientes de cuidados intermediários são os que necessitam de cuidados durante as 24 h do dia, sendo 4 h de enfermagem; e recomenda-se que pelo menos 20% do efetivo sejam os enfermeiros e os demais, técnicos ou auxiliares.

- c) CERTO
- e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

213. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue o item a seguir.

Por ser bipartido entre a União e os estados, o financiamento do SUS contribui para o fortalecimento da atenção básica em saúde.

- c) CERTO
- e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

214. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue o item a seguir.

Aos municípios são disponibilizados instrumentos técnicos e pedagógicos facilitadores do processo de formação e educação permanente dos membros das equipes de gestão e de atenção em saúde.

- c) CERTO
- e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

215. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue o item a seguir.

É denominado Unidade Básica de Saúde (UBS) todo estabelecimento de saúde que preste ações e serviços de atenção básica no âmbito do SUS.

- c) CERTO
- e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

216. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue o item a seguir.

Apoiar e estimular a adoção da estratégia saúde da família como forma prioritária de expansão, consolidação e qualificação da atenção básica consistem em responsabilidades restritas às esferas de governo estadual e municipal.

- c) CERTO
- e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

217. (CESPE/2018/EBSERH)
Acerca da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue o item a seguir. A PNAB resultou da experiência acumulada por um conjunto de atores — como movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas de governo — envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do SUS.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

218. (CESPE/2018/EBSERH)
No que se refere ao SUS, julgue o item subsequente.
Um acontecimento determinante que influenciou a criação do SUS foi a Conferência Nacional de Reforma da Psiquiatria, realizada em 1986, em Brasília.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

219. (CESPE/2018/EBSERH)
No que se refere ao SUS, julgue o item subsequente.
A Lei n.º 8.142/1990 dispõe sobre a participação popular no SUS e estabelece que o conselho de saúde tenha caráter permanente e deliberativo.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

220. (CESPE/2018/EBSERH)
No que se refere ao SUS, julgue o item subsequente. No período anterior à criação do SUS, o sistema público de saúde prestava assistência apenas aos trabalhadores vinculados à previdência social, cabendo às entidades filantrópicas o atendimento aos demais cidadãos.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

221. (CESPE/2018/EBSERH)
No que se refere ao SUS, julgue o item subsequente. O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, entidade representativa dos entes municipais na Comissão Intergestora Tripartite, trata de matérias referentes à saúde.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

222. (CESPE/2018/EBSERH)
No que se refere ao SUS, julgue o item subsequente. A fim de propiciar e melhorar o controle social do SUS, está prevista, para a administração sistema, a participação da sociedade nos conselhos de saúde; nestes, a representação total deve ser de 75% de trabalhadores de saúde e 25% de prestadores de serviços (públicos e privados).

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

223. (CESPE/2018/EBSERH)
De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, Portaria n.º 1.820/2009, julgue o próximo item.

Não é permitido ao paciente internado o recebimento de visita de outros profissionais de saúde que não pertençam à unidade hospitalar da internação.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

224. (CESPE/2018/EBSERH)
De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, Portaria n.º 1.820/2009, julgue o próximo item.
Não é permitido ao paciente internado o recebimento de visita de outros profissionais de saúde que não pertençam à unidade hospitalar da internação.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

225. (CESPE/2018/EBSERH)

De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, Portaria n.º 1.820/2009, julgue o próximo item. Toda pessoa tem direito ao sigilo e à confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, salvo nos casos de risco à saúde pública.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

226. (IBFC/2017/EBSERH)

A Constituição de 1988 incorpora um conceito mais abrangente de saúde. Assinale a alternativa correta que contempla um exemplo de fator determinante e condicionante de saúde relacionado ao meio físico.

- a) Educação
b) Ocupação
c) Água
d) Idade
e) Sexo

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

227. (IBFC/2016/EBSERH)

O Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal deve possuir equipamentos, materiais e medicamentos de acordo com sua complexidade e necessidade de atendimento à demanda. De acordo com Regulamento

Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal, os serviços que prestam assistência ao parto normal sem distócia, devem ter disponíveis os seguintes equipamentos e materiais:

- a) Glicosímetro; material para cateterismo vesical; e instrumental para cesariana.
b) Bisturi elétrico; instrumental para histerectomia; material anestésico.
c) Oxímetro de pulso; bomba de infusão; e monitor cardíaco.
d) Aspirador; mesa para parto cirúrgico; e foco cirúrgico de teto.

e) Estetoscópio de Pinard ou sonar (detector fetal); amnioscópio; e instrumental para exame ginecológico, incluindo espéculo vaginal e pinça de Cheron.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

228. (IBFC/2016/EBSERH)

De acordo com Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal, é correto afirmar que:

- a) Enfermaria de alojamento conjunto é o ambiente destinado à assistência à puérpera e seu recém nascido, após a primeira hora de dequitação, com capacidade de 06 (seis) a 08 (oito) leitos e berços, com banheiro anexo.
b) Quarto PPP é o ambiente com capacidade para até 03 (três) leitos e banheiro anexo, destinado à assistência à mulher, durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato (primeira hora após a dequitação).
c) Quarto de alojamento conjunto é o ambiente destinado à assistência à puérpera e seu recém-nascido, após a primeira hora de dequitação, com capacidade para 01(um) ou 02 (dois) leitos e berços, com banheiro anexo.

d) Quarto PPP é o ambiente com capacidade para até 02 (dois) leitos e banheiro anexo, destinado à assistência à mulher exclusivamente durante o trabalho de parto.

e) Quarto de alojamento conjunto é o ambiente destinado à assistência à puérpera e seu recém-nascido, após três horas do parto, com capacidade para até 04 leitos e berços, com banheiro anexo.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

229. (IBFC/2016/EBSERH)

Assinale a alternativa que contemple uma doutrina do Sistema Único de Saúde (SUS).

- a) Descentralização.
b) Regionalização.
c) Hierarquização.
d) Resolubilidade.
e) Integralidade.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

230. (IBFC/2016/EBSERH)

A Rede de Atenção às Urgências, descrita na Portaria nº 1.600 de 07 de Julho de 2011, é constituída por alguns componentes. O componente _____ objetiva aglutinar esforços para garantir a integralidade na assistência em situações de risco ou emergenciais para populações com vulnerabilidades específicas e/ou em regiões de difícil acesso, pautando-se pela equidade na atenção, considerando-se seus riscos.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

a) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências.

b) Atenção Básica em Saúde.

c) Sala de Estabilização.

d) Força Nacional de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

e) Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

231. (IBFC/2016/EBSERH)

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, obedecendo diversos princípios. O conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do Sistema é denominado:

a) Integralidade da assistência.

b) Universalidade de acesso.

c) Equidade da assistência à saúde.

d) Descentralização político-administrativa.

e) Autonomia.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

232. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

() Participação e controle social, que compreendem a ampliação da representação e da inclusão de sujeitos na elaboração de políticas públicas e nas decisões relevantes que afetam a vida dos indivíduos, da comunidade e dos seus contextos.

() Gestão, entendida como a necessidade de priorizar os processos autocráticos e deliberativos de regulação e controle, planejamento, monitoramento, avaliação e financiamento, com a finalidade de agilizar os resultados.

() Educação e formação, enquanto incentivo à atitude permanente de aprendizagem sustentada em processos pedagógicos problematizadores, dialógicos, libertadores, emancipatórios e críticos.

() Vigilância, monitoramento e avaliação, enquanto uso de múltiplas abordagens na geração e análise de informações sobre as condições de saúde de sujeitos e grupos populacionais, visando subsidiar decisões, intervenções e implantar políticas públicas de promoção da saúde.

a) F,F,F,F

b) V,V,V,V

c) F,V,F,V

d) V,F,V,V

e) F,F,V,F

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

233. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática as diretrizes do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Os princípios e diretrizes que não regem essa prática (PNH) são:

a) a transversalidade.

b) a gestão participativa e a cogestão.

c) a dissociabilidade entre atenção e gestão.

d) o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos.

e) a ambiência.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

234. (IBFC/2016/EBSERH)

As práticas de educação em saúde no SUS compreendem:

a) Ações desenvolvidas pelos movimentos sociais e populares para a qualificação da participação social e reconhecimento do saber popular em saúde.

b) Relações entre sujeitos sociais que portam diferentes saberes e ocupam diferentes espaços. São práticas dialógicas, estratégicas, participativas, mediadas pela ação comunicativa entre os participantes, podendo ser mais ou menos formalizadas.

c) Dimensões vinculadas à doença e à prescrição de normas, sendo consideradas estratégias básicas para a promoção da saúde.

d) Ações de institucionalização de espaços de participação, desenvolvimento de mecanismos democráticos de gestão e formação de gestores para a gestão estratégica e participativa.

e) Eventos e ações de conscientização e luta pelo direito universal à saúde.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

235. (IBFC/2016/EBSERH)
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

a) O SUS é o sucessor do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).

b) É uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição de 1988.

c) O SUS é o sucessor do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS).

d) O SUS não segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional, ou seja, existem diferenças dentre as regiões brasileiras.

e) O SUS é um serviço ou uma instituição com finalidade distinta.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

236. IBFC/2016/EBSERH)

Sobre os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. No município, o único gestor é o secretário municipal de saúde.

II. No estado, o gestor é o secretário estadual de saúde.

III. No nível federal, o gestor é o Ministério da Saúde.

IV. No nível federal, cabe aos gestores programar, executar e avaliar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Isto significa que o governo federal deve ser o primeiro e o maior responsável pelas ações de saúde para a sua população.

a) II, III e IV, apenas

b) I, II, III e IV

c) I, II e III, apenas

d) II e III, apenas

e) I e IV, apenas

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

237. (IBFC/2016/EBSERH)
Sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. O PNSP tem por objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional.

II. O Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP) é composto por representantes apenas do Ministério da Saúde.

III. O Ministério da Saúde instituirá incentivos financeiros para a execução de ações e atividades no âmbito do PNSP, conforme normatização específica, mediante prévia pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

IV. Segurança do Paciente é a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.

a) I, II e III, apenas

b) I, II, III e IV

c) I apenas

d) I, III e IV, apenas

e) I e IV, apenas

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

238. (IBFC/2016/EBSERH)

A Portaria número 963, de 27 de maio de 2013, redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a composição mínima das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) do tipo 1, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() Profissionais médicos, com somatório de carga horária semanal (CHS) de, no mínimo, 40 (quarenta) horas de trabalho.

() Profissional enfermeiro, com CHS de, no mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho.

() Profissional fisioterapeuta e/ou assistente social, com somatório de CHS de, no mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho.

() Auxiliares/técnicos de enfermagem, com somatório de CHS de, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas de trabalho.

- a) F,V,F,V
- b) V,V,V,V
- c) V,F,V,V
- d) V,F,V,F
- e) F,V,V,V

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

239. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando a Resolução de nº 15, de 15 de Março de 2012, em relação ao tipo da qualificação que é a evidência documentada, fornecida pelo fabricante ou distribuidor, de que o equipamento foi entregue e instalado, de acordo com as suas especificações. Assinale a alternativa correta:

- a) Qualificação da instalação.
- b) Qualificação de operação.
- c) Qualificação de intervenção.
- d) Qualificação de desempenho.
- e) Qualificação de funcionamento.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

240. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

A Lei Complementar nº 141/ 2012 foi um avanço para as conquistas do Sistema Único de Saúde porque:

a) dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde.

b) altera a forma de repasse financeiro para o SUS, extinguindo os fundos de saúde.

c) define as bases para o decreto 7508 que regulamentava a lei orgânica de saúde 8080/90.

d) aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica.

e) regulamenta o exercício da Enfermagem e prescrição de medicamentos de interesse coletivo no SUS.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

241. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

O acolhimento, como ato ou efeito de acolher, expressa uma ação de aproximação, uma atitude de inclusão, de estar em relação com algo ou alguém. É por isso que o acolhimento é caracterizado como uma das diretrizes de maior relevância política, ética e estética da Política Nacional de Humanização (PNH) da Atenção e Gestão do SUS. Sendo assim, responda qual das alternativas a seguir representa uma característica estética da PNH?

a) Refere-se à invenção de estratégias, nas relações e encontros do dia a dia que contribuem para a dignificação da vida e do viver e, assim, para a construção de nossa própria humanidade.

b) Refere-se ao compromisso com o reconhecimento do outro, na atitude de acolhê-lo em suas diferenças, dores, alegrias, modos de viver, sentir e estar na vida.

c) Implica o compromisso coletivo de envolver-se nesse “estar com”, potencializando protagonistas e vida nos diferentes encontros.

d) Implica mudanças no cotidiano do indivíduo como plano ao mesmo tempo de reprodução, de experimentação e de invenção de modos de vida.

e) Refere-se à indissociabilidade entre o modo de nos produzirmos como sujeitos e os modos de estarmos nos “verbos da vida” (trabalhar, viver, amar, sentir, produzir saúde, etc.).

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

242. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando as marcas específicas com a implementação da Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão no Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() Serão reduzidas as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco.

() Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde e os serviços de saúde que se responsabilizarão por sua referência territorial.

() As informações ao usuário, o acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha) e os direitos do código dos usuários do SUS serão garantidos pelas unidades de saúde.

() As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários bem como a educação permanente.

Marque a alternativa correta:

- a) V,V,V,F.
- b) V,V,F,V.
- c) V,F,F,V.
- d) V,V,V,V.
- e) F,V,F,V.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

243. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Assinale a alternativa correta.

a) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso preferencial aos mais pobres às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

b) O dever do Estado de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

c) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

d) As fundações mantidas pelo Poder Público e a Administração Pública Indireta não fazem parte do Sistema Único de Saúde.

e) A iniciativa privada deverá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter complementar.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

244. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Assinale a alternativa que não apresenta um princípio e diretrizes do Sistema Único de Saúde:

a) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

b) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos

c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

d) Participação da comunidade.

e) O atendimento prioritário aos pobres, das crianças e mulheres.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

245. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Assinale a alternativa correta:

a) Rede de Atenção à Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade decrescentes, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

b) Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de saúde específicos para atendimento da pessoa, que posteriormente ressarcirão financeiramente o Sistema Único de Saúde.

c) Região de Saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.

d) Mapas da Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, económicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planeamento e a execução de ações e serviços de saúde.

e) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica são os documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

246. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Sobre a Seguridade Social, assinale a alternativa correta:

a) A seguridade social compreende um conjunto de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

b) Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base, exclusivamente, na seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

c) A seguridade social tem como objetivo dar cobertura preferencial aos mais pobres.

d) A seguridade social será financiada por toda a sociedade, incidindo contribuição sobre aposentadoria.

e) Não haverá incidência de contribuição social sobre a receita de concursos de prognósticos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

247. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Quanto aos serviços privados de assistência à saúde, assinale a alternativa correta:

a) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, não serão observadas as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde quanto às condições para seu funcionamento.

b) Não é permitida, em nenhuma hipótese, a participação direta de capital estrangeiro na assistência à saúde.

c) O Sistema Único de Saúde deverá sempre prover cobertura assistencial à população, não podendo recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

d) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde, aprovados no Conselho Nacional de Saúde.

e) Os administradores de entidades contratadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) podem exercer cargo de chefia no SUS;

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

248. (AOCP/2015/EBSERH)
Nos termos do Art. 15 do Decreto nº 94.406/1987, na administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito Federal e dos Territórios, será exigida como condição essencial para provimento de cargos e funções e contratação de pessoal de enfermagem, de todos os graus, a prova de inscrição:

- a) na Associação Brasileira de Enfermagem.
- b) na Associação de Medicina Intensiva Brasileira.
- c) no Conselho Federal de Enfermagem.
- d) no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região.
- e) no Conselho Municipal de Saúde.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

249. (AOCP/2015/EBSERH)
Em relação ao transporte de pacientes de unidades de diálise extra-hospitalar autônoma (satélite), quando no caso de intercorrências, assinale a alternativa correta:

a) Essas unidades devem dispor de serviço de remoção de pacientes que atenda aos requisitos da legislação em vigor, ou ainda contratar formalmente um prestador licenciado pela autoridade sanitária local.

b) Os pacientes dialíticos com intercorrência grave devem ser transportados até a UPA ou unidade básica de saúde, assegurando assim o seu atendimento.

c) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deve atender os chamados para atendimentos de intercorrências nas unidades de diálise prioritariamente.

d) Os serviços que não dispõem de serviço de remoção de pacientes em estado grave devem solicitar transporte, obrigatoriamente, pelo SAMU.

e) A responsabilidade de providenciar a internação de pacientes com complicações decorrentes da diálise é do enfermeiro do turno.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

250. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Na construção da Rede de Atenção à Saúde (RAS), devem ser observados os conceitos de integração vertical e horizontal. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta:

a) Os conceitos de integração vertical e horizontal vêm da teoria da aceitabilidade e estão associados à satisfação dos usuários quanto ao tipo de atendimento prestado e às concepções relativas às cadeias produtivas.

b) A integração vertical está relacionada ao tempo de espera para o atendimento, à conveniência de horários, à forma de agendamento e ao conforto dos ambientes para atendimento.

c) A integração horizontal consiste na articulação de diversas organizações ou unidades de produção de saúde responsáveis por ações e serviços de natureza diferenciada.

d) A integração horizontal é utilizada para otimizar a escala de atividades, ampliar a cobertura e a eficiência econômica na provisão de ações e serviços de saúde através de ganho de escala e escopo.

e) A integração vertical consiste na articulação ou fusão de unidades de serviços de saúde de mesma natureza ou especialidade.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

251. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Analisar as assertivas sobre as modelagens de acolhimento e assinale a alternativa que aponta as corretas

I. Acolhimento pela equipe de referência do usuário: em unidades com mais de uma equipe, o enfermeiro e/ou técnico de enfermagem de determinada equipe fica(m) na linha de frente do acolhimento, atendendo por demanda espontânea de todas as áreas/equipes da unidade.

II. Equipe de acolhimento do dia: a principal característica é que cada usuário é acolhido pelos profissionais de saúde de suas equipes de referência.

III. Acolhimento misto (equipe de referência do usuário + equipe de acolhimento do dia): estipula-se determinada quantidade de usuários ou horário até onde o enfermeiro de cada equipe acolhe a demanda espontânea.

IV. Acolhimento coletivo: no primeiro momento do funcionamento da unidade, toda equipe se reúne com os usuários que vieram à unidade de saúde por demanda espontânea e, nesse espaço coletivo, fazem-se escutas e conversas com eles.

Marque a opção correta:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II, III e IV.
- c) Apenas III e IV.
- d) Apenas I e IV.
- e) Apenas II e III.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

252. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Para que possam refletir os pontos de vista de toda a comunidade que representam, é importante que os Conselhos de Saúde sejam constituídos por membros dos diversos estratos sociais. Assinale a alternativa que apresenta a distribuição correta dos conselheiros de saúde.

a) 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% de prestadores de serviço (público e privado).

b) 25% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 50% de prestadores de serviço (público e privado).

c) 25% de usuários, 50% de trabalhadores da saúde e 25% de prestadores de serviço (público e privado).

d) 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% de prestadores de serviço público.

e) 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% de prestadores de serviço privado.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Urgência e emergência

253. (CESPE/2018/EBSERH)
Mariana, com setenta e seis anos de idade, apresenta, em atendimento hospitalar de emergência, forte dor precordial, em aperto, contínua, com irradiação para o pescoço, e leve tontura — segundo a paciente, há cerca de 30 min. Ela tem história de hipertensão arterial crônica e vem sendo acompanhada regularmente por seu cardiologista. No exame, Mariana encontra-se dispneica, agitada, com PA de 190 mmHg × 130 mmHg e oximetria de pulso em 92%. Acerca desse caso clínico, julgue o item a seguir. O quadro apresentado por Mariana pode ser corretamente classificado como uma urgência hipertensiva.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

254. (CESPE/2018/EBSERH)
Lúcia, técnica de enfermagem, foi chamada pelo acompanhante de André, um paciente com sessenta e três anos de idade, internado havia dois dias por conta de uma pneumonia. Ao chegar ao quarto de André, Lúcia percebeu que ele parecia não respirar. Com respeito a esse caso clínico, julgue o próximo item. Se for comprovada parada cardiorrespiratória, Lúcia deverá iniciar reanimação cardiopulmonar, com ciclos de quinze compressões eficientes — deprimindo o tórax em cerca de 3 cm, com completo retorno — e cinco insuflações eficientes, de 5 s cada uma, e com elevação visível do tórax.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

255. (CESPE/2018/EBSERH)
Julgue o item seguinte, relativo à Política Nacional de Atenção às Urgências e à Rede de Atenção às Urgências derivadas dessa política. A Política Nacional de Atenção às Urgências se baseia em dados que apontam alta morbimortalidade associada a doenças do aparelho circulatório na faixa etária acima dos quarenta anos de idade.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

256. (CESPE/2018/EBSERH)
Julgue o item seguinte, relativo à Política Nacional de Atenção às Urgências e à Rede de Atenção às Urgências derivadas dessa política. O atendimento a usuário com quadro agudo deve ser feito pelos níveis secundário e terciário de atenção, cabendo ao nível primário a transferência do usuário para os demais níveis.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

257. (CESPE/2018/EBSERH)
Julgue o item seguinte, relativo à Política Nacional de Atenção às Urgências e à Rede de Atenção às Urgências derivadas dessa política.

Fundamentada em dados nacionais, a Política Nacional de Atenção às Urgências não considera as diferenças regionais de perfis epidemiológicos.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

258. (CESPE/2018/EBSERH)
Julgue o item seguinte, relativo à Política Nacional de Atenção às Urgências e à Rede de Atenção às Urgências derivadas dessa política. Um dos critérios considerados na implantação da Rede de Atenção às Urgências é o da densidade populacional.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

259. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item seguinte, relativo à Política Nacional de Atenção às Urgências e à Rede de Atenção às Urgências derivadas dessa política.

São prioritárias para a Rede de Atenção às Urgências as três seguintes linhas de cuidados: doenças infectocontagiosas, doenças cerebrovasculares e doenças cardiovasculares.

c) CERTO

e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

260. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)

Ao realizar manobras de reanimação cardiopulmonar em um adulto de 52 anos, o técnico em enfermagem aplica compressões torácicas a uma profundidade de, pelo menos, 5 cm porque:

a) essas compressões aumentam a pressão intratorácica, gerando um fluxo sanguíneo crítico, fornecendo oxigênio para o coração e o cérebro.

b) essas compressões estimulam a volta do ritmo cardíaco adequado, substituindo o uso do desfibrilador, quando este não está disponível.

c) apoiando-se sobre o tórax reduz-se o retorno venoso e aumenta-se a circulação para os órgãos vitais.

d) essas compressões evitam a queda acentuada de pressão arterial, que deve ser mantida em pelo menos 100x60 mmHg.

e) assim pode-se diminuir a frequência de aplicação a 90 compressões por minuto, evitando exaustão do profissional que realiza a manobra.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

261. (IBFC/2017/EBSERH)

A crise convulsiva é uma alteração involuntária e repentina nos sentidos, no comportamento, na atividade muscular e no nível de consciência que resulta da irritação ou da superatividade das células cerebrais. Durante o atendimento de emergência para casos de crises convulsivas, assinale a alternativa que apresenta o procedimento adequado:

a) Colocar o dedo na boca da vítima, puxando a língua para evitar que ela enrola para trás.

b) Ajudar a vítima a se deitar no chão para evitar quedas e lesões subsequentes. Afastar os objetos próximos da vítima.

c) Realizar reanimação cardiopulmonar, iniciando por ventilações pulmonares.

d) Tentar restringir os movimentos da vítima, independente se estiver próxima a objetos perigosos ou não.

e) Tentar colocar algum tecido ou corda, mesmo que forçado, entre os dentes da vítima para evitar que ela tenha alguma lesão da boca ou quebra do dente.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

262. (IBFC/2017/EBSERH)

Uma mulher, 55 anos, estava caminhando próximo de sua casa, quando de repente passou mal e caiu ao chão. Dois vizinhos que estavam próximos correram para prestar os primeiros socorros. Em casos de parada cardiorrespiratória (PCR), a reanimação cardiopulmonar, em adultos, sem via aérea avançada deve ser na proporção de:

a) 25 compressões torácicas e 03 ventilações pulmonares.

b) 15 compressões torácicas e 02 ventilações pulmonares.

c) 10 compressões torácicas e 02 ventilações pulmonares.

d) 05 compressões torácicas e 01 ventilação pulmonar.

e) 30 compressões torácicas e 02 ventilações pulmonares.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

263. (IBFC/2017/EBSERH)

Uma das principais causas do choque cardiogênico é:

a) Hemorragia.

b) Bactéria Gram-negativa.

c) Desidratação.

d) Diabetes Mellitus.

e) Infarto Agudo do Miocárdio.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

264. (IBFC/2017/EBSERH)
Sobre a Política Nacional de Atenção às Urgências, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() A organização da Rede de Atenção às Urgências tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna.

() A Rede de Atenção às Urgências deve ser implementada, imediatamente, em todo território nacional, independente dos critérios epidemiológicos e de densidade populacional.

() O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências e devem ser requisitos de todos os pontos de atenção.

() A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica.

- a) V,V,V,V
- b) V,F,V,F
- c) F,V,F,V
- d) V,F,F,F
- e) V,F,V,V

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

265. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)
Sobre o conteúdo incluso na Portaria nº 1.600/2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- a) Prioriza as linhas de cuidados cardiovascular, respiratória e traumatológica.
- b) As Unidades de Pronto Atendimento devem prestar o primeiro atendimento em casos agudos e agudizados de natureza clínica e primeiro atendimento nos traumas, excluindo-se casos de natureza cirúrgica.

c) O componente hospitalar é constituído exclusivamente por Pronto-Socorro e UTI.

d) Força Nacional do SUS, Unidades de Pronto atendimento e Atenção domiciliar integram a Rede de Atenção às Urgências.

e) Acolhimento com classificação de risco constituem uma das bases dos fluxos assistenciais apenas das UPAs, Pronto-Socorro e SAMU.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

266. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)
Homem, 32 anos, deu entrada no PS apresentando febre de 38°C. Na inspeção, paciente em posição fetal, queixando-se de dor abdominal. Apresentou, ainda, sinal de Blumberg positivo, o qual é caracterizado por:

- a) suspensão da inspiração devido à dor à compressão do rebordo costal direito.
- b) dor durante a rotação interna da coxa fletida.
- c) dor na fossa ilíaca direita após compressão profunda do quadrante inferior esquerdo.
- d) dor à descompressão mais intensa do que à compressão na fossa ilíaca direita.
- e) dor a punho-percussão na região lombar.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

267. (IBFC/2017/EBSERH)
Sobre o componente sala de Estabilização, referida na Política Nacional de Atenção às Urgências, assinale a alternativa correta.

- a) Tem por objetivo a ampliação do acesso, fortalecimento do vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado às urgências e emergências.
- b) Tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde.
- c) Deverá ser ambiente para estabilização de pacientes críticos e/ou graves, com condições de garantir a assistência 24 horas, vinculado a um equipamento de saúde, articulado e conectado aos outros níveis de atenção, para posterior encaminhamento à rede de atenção à saúde pela central de regulação das urgências.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

268. (IBFC/2016/EBSERH)

Assinale a alternativa correta. A participação dos profissionais da equipe de saúde é fundamental no atendimento pré-hospitalar de pacientes com suspeita de infarto do miocárdio. O oxigenoterapia foi uma estratégia historicamente utilizada nesse tipo de pacientes. De acordo com as recomendações atuais, essa conduta:

a) Deve ser realizada, quando indicada com cateter nasal de O₂ a 100%, 0,5 L/minuto.

b) Não é mais indicada.

c) Deve ser realizada, quando indicada com cateter nasal de O₂ a 100%, 2-4 L/minuto.

d) Deve ser realizada, quando indicada, com cateter nasal de O₂ a 100%, 1 L/minuto.

e) Deve ser realizada, quando indicada com cateter nasal de O₂ a 100%, 1-2 L/minuto.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

269. (IBFC/2016/EBSERH)

O transporte e remoção de clientes em atenção às urgências e emergências se destaca por sua especificidade técnica e administrativa. Todo e qualquer deslocamento deve sempre ocorrer com autorização médica, pois este é o responsável em caracterizar o tipo de transporte mais adequado para o paciente. Existem vários tipos de ambulância utilizados na remoção de pacientes, a _____, é um veículo destinado ao transporte interhospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino.

Complete a frase e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) Tipo A-Ambulância de Transporte.
- b) Tipo B - Ambulância de Suporte Básico.
- c) Tipo F - Embarcação de Transporte Médico.
- d) Tipo C - Ambulância de Resgate.
- e) Tipo D - Ambulância de Suporte Avançado.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

270. (IBFC/2016/EBSERH)

O choque _____ ocorre devido à alteração da tonicidade da parede do vaso, provocando seu relaxamento. Com isso, o vaso fica maior que a quantidade de sangue circulante em seu interior, levando à hipotensão. Complete a frase e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) Obstrutivo.
- b) Distributivo.
- c) Hipovolêmico.
- d) Hipervolêmico.
- e) Cardiogênico.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

271. (IBFC/2016/EBSERH)

Assinale a alternativa que contemple uma das várias características do choque cardiogênico:

- a) Melhora do bombeamento do sangue pelo coração.
- b) Diminuição da pressão venosa central (PVC).
- c) Boa perfusão tecidual.
- d) Aumento da força de contração.
- e) Diminuição do débito cardíaco.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

272. (IBFC/2016/EBSERH)

O afogamento no Brasil responde pela segunda causa de morte nas idades entre 5 e 14 anos e a terceira causa de morte externa, independente da faixa etária. O atendimento de emergência é realizado baseado na classificação estabelecida para afogamento. Sobre este assunto, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. No afogamento grau 2, a vítima apresenta tosse com ausculta pulmonar normal e nesses casos não necessitam de suporte ventilatório.

II. No afogamento grau 4, a vítima apresenta ausculta com estertores pulmonar e 93,2% necessitam de 5 litros/ minuto de O₂ por cânula nasal.

III. No afogamento grau 5, a vítima apresenta parada respiratória, sendo realizado manobras de suporte básico de vida pelos salva-vidas, com ventilação por máscara, ou respiração boca-a-boca quando este atendimento é feito por leigos.

IV. Na apresentação cadáver, a vítima ficou submersa mais que 1 hora, apresenta sinais de morte evidente.

- a) I e IV, apenas
- b) I, II, III e IV
- c) III e IV, apenas
- d) IV apenas
- e) I, III e IV, apenas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

273. (IBFC/2016/EBSERH)

A _____ é uma situação que não pode ser adiada, deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre-se até mesmo o risco de morte. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Emergência.
- b) Cirurgia eletiva.
- c) Internação eletiva.
- d) Urgência.
- e) Cirurgia reparativa.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

274. (IBFC/2016/EBSERH)

No atendimento a um politraumatizado, onde há a suspeita de ruptura de baço, o técnico de enfermagem e toda equipe devem tomar iniciativas para prevenir o _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Choque séptico.
- b) Choque cardiogênico.
- c) Choque hipovolêmico.
- d) Choque neurogênico.
- e) Choque anafilático.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

275. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Acidentes humanos provocados por peixes, marinhos ou fluviais, podem ocorrer por ingestão (acidente passivo) ou por ferroadas ou mordeduras (acidente ativo). Sendo assim, qual é o nome dado aos acidentes provocados por peixes?

- a) Colubrídicos.
- b) Araneísmo.
- c) Ictismo.
- d) Laquético.
- e) Elapídico.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

276. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

O choque é uma síndrome 'clínica grave, de alta mortalidade, caracterizada por baixo débito e insuficiência circulatória, com hipóxia tecidual, isquemia e lesão progressiva dos tecidos e órgãos. A etiologia do choque é variada, podendo ser categorizada em:

- a) choque cardiogênico, choque distributivo, choque hipovolêmico, choque obstrutivo.
- b) choque cardiogênico, choque distributivo, choque hipervolêmico, choque obstrutivo.
- c) choque cardiogênico, choque distributivo, choque hipovolêmico, choque desobstrutivo.
- d) choque cardiogênico, choque distributivo, choque hipervolêmico, choque desobstrutivo.
- e) choque cardiogênico, choque descritivo, choque hipervolêmico, choque obstrutivo.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

277. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

A gravidade do choque frequentemente se caracteriza por seu efeito sobre a pressão arterial sistólica. O choque será descrito como compensado se os mecanismos compensatórios preservarem a pressão arterial sistólica (PAS) dentro da normalidade e hipotensivo quando esses mecanismos falharem e a PAS declinar. Entre os mecanismos compensatórios do choque, podemos citar:

- a) o aumento da Resistência Vascular Sistêmica (vasoconstrição).
- b) o inotropismo e cronotropismo diminuído.
- c) a bradicardia.
- d) a diminuição de tônus do músculo liso venoso (vasoconstrição).
- e) a redistribuição do fluxo sanguíneo para extremidades (derme).

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

278. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Paciente, 4 meses, apresenta-se irresponsiva a estímulos, em apneia, sem pulso braquial detectável, com ritmo cardíaco de assistolia, sendo constatada parada cardiorrespiratória (PCR). Assim, iniciam-se imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) que consistem:

a) em compressões torácicas (no máximo 100 movimentos por minuto), permitindo o retorno completo do tórax.

b) em hiperventilar o paciente (1 ventilação a cada 10 a 12 segundos/ de 16 a 20 ventilações por minuto).

c) na relação compressão-ventilação (até colocação de via aérea avançada) de 40:2 com 1 socorrista e 30:2 com 2 socorristas.

d) em checar pulso por 60 segundos a cada 5 minutos.

e) em minimizar as interrupções nas compressões torácicas.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

279. (IBFC/2016/EBSERH)

De acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências e a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), o componente que objetiva aglutinar esforços para garantir a integralidade na assistência em situações de risco ou emergenciais para populações com vulnerabilidades específicas e/ou em regiões de difícil acesso, pautando-se pela equidade na atenção, considerando-se seus riscos é o (a):

- a) Força Nacional de Saúde do SUS.
- b) Central de Regulação Médica das Urgências.
- c) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).
- d) Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h).
- e) Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

280. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando os sinais clínicos de uma criança com choque hipovolêmico, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Diminuição do Débito cardíaco.
- () Pressão Venosa Central (PVC) baixa.
- () Enchimento capilar precário.
- () Pressão Arterial Normal.

- a) F,V,V,V
- b) V,V,V,F
- c) V,V,V,V
- d) F,V,V,F
- e) V,V,F,V

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

281. (IBFC/2016/EBSERH)

Um homem, 55 anos, estava caminhando na praça do centro da cidade e sentiu uma dor torácica, que sugere origem cardíaca. O colega que estava próximo correu para socorrê-lo. Como o prestador de primeiros socorros observou que o homem estava com sinais e sintomas sugestivos de infarto agudo do miocárdio e que relatou não ter alergia ou contraindicação a medicamento, enquanto aguardava o serviço de atendimento médico de urgência:

a) Iniciou a reanimação cardiopulmonar, com compressões torácicas.

b) Incentivou-o a tomar um comprimido de aspirina para adultos.

c) Iniciou a reanimação cardiopulmonar, com ventilações de resgate.

d) Incentivou-o a tomar um comprimido de vitamina C.

e) Permaneceu ao lado dele, pois apenas os profissionais de saúde podem tomar condutas de primeiros socorros.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

282. (IBFC/2016/EBSERH)

Um paciente, sexo feminino, 68 anos, consciente e em ventilação espontânea, realizou um exame de coronariografia no Setor de Hemodinâmica. Durante a administração de contraste, a mulher apresentou reação alérgica e, conseqüentemente, parada cardiorrespiratória (PCR). A equipe realizou a reanimação cardiopulmonar (RCP), sendo correto afirmar que nesse caso:

a) A frequência de compressão do tórax deve ser de 60 a 85 por minuto.

b) A profundidade de compressão do tórax é de cerca de 1,5 polegadas (4 cm).

c) A relação compressão ventilação sem via aérea avançada é de 15:2 com um ou dois socorristas.

d) Entre um ciclo e outro, deve-se interromper as compressões por cerca de 30 segundos.

e) A relação compressão-ventilação sem via aérea avançada é de 30:2 com um ou dois socorristas.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

283. (IBFC/2016/EBSERH)

A organização da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RAUE) tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde, com o objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/ emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna. Considerando a RAUE, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Promoção e prevenção.
- () Atenção primária: Unidades Básicas de Saúde.
- () SAMU 192.
- () Enfermarias de retaguarda e unidades de cuidados intensivos.

- a) F,F,V,F
- b) F,F,V,V
- c) V,F,F,F
- d) V,V,V,V
- e) F,F,F,F

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

284. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

A respeito do Choque Hipovolêmico, seja hemorrágico, anafilático, séptico ou neurogênico, o evento final comum a todos eles é:

- a) a falência generalizada da perfusão tecidual.
- b) a promoção da expansão volêmica de longa duração.
- c) que as moléculas de coloide penetram no espaço intersticial de forma livre.
- d) a normalização da pressão de perfusão cerebral.
- e) a restituição instantânea de volume sanguíneo.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

285. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)
(ESTRANHA)

O principal objetivo da fluidoterapia é restaurar a perfusão tecidual. As soluções de primeira escolha para reposição volêmica são:

- a) soluções cristaloides isotônicas.
- b) coloides e Ringer Lactato.
- c) soluções hipertônicas e hiperosmolares.
- d) soluções hiperosmolares.
- e) soluções glicosadas e coloides.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

286. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

A equipe está atendendo acidente com múltiplas vítimas pelo método START. O paciente, após manobras, não obedece a solicitações verbais, porém sua frequência respiratória é maior que 30 rpm e sua perfusão periférica (enchimento capilar) é maior que dois segundos. Qual cartão deve ser usado na Triagem desse paciente?

- a) Cartão Azul.
- b) Cartão Preto.
- c) Cartão Vermelho.
- d) Cartão Amarelo.
- e) Cartão Verde.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

287. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

O Traumatismo Torácico é um grande causador de mortes. A fisiopatologia desse traumatismo está relacionada com três alterações básicas, são elas:

- a) a hipóxia tecidual, a hipercapnia e a acidose.
- b) a hipóxia tecidual, a hiperglicemia e a inconsciência.
- c) a alcalose, a hipotensão e a acidose.
- d) lesões por arma de fogo, arma branca e contusões.
- e) lesões abertas, fechadas e perfurantes.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

288. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Paciente politraumatizado, 25 anos, sexo masculino, dá entrada na Unidade de Urgência/Emergência, trazido pelo SAMU, em decorrência de colisão frontal moto/ caminhão. Em breve avaliação, observa-se abertura ocular apenas sob estímulo doloroso, assim como resposta motora com movimentos de retirada. O paciente verbaliza palavras inadequadas às perguntas realizadas. Utilizando os parâmetros da Escala de Coma de Glasgow, o escore atribuído a esse paciente é de:

- a) 13.
- b) 15.
- c) 9.
- d) 7.
- e) 1.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

289. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Em um atendimento pré-hospitalar, o enfermeiro se depara com um adulto em situação de engasgamento com possível presença de corpo estranho em região orofaríngea. Qual é a medida a ser tomada imediatamente?

- a) Manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar.
- b) Manobras de Heimlich.
- c) Manobras de Browder.
- d) Manobras de Lund.
- e) Manobras de Reye.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

290. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Paciente chega ao Serviço de Urgência vítima de queda de altura. Ao exame, apresenta rinorreia, otorreia, hematoma periorbital, existindo a suspeita de fratura de base de crânio. Nesse caso, não é indicado:

- a) encaminhar paciente para fazer exames radiológicos e tomografia.
- b) fazer sondagem nasogástrica, pois pode ocorrer falso trajeto da sonda.
- c) manter paciente em tábua rígida.
- d) manter paciente em monitorização cardíaca e oximetria de pulso.
- e) administrar solução cristalóide isotônica conforme prescrição médica.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

291. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Paciente masculino, 49 anos, obeso, com história de tabagismo e alcoolismo, dá entrada na Unidade de Emergência em (PCR) Parada Cardiorrespiratória. A equipe pré - hospitalar informa que o tempo de parada é de 15 minutos e, no atendimento, iniciou as manobras de ressuscitação. O médico plantonista pede à equipe que inicie a administração de adrenalina 1,0 mg de três em três minutos. Sobre essa droga, assinale a alternativa correta.

- a) É um antiarrítmico, indicado nas arritmias supraventriculares.
- b) É um fármaco adrenérgico, antiasmático, vaso-pressor e estimulante cardíaco.

c) Atua na dissolução de trombos em casos de obstrução das artérias.

d) Atua no sistema parassimpático, sendo indicado na bradicardia e correção da acidose.

e) Inibe a formação de agregação das plaquetas e é indicado para evitar Hipertensão.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

292. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

No setor de emergência, quando chega paciente em Parada Respiratória ou apneia, com suspeita de exposição a opiáceos, entre as drogas de escolha para reverter o quadro:

- a) anfetamina.
- b) carbamazepina.
- c) codeína.
- d) naloxona.
- e) morfina.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

293. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Para atendimento de vítimas graves, a Unidade de Suporte Avançado, quanto à composição da equipe, deverá ser de:

- a) dois técnicos de enfermagem e o condutor do veículo.
- b) um médico, um enfermeiro e o condutor do veículo.
- c) um médico, dois técnicos de enfermagem e o condutor do veículo.
- d) um bombeiro socorrista e o condutor do veículo.
- e) um médico, dois enfermeiros, um socorrista e o condutor do veículo.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Enfermagem e Saúde do Trabalhador

294. (IBFC/2017/EBSERH)
Assinale a alternativa que contemple um exemplo de causa direta que pode ocasionar a dermatose ocupacional.

- a) Idade.
- b) Agente biológico.
- c) Sexo.
- d) Etnia.
- e) Fatores ambientais.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

295. (IBFC/2017/EBSERH)
Nos casos iniciais de LER/DORT, em que há identificação de sede anatômica precisa das lesões e diagnóstico de entidades nosológicas específicas, o esquema terapêutico básico inclui várias recomendações. Analise as abaixo e assinale a incorreta:

- a) Não colocar gelo no local envolvido.
- b) Uso de anti-inflamatórios.
- c) Afastamento das atividades laborais e extralaborais que exijam movimentação e posturas dos membros envolvidos que os sobrecarreguem.
- d) Formação de grupos terapêuticos, incluindo atividades de informação, vivências, com cunho informativo pedagógico-psicoterapêutico.
- e) Medidas de fisioterapia.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

296. (IBFC/2017/EBSERH)
Considerando a Norma Regulamentadora nº 15, analise as atividades abaixo e marque V (se ela corresponder a grau máximo de insalubridade) e F (se ela corresponder a grau médio ou mínimo de insalubridade). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Aplicação de defensivos agrícolas organoclorados.
- () Aplicação de defensivos agrícolas organofosforados.

() Emprego de produtos parasiticidas e inseticidas à base de compostos de arsênio.

() Emprego de produtos raticidas à base de compostos de arsênio.

- a) V, V, V, V
- b) V, F, F, V
- c) F, F, V, V
- d) F, F, F, F
- e) V, V, F, F

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

297. (IBFC/2017/EBSERH)
Os ambientes de trabalho em teletendimento/telemarketing devem obedecer alguns parâmetros mínimos. Assinale a alternativa correta.

- a) Nível de ruído aceitável para efeito de conforto de até 85 decibéis.
- b) Curva de avaliação de ruído de valor não superior a 80 decibéis.
- c) Índice de temperatura efetiva entre 24° e 29°C.
- d) Velocidade do ar superior a 0,75 m/s.
- e) Umidade relativa do ar não inferior a 40% (quarenta por cento).

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

298. (IBFC/2017/EBSERH)
Assinale a alternativa que apresenta o tipo de risco que pertence ao grupo 2 de cor vermelho, segundo a classificação dos principais riscos ocupacionais.

- a) Químico.
- b) Físico.
- c) Biológico.
- d) Ergonômico.
- e) Acidente.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

299. (IBFC/2017/EBSERH)
Sobre o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. Foi proposto pela previdência social aos empregados e trabalhadores como importante mecanismo que auxilia a caracterização de um acidente ou de uma doença de trabalho.

II. Com a implementação do NTEP, a perícia médica passou a adotar três etapas sequenciais e hierarquizadas que identificam e caracterizam a natureza da incapacidade, se acidentária ou não.

III. Com a implantação do NTEP, a comunicação de acidente de trabalho (CAT) foi abolida, não sendo mais necessário seu preenchimento em nenhum momento.

- a) I, II e III
- b) I apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e II, apenas
- e) II, apenas

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

300. (IBFC/2017/EBSERH)

Sobre as fases da higiene ocupacional, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() O momento ideal para a instalação das medidas de controle de engenharia é durante a construção ou a instalação do processo que requeira o manuseio de agentes potencialmente agressivos.

() A maneira de executar determinadas tarefas não influencia na geração ou dispersão de contaminantes no ambiente de trabalho.

() Adoção de medidas relativas ao trabalhador, tais como a rotatividade de função, a educação e principalmente o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), substituem as medidas relativas ao ambiente de trabalho.

- a) V,V,V
- b) V,F,V
- c) F,V,V
- d) F,F,V
- e) V,F,F

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

301. (IBFC/2017/EBSERH)

As patologias do sistema tegumentar relacionadas com o trabalho são chamadas de dermatoses ocupacionais. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta.

a) Os jovens, por estarem com seu sistema de defesa completamente constituído, tem menor risco para as dermatites de contato ocupacionais.

b) A lesão por irritação é chamada de irritação primária e aparece devido ao contato com substâncias que retiram o manto lipídico da pele, possibilitando, dessa maneira, o ressecamento da epiderme com descamações e fissuras.

c) As dermatites de contato relacionadas com o trabalho incidem de maneira mais elevada no sexo masculino, visto que estes costumam se queixar com maior frequência desse tipo de agravo do que o sexo feminino.

d) Observam-se lesões nos casos de dermatite de contato e sua descrição é fundamental na definição da causa.

e) O tipo de lesão possibilita diferenciar uma reação por irritação primária de uma reação por sensibilização.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

302. (IBFC/2017/EBSERH)

Assinale a alternativa correta que contemple um exemplo de gás asfíxiante químico.

- a) Amoníaco.
- b) Butano.
- c) Acetileno.
- d) Monóxido de carbono (CO).
- e) Dióxido de carbono.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

303. (IBFC/2017/EBSERH)

Sobre os limites de tolerância para ruído, assinale a alternativa correta.

a) 8 horas é a exposição máxima diária permitida para um nível de ruído de até 115 decibéis.

b) 6 horas é a exposição máxima diária permitida para um nível de ruído de até 110 decibéis.

c) 8 horas é a exposição máxima diária permitida para um nível de ruído de até 100 decibéis.

d) 1 hora é a exposição máxima diária permitida para um nível de ruído de até 123 decibéis.

e) 6 horas é a exposição máxima diária permitida para um nível de ruído de até 87 decibéis.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

304. (IBFC/2017/EBSERH)

As manchas na pele decorrentes de hemorragia são denominadas púrpuras. De acordo com a extensão, podem ser denominadas _____, quando têm até cerca de 3 cm de dimensão. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Petéquias
- b) Equimoses
- c) Sufusões
- d) Hematúria
- e) Hemartrose

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

305. (IBFC/2017/EBSERH)

Sobre a Neurastenia, que inclui a Síndrome de Fadiga, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. A característica mais marcante da Síndrome de Fadiga relacionada ao trabalho é a presença de fadiga constante, acumulada ao longo de meses ou anos em situações de trabalho em que não há oportunidade de se obter descanso necessário e suficiente.

II. A fadiga é referida pelo paciente como sendo constante, como acordar cansado, simultaneamente física e mentalmente, caracterizando uma fadiga geral.

III. Outras manifestações importantes são: facilidade de aprofundar o sono, não acorda com facilidade durante a noite ou pela manhã, irritabilidade ou falta de paciência e desânimo durante o dia.

IV. Essas manifestações também têm sido associadas à exposição ocupacional a algumas substâncias químicas como: brometo de metila, chumbo, sulfeto de carbono, tolueno, entre outras.

- a) I, II e IV, apenas
- b) I, II, III e IV
- c) I e II, apenas
- d) I, II e III, apenas
- e) II, III e IV, apenas

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

306. (IBFC/2017/EBSERH)

_____ são infamações do tecido próprio dos tendões, com ou sem degeneração de suas fibras. O termo, de ampla abrangência, é aplicável a todo e qualquer processo inflamatório dos tendões, em qualquer local do corpo. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Sinovite.
- b) Tendinites.
- c) Tenossinovite.
- d) Fasciites.
- e) Flebite.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

307. (IBFC/2016/EBSERH)

Pode ser considerado uma agente de risco químico:

- a) Calor.
- b) Vapores.
- c) Vibração.
- d) Ruído.
- e) Radiação.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

308. (2015/ INSTITUTO/ AOCP)

A Norma Regulamentadora que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, é a:

- A. NR - 05.
- B. NR - 07.
- C. NR - 09.
- D. NR - 17.
- E. NR - 32.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

309. (IBFC/2016/EBSERH)

São doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho, de acordo com a Portaria/MS nº 1.339/1999, exceto:

- a) Leishmaniose cutânea.
- b) Ornitose.
- c) Dermatofitoses (micoses cutâneas).
- d) Doença de Chagas.
- e) Tétano.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

310. (IBFC/2016/EBSERH)

Os sinais e sintomas de LER/DORT são múltiplos e diversificados. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

() dor espontânea ou à movimentação passiva, ativa ou contra-resistência.

() dificuldades para o uso dos membros, particularmente das mãos, e, mais raramente, sinais inflamatórios e áreas de hipotrofia ou atrofia.

() alterações sensitivas de fraqueza, cansaço, peso, dormência, formigamento, sensação de diminuição, perda ou aumento de sensibilidade, agulhadas e choques.

- a) F, F, F
- b) V, V, F
- c) V, V, V
- d) F, V, F
- e) F, F, V

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

311. (IBFC/2016/EBSERH)

Considere um hospital de pequeno porte, com 516 trabalhadores, para responder a questão. Na composição do SESMT (Serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho), o número de enfermeiro(s) em tempo integral e médico(s) do trabalho será, respectivamente, de pelo menos:

- a) Zero e um
- b) Dois e um
- c) Um e um
- d) Dois e zero
- e) Zero e zero

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

312. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando as estratégias de proteção e promoção da saúde nos locais de trabalho, assinale P1 para as medidas de proteção e P2 para as de promoção de saúde. A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

() Uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

() Vacina contra a hepatite B.

() Combater ao estresse no ambiente de trabalho.

() Prevenção do tabagismo.

- a) P1, P1, P2, P2
- b) P1, P2, P1, P2
- c) P2, P1, P2, P1
- d) P2, P2, P1, P1
- e) P1, P2, P2, P2

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

313. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando os riscos biológicos nos ambientes de trabalho, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

I. Em caso de exposição acidental ou incidental, medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente, excetuando-se as não previstas no PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais).

II. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.

III. São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas.

- a) I, II e III são corretas
- b) Apenas I é correta
- c) I, II e III são incorretas
- d) Apenas II é correta
- e) Apenas I e III são corretas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

314. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre tuberculose e risco ocupacional, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

I. Tem sido demonstrado, clínica e epidemiologicamente, que a exposição à sílica pode favorecer a reativação da infecção tuberculosa latente.

II. Em determinados trabalhadores, a tuberculose pode ser considerada doença relacionada ao trabalho, posto que as condições de trabalho podem favorecer a exposição ao agente causal *Mycobacterium bovis*, como no caso de trabalhadores em laboratórios de biologia

III. Em determinados trabalhadores, a tuberculose pode ser considerada doença relacionada ao trabalho, posto que as condições de trabalho podem favorecer a exposição ao agente causal *Mycobacterium tuberculosis* como as atividades que propiciam contato direto com produtos contaminados ou com doentes bacilíferos .

- a) I, II e III são corretas.
- b) Apenas I é correta.
- c) I, II e III são incorretas.
- d) Apenas II é correta.
- e) Apenas I e III são corretas.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

315. (IBFC/2016/EBSERH)

Os principais agentes ocupacionais causadores de síndromes mielodisplásicas (displasia de medula óssea) são:

- a) Fósforo vermelho e benzeno.
- b) Radiações ionizantes e benzeno.
- c) Fósforo vermelho e radiações ionizantes.
- d) Chumbo e arsênico.
- e) Arsênico e fósforo vermelho.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

316. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Paciente, 38 anos, sexo feminino, auxiliar de cozinha há 9 anos, relatou ao médico do trabalho, que está apresentando uma sensação de formigamento, dormência, dor muscular constante e limitações na amplitude dos movimentos do membro superior direito. Qual tipo de doença ocupacional é caracterizada por essa sintomatologia?

- a) Lombalgia ou Lesões por Esforços Repetitivos (LER).
- b) Cervicobraquialgia ou Distúrbio Osteomuscular relacionado ao Trabalho (DORT).
- c) Bursite ou Distúrbio Osteomuscular relacionado ao Trabalho (DORT).
- d) Tendinite ou Lesões por Esforços Repetitivos (LER).
- e) Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbio Osteomuscular relacionado ao Trabalho (DORT).

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

317. (IBFC/2016/EBSERH)

Assinale a alternativa que contempla a cor representante do risco biológico, segundo a classificação dos principais riscos ocupacionais em grupo de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.

- a) Verde.
- b) Marrom.
- c) Vermelho.
- d) Amarelo.
- e) Azul.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

318. (IBFC/2016/EBSERH)

Segurança do trabalho ou também denominado segurança ocupacional é um conjunto de ciências e tecnologias que tem o objetivo de promover a segurança do trabalhador no seu local de trabalho. Assinale a alternativa incorreta.

a) Os principais agentes físicos encontrados no ambiente hospitalar são: calor, ruído, radiações ionizantes, radiações não ionizantes e pressões anormais.

b) Os principais agentes químicos encontrados no ambiente hospitalar são: agentes de limpeza, desinfecção e esterilização, drogas quimioterápicas, gases medicinais e produtos para manutenção de equipamentos.

c) O risco biológico é menos comum e menos grave no ambiente hospitalar e está relacionado diretamente ao setor, cada setor terá seus riscos biológicos.

d) Além dos riscos físicos, químicos e biológicos, também existem no ambiente hospitalar os riscos mecânicos e ergonômicos.

e) A incidência de acidentes perfuro cortantes com material biológico na área da enfermagem é alta, a prevenção e treinamento constante e o uso de dispositivos de proteção é importante para a redução dessa incidência.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

319. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

A adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores se constitui como foco essencial da:

- a) laborterapia.
- b) ergonomia.
- c) discrasia.
- d) readequação global.
- e) restituição postural.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

320. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre a classificação dos agentes químicos, quanto aos efeitos no organismo, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. Asfíxiantes: capazes de impedir a chegada do oxigênio aos tecidos sem interferir no mecanismo de ventilação.

II. Anestésicos e narcóticos: apresentam ação depressora do sistema nervoso central.

III. Pneumoconióticos: promovem reações alérgicas.

IV. Sistêmicos: compostos químicos que, independente da via de entrada, acometem apenas o fígado, ou seja, são hepatotóxicos

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV
- b) I e II, apenas
- c) II apenas
- d) II, III e IV, apenas
- e) II e III, apenas

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

321. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre Toxicocinética, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() A fase da absorção consiste na passagem do agente tóxico através das membranas biológicas, alcançando a corrente sanguínea.

() Na fase da absorção, o transporte das substâncias químicas ocorre somente por difusão simples ou passiva.

() Na fase da distribuição, o único local que acumula agente tóxico é a proteína plasmática.

() Conforme o tipo de agente tóxico absorvido, ele pode ser eliminado inalterado ou como produtos de biotransformação.

- a) V,F,V,F
- b) V,V,V,V
- c) F,V,F,V
- d) V,F,F,V
- e) V,V,V,F

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

322. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando a Norma Regulamentadora nº 32, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado.

II. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas.

III. A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosa e quando houver contato direto da vestimenta com material orgânico, deve ser de responsabilidade do empregado.

IV. Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual.

- a) As frases I, II, III e IV estão corretas
- b) As frases I, II e IV estão corretas
- c) Apenas as frases I e III estão corretas
- d) Apenas as frases III e IV estão corretas
- e) Apenas as frases I e II estão corretas

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

323. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A exposição ao mercúrio pode ocasionar intoxicação e tremores de extremidades. Sobre o mercurialismo crônico, é correto afirmar que:

a) as alterações neurológicas importantes causadas pelo mercurialismo foram descritas pela primeira vez em trabalhadores ligados à “chapeleiros malucos” (mad hatters).

b) o tremor do mercurialismo crônico não induz a mudanças de comportamento, como o de alimentar-se sozinho, em ambientes afastados dos outros, por exemplo.

c) a ocorrência do tremor não requer tempo de exposição longo, mesmo em baixas concentrações.

d) o tremor intenso e generalizado, impedindo atividades cotidianas (concussio mercurialis) é considerado um tremor grau 4.

e) o tremor pode ter evolução progressiva e contínua, atingindo praticamente o corpo todo, dificultando a marcha, no entanto sem alterações na fala. Esse quadro é denominado psellismus mercurialis.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

324. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Conforme a Norma Regulamentadora nº 21, que dispõe sobre trabalhos a céu aberto, assinale a alternativa correta.

a) É obrigatória a existência de abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries.

b) Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica.

c) Toda embarcação deve estar provida de um sistema de ventilação adequado que deve ser regulado para manter o ar em condições satisfatórias.

d) A empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira coordenará a implementação das medidas relativas à segurança e saúde dos trabalhadores.

e) Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

325. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Paciente do sexo masculino, 45 anos, trabalhador da construção civil, observou que algumas horas após ter caído massa corrida dentro de suas botas a pele ficou vermelha, apresentando coceira no local, ardor e queimação. Após avaliação médica, o diagnóstico foi: dermatite irritativa de contato forte. Sobre esse agravo, é correto afirmar que:

a) a gravidade da lesão dependerá exclusivamente da toxicidade e concentração do agente químico.

a) a gravidade da lesão dependerá exclusivamente da toxicidade e concentração do agente químico.

b) o tempo de contato da massa ou calda de cimento não interfere no aparecimento ou gravidade das lesões.

c) o cimento, por ser abrasivo, alcalino e altamente higroscópico, produz invariavelmente lesões ulcerativas profundas.

d) a alcalinidade e o poder oxidante do cimento são fatores importantes na gênese dessas lesões ulceradas.

e) a dermatite irritativa de contato forte resulta de uma reação cutânea eczematosa, com resposta antígeno-específica tardia, a um antígeno hapteno em contato com a pele.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

326. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Assinale a alternativa que não corresponde a um fator predisponente para a ocorrência de câncer relacionado ao trabalho.

- a) Exposição solar.
- b) Exposição ao benzeno.
- c) Exposição a formaldeído.
- d) Exposição à Sílica.
- e) Exposição a Ruídos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

327. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Sobre as diretrizes da Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), assinale a alternativa correta.

a) INTERDISCIPLINARIDADE: abordagem multiprofissional e interdisciplinar, incorporando os saberes técnicos, as práticas de diferentes áreas do conhecimento e o saber dos trabalhadores, considerando-os essenciais para o desenvolvimento das ações.

b) HIERARQUIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO: todos os trabalhadores, independente de sua localização, urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, autônomo, doméstico, aposentado ou demitido, são objeto e sujeitos da vigilância.

c) INTEGRALIDADE DAS AÇÕES: trabalhadores e suas organizações devem estar integralmente envolvidos em todas as etapas do processo, na identificação das demandas, no planejamento, no estabelecimento de prioridades, na definição das estratégias, na execução, no acompanhamento, na avaliação das ações e no controle da aplicação de recursos.

d) INTERDISCIPLINARIDADE: articulação das ações com setores implicados na Saúde do Trabalhador, como os Ministérios do Trabalho e Emprego, Previdência Social, Meio Ambiente, Agricultura, Educação e Ministério Público, entre outros.

e) UNIVERSALIDADE: consolidação do papel do município e dos distritos sanitários como instâncias efetivas de desenvolvimento das ações de vigilância, integrando os níveis estadual e nacional do SUS, dentro de suas atribuições e competências específicas, comuns e complementares.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

328. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSEERH)

A saúde ocupacional e ambiental inclui um grande número de fatores causais específicos e proximais. Sobre epidemiologia ambiental e ocupacional, assinale a alternativa correta.

a) Entre 45% e 55% da carga global de doenças pode ser devido à exposição a fatores ambientais.

b) O nível de chumbo no sangue é pouco confiável na mensuração da exposição.

c) A distribuição das doses individuais dos agentes químicos é frequentemente simétrica e geralmente se assemelha mais com a distribuição normal.

d) O cabelo é muito útil para o estudo da exposição ao metilmercúrio, por meio do consumo de pescados, e a unha tem sido usada para estudar a exposição ao arsênico.

e) Mesmo com diferentes hábitos de trabalho, pessoas trabalhando lado a lado em uma fábrica possuem níveis de exposição iguais. contaminados.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

329. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSEERH)

Em relação aos Agravos à Saúde do Trabalhador, assinale a alternativa correta.

a) PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído) é a diminuição abrupta da audição induzida por baixo índice de ruídos no ambiente de trabalho.

b) Pneumoconioses é o conjunto de doenças cardiopulmonares causadas pelo acúmulo de borracha de pneus nos pulmões de trabalhadores de borracharias.

c) Câncer relacionado ao trabalho é o câncer que surgiu com consequência da exposição a agentes carcinogênicos mesmo fora do ambiente de trabalho.

d) Acidente de trabalho com exposição a material biológico é aquele que envolve sangue e outros fluidos orgânicos, ocorrido com Profissionais da Área da Saúde durante o desenvolvimento do seu trabalho, onde esses profissionais estão expostos a materiais biológicos potencialmente contaminados.

e) Ler-Dort é uma síndrome clínica que afeta o sistema musculoesquelético, causada por movimentos não-repetitivos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

330. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSEERH)

Conforme o Quadro II - Padrão de Qualidade da água Tratada para Hemodiálise, da RDC 154, de 15 de junho de 2004, quais componentes devem ser verificados mensalmente?

a) Coliforme total e Endotoxinas.

b) Coliforme total, Contagem de bactérias heterotróficas e Endotoxinas.

c) Coliforme total e Contagem de bactérias heterotróficas.

d) Contagem de bactérias heterotróficas e Endotoxinas.

e) Apenas Endotoxinas.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

331. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSEERH)

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) foi criada para garantir a oferta de todas as condições de segurança, proteção e preservação da saúde dos profissionais que atuam em estabelecimentos de saúde.

Essa norma precisa ter sua aplicação cobrada pelos profissionais a quem ela é voltada. Com base no conteúdo da NR-32, pode-se afirmar que:

a) as principais situações de risco a que estão expostos os profissionais incluem riscos biológicos, químicos e radiação ionizante.

b) o uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos.

c) a proteção dos profissionais que manipulam drogas antineoplásicas independe da utilização de equipamentos de proteção individual.

d) os profissionais de Enfermagem são responsáveis pelo manuseio e/ou transporte de cilindros de gases medicinais, incluindo-se os portáteis.

e) a segregação dos resíduos resultantes da assistência à saúde deve ser realizada fora do local onde são gerados.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

332. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSE RH)

Paciente masculino, 65 anos, é mecânico em uma transportadora, em seu dia de sobreaviso, foi chamado para socorrer um dos caminhões que encontrava na estrada há 100 km da sede da empresa. Dirigiu-se ao local com seu carro particular, realizou o serviço e, ao retornar, sofreu um acidente fatal. Sobre essa situação, é correto afirmar que:

a) não há qualquer possibilidade de considerá-la acidente de trabalho.

b) somente não é considerada acidente de trabalho devido à utilização de carro particular para atender ao chamado.

c) após análise dos detalhes da situação é possível enquadrá-la como acidente de trabalho.

d) a ocorrência do acidente fora do município sede da empresa descaracteriza acidente de trabalho.

e) para ser caracterizado como acidente de trabalho o veículo deve ser obrigatoriamente de propriedade da empresa.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

333. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSE RH)

A Brucelose é uma doença frequente em trabalhadores que lidam com gado e no beneficiamento de leite e derivados. Sobre essa patologia, assinale a alternativa correta.

a) A única maneira de confirmar o caso é mediante cruzamento de história epidemiológica com o quadro clínico de febre de início agudo ou insidioso.

b) Trata-se de doença de notificação compulsória tanto para casos individuais quanto para surtos.

c) O tratamento padronizado consiste na administração endovenosa de ceftriaxona 2g/dia e Cefepime 1g/dia por 10 dias.

d) Dentre suas complicações, pode ocorrer infecções do aparelho genitourinário e redução de potência sexual.

e) É também conhecida como Febre do Vale de São Joaquim, febre do deserto e reumatismo do deserto.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

334. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSE RH)

Paciente masculino, 65 anos, trabalhou durante 30 anos em uma indústria de telhas, tendo evoluído com quadro de dificuldade respiratória importante relacionado, após as devidas avaliações, ao exercício laboral. Em ação judicial movida contra a empregadora, teve sentença a seu favor devido ao entendimento do juiz de que houve descumprimento das normas de segurança no trabalho. Tais sentenças consideraram que houve exposição nociva do trabalhador a níveis elevados de amianto. Sobre essa substância, é correto afirmar que:

a) embora exista determinação de níveis tolerados apenas o amianto do tipo anfíbio é autorizado em todos os países do mundo.

b) está exclusivamente relacionada ao câncer de pulmão em trabalhadores expostos a essa substâncias.

c) é também conhecida como monóxido de hidrogênio e por isso apresenta toxicidade.

d) tem relação direta com a ocorrência de asbestose em trabalhadores.

e) a ação desse hidrocarboneto se relaciona à ocorrência de leucemias.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Administração de Medicamentos

335. (CESPE/2018/EBSERH)
Acerca dos cuidados na administração de medicamentos, julgue o próximo item.
O preparo do medicamento deve ser realizado apenas quando houver certeza quanto ao medicamento prescrito, à dose e à via de administração.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

336. (CESPE/2018/EBSERH)
Acerca dos cuidados na administração de medicamentos, julgue o próximo item.
É dispensável esclarecer ao paciente o medicamento que lhe será administrado.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

337. (CESPE/2018/EBSERH)
Acerca dos cuidados na administração de medicamentos, julgue o próximo item.
A absorção de determinados medicamentos é mais rápida pela via subcutânea que pela via intramuscular.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

338. (CESPE/2018/EBSERH)
Acerca dos cuidados na administração de medicamentos, julgue o próximo item.
O efeito medicamentoso da droga administrada por via endovenosa é imediato; por isso, esta é uma via de escolha em casos de emergência.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

339. (IBFC/2017/EBSERH)
Segundo as formas de apresentação dos medicamentos, assinale a alternativa que contenha a descrição da drágea.

- a) É constituído de invólucro de gelatina com medicamento internamente de forma sólida, semissólida ou líquida, sendo usada para facilitar a deglutição e a liberação do medicamento na cavidade gástrica.
b) É o pó comprimido com um formato próprio, sendo redondo ou ovalado, pode trazer uma marca, como sulcos que facilitam sua divisão em partes.

c) O comprimido é revestido por uma solução de queratina composta por açúcar e corante, proporcionando melhora na sua liberação entérica, sendo usado para facilitar a deglutição e evitar sabor e odor característicos do medicamento.

d) É uma mistura não homogênea de determinada substância sólida e um líquido, em que a parte sólida fica suspensa no líquido.

e) Se apresenta de forma a ser diluído em líquido e dosado em colher ou em envelopes em quantidades exatas.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

340. (IBFC/2017/EBSERH)

Foi prescrito soro fisiológico 1,2% de 250 ml para infundir em 3 horas. Disponível soro fisiológico 0,9% de 250ml e ampolas de NaCl 20% de 10ml. Serão retirados _____ de NaCl de 10 ml a 20% para a transformação do soro fisiológico de 0,9% a 1,2%. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) 3,0ml
b) 2,5ml
c) 1,75ml
d) 3,75ml
e) 3,25ml

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

341. (IBFC/2017/EBSERH)
Foi prescrito decadron 2mg endovenoso (EV). Disponível frasco-ampola de decadron de 2,5ml com 4mg/ml. Devemos aspirar _____ml do frasco-ampola para seguir a prescrição. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) 1
- b) 0,75
- c) 2
- d) 1,5
- e) 0,5

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

342. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)
Qual das vias de administração de fármacos é considerada enteral?

- a) Endovenosa.
- b) Oral.
- c) Intramuscular.
- d) Subcutânea.
- e) Intra-arterial.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

343. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)
Foi prescrito, a uma criança, fosfato sódico de prednisolona 10 gotas por via oral, uma vez ao dia por 05 dias. Sabendo que o frasco contém 11mg por ml, quantos miligramas do medicamento a criança receberá em cada dose?

- a) 2,5 mg.
- b) 5,5 mg.
- c) 11 mg.
- d) 22 mg.
- e) 25 mg.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

344. (IBFC/2017/EBSERH)
A técnica para administração de medicamentos por via intramuscular, que deve ser colocada a mão não dominante no quadril contralateral do paciente apoiando a extremidade do dedo indicador sobre a espinha íliaca anterossuperior e o dedo médio ao longo da crista íliaca, espalmar a mão sobre a base do grande trocânter do fêmur, formando um triângulo invertido ou um “V”; e aplicar o medicamento no triângulo formado é denominada:

- a) Ventroglútea.
- b) Dorsoglútea.
- c) Vasto lateral da coxa.
- d) Deltóide.
- e) Acromial.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

345. (IBFC/2017/EBSERH)
Existem variadas formas de apresentação de medicamentos. Assinale a alternativa correta que contemple a definição de elixir.

- a) É uma mistura não homogênea de determinada substância sólida e um líquido, em que a parte sólida fica suspensa no líquido.
- b) É uma solução que, além do soluto, contém 20% de açúcar e 20% de álcool.
- c) É uma solução que contém um soluto e um solvente e 2/3 de açúcar.
- d) É composta por dois tipos de líquidos imiscíveis, sendo caracterizados pelo óleo e a água.
- e) É uma forma semissólida, colóide, que proporciona absorção rápida.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

346. (IBFC/2017/EBSERH)
Foi prescrito soro glicosado 7,5% de 500mL para infundir de 6/6 horas. Disponível soro glicosado 5% de 500ml e ampolas de glicose de 10ml a 50%. Serão necessárias _____ ampolas de glicose de 10 mL a 50% para a transformação do soro glicosado de 5% a 7,5%. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) 5
- b) 2
- c) 1,5
- d) 3
- e) 2,5

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

347. (IBFC/2017/EBSERH)
A prescrição médica é soro glicosado 6,4% de 250mL para infundir de 8/8h. Disponível soro glicosado 5% de 250mL e ampolas de glicose de 20mL a 50%. Será necessário acrescentar _____mL de glicose a 50% para transformar o soro glicosado de 5% a 6,4%. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) 12,8ml
- b) 2,8ml
- c) 5ml
- d) 7ml
- e) 3,75ml

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

348. (IBFC/2017/EBSERH)

Foi prescrito preparar 500mL de KMnO₄ a 1:10.000, usando comprimidos de KMnO₄ de 50mg. Será necessário utilizar _____ comprimido(s) de KMnO₄ de 50mg para preparar a solução prescrita. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) 0,5
- b) 2
- c) 1,5
- d) 3
- e) 1

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

349. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando o Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos do Ministério da Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

I. As prescrições verbais devem ser restritas às situações de urgência/emergência, devendo ser imediatamente escritas no formulário da prescrição, após a administração do medicamento.

II. Realizar a antisepsia do local da aplicação para administração de medicamentos por via parenteral.

III. Não deverão ser administrados medicamentos em casos de prescrições vagas como: “fazer se necessário”.

- a) I, II e III estão corretas
- b) I, II e III estão incorretas
- c) Apenas I e II estão corretas
- d) Apenas II e III estão corretas
- e) Apenas III está correta

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

350. (IBFC/2016/EBSERH)

Para uma injeção intramuscular no músculo dorso-glúteo, o volume máximo a ser administrado em adultos é de:

- a) 3 ml
- b) 2 ml
- c) 4 ml
- d) 2,5 ml
- e) 1 ml

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

351. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

A escolha da via depende da apresentação do medicamento, da indicação clínica e das condições do paciente, porém qualquer que seja a via escolhida, é necessário observar um princípio básico. Para isso, o profissional de enfermagem deve:

a) administrar o medicamento em determinada situação quando preparado por terceiros, ou seja, pelo colega de trabalho do setor de enfermagem.

b) medir a dose certa; usar o medicamento certo; administrar o medicamento certo; administrar na hora certa, no paciente certo e na via certa.

c) utilizar medicamentos que estejam em recipientes sem rótulos ou com nome ilegível.

d) administrar medicamentos sem certificar-se da natureza das drogas que a compõem e da existência de risco para o cliente.

e) em determinadas situações de urgências e emergências não observar os princípios básicos durante a administração de medicamento.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

352. (IBFC/2016/EBSERH)

A prescrição médica é solução de diálise 1000 mL à 4,5%. Temos disponível solução de diálise 1000 mL à 2,5% e ampola de glicose de 10 mL à 50%. Devemos acrescentar _____ mL de glicose a 50% na solução de diálise de 1000 mL à 2,5% para termos uma solução de 4,5%. Complete a frase e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) 4.
- b) 10.
- c) 20.

- d) 30.
e) 40.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

353. (IBFC/2016/EBSERH)

A prescrição médica é soro fisiológico 0,9% de 1000 mL de 12/12 horas. Devemos infundir _____ microgotas por minuto. Complete a frase e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) 28.
b) 83.
c) 27.
d) 100.
e) 51.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

354. (IBFC/2016/EBSERH)

Foi prescrito penicilina cristalina 2.300.000 UI, intravenoso (IV) de 4 em 4 horas. Apresentação: frasco-ampola de penicilina cristalina contendo 5 milhões UI (em 5 mL). Serão aspirados _____ do conteúdo para cada administração. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) 1,25ml
b) 4ml
c) 4,6ml
d) 1ml
e) 2,5ml

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

355. (IBFC/2016/EBSERH)

A administração de medicamentos deve ser feita com eficiência, segurança, qualidade e responsabilidade, para que seja atingido o objetivo terapêutico implementado e que o paciente evolua clinicamente. A _____ de fármacos possui algumas vantagens claras em relação à via oral. Por ser mais leve e mais previsível. Além disso, a dose eficaz pode ser determinada de forma mais precisa. Na terapia emergencial, esse tipo de administração é valiosa. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Administração enteral
b) Administração retal
c) Administração sublingual
d) Administração parenteral
e) Administração intra-peritoneal

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

356. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Em relação às práticas seguras na administração de medicamentos, assinale a alternativa correta.

a) Uma das regras de segurança é administrar os medicamentos que constem na prescrição “fazer se necessário”, “conforme ordem médica”, mesmo que a posologia esteja omitida.

b) A observação dos cinco certos na administração de medicamentos garante que os erros de administração não ocorrerão.

c) A antecipação ou o atraso da administração do medicamento em relação ao horário predefinido pode ser alterado de acordo com a necessidade de quem administra os medicamentos.

d) Em casos de preparo de pacientes para exames ou jejum, deve-se adiar a administração do medicamento sendo, nesse caso, desnecessário o registro da ação.

e) Deve-se implantar a dupla checagem das doses prescritas principalmente para medicamentos potencialmente perigosos/alta vigilância.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

357. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Um paciente está internado na clínica médica e recebeu prescrição médica de 6 mg de Decadron. Sabendo que a farmácia da unidade disponibiliza ampola de Decadron de 2,5 mL (4 mg/ml), deve-se aspirar quantos ml desse frasco?

- a) 0,5 mL.
b) 1,0 mL.
c) 1,5 mL.
d) 2,0 mL.
e) 2,5 mL.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

358. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Foi prescrito 3mg de Dimorf a um paciente com quadro de litíase ureteral. Sabendo que na unidade temos Dimorf 10 mg ampola de 1 mL, é correto diluir

a) uma ampola do medicamento em 9 ml de AD e administrar 3ml da solução.

b) três ampolas do medicamento em 10 ml de AD e administrar 1ml da solução.

c) uma ampola do medicamento em 20 ml de AD e administrar 5ml da solução.

d) uma ampola do medicamento em 5 ml de AD e administrar 2ml da solução.

e) duas ampolas do medicamento em 2 ml de AD e administrar 1ml da solução.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

359. (IBFC/2016/EBSE RH)

Foi prescrito Penicilina Cristalina 8.100.000UI em 100mL de soro fisiológico 0,9%, endovenoso (EV). Temos disponível Penicilina Cristalina 10.000.000UI. Sabemos que os frascos de Penicilina Cristalina 10.000.000UI apresentam ____mL de pó, e que devemos acrescentar ____mL de diluente e retirar deste frasco ____mL para correr juntamente com o soro EV. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.

- a) 1; 9; 8,1
- b) 2; 8; 16
- c) 4; 6; 8,1
- d) 4; 8; 0, 81
- e) 5; 15; 8

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

360. (IBFC/2016/EBSE RH)

Foi prescrito para um paciente Dexametasona 6 mg, via endovenosa, de 6/6 horas. Na Seção de Farmácia tem disponível Dexametasona a 0,4%, em ampola com 2 mL. O Enfermeiro realizou o cálculo para administração do medicamento e deverá ser aspirado ____de Dexametasona a 0,4% para administração da dose prescrita. Preencha a lacuna e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) 6,0 mL
- b) 1,8 mL
- c) 10,0 mL
- d) 4,0 mL
- e) 1,5 mL

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

361. (IBFC/2016/EBSE RH)

Foi prescrito para o paciente HGB, sexo masculino, 77 anos, internado na Unidade de Oncologia, o medicamento Daunorrubicina por via endovenosa. O Enfermeiro preparou e administrou o medicamento por via intramuscular, o que ocasionou danos ao paciente. Considerando os conceitos de Segurança do Paciente, nesse caso ocorreu:

- a) Falha humana, não notificável.
- b) Incidente sem dano grave.
- c) Circunstância notificável.
- d) Evento Adverso.
- e) Near Miss.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

362. (IBFC/2016/EBSE RH)

Frente a um caso de extravasamento de medicamento quimioterápico antineoplásico recomenda-se:

- a) Para todas as drogas, sem exceção, aplicar gelo ou compressa gelada durante 15 a 20 minutos nas primeiras 24 ou 48 horas.
- b) Interromper imediatamente a infusão, manter a agulha no local, conectar seringa ao dispositivo e aspirar a medicação residual existente.
- c) Interromper imediatamente a infusão, remover a agulha e manter o membro abaixo do nível do coração para evitar maior absorção da droga.
- d) Para todas as drogas, sem exceção, aplicar compressa quente durante 15 a 20 minutos nas primeiras 24 ou 48 horas.
- e) Interromper imediatamente a infusão e aplicar o antídoto de forma tópica.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

363. (IBFC/2016/EBSE RH)

A punção do cateter totalmente implantado (CTI) é a inserção de dispositivo agulhado na câmara do cateter totalmente implantado. Considerando as intervenções de enfermagem para o CTI, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() Tem a finalidade de preservar a rede venosa periférica, devido às múltiplas punções e ações irritantes e vesicantes de quimioterápicos antineoplásicos.

() Apenas salinizar o CTI quando o seu próximo uso ocorrer em um tempo superior a 24 horas.

() Lavar o cateter com 20 mL de solução fisiológica 0,9% após infusão de hemocomponentes ou de medicações para evitar a oclusão intraluminal.

() Utilizar o cateter, logo após a sua implantação, na ausência de complicações operatórias.

- a) V,V,V
- b) V,F,V,F
- c) F,V,V,F
- d) V,V,V,F
- e) V,F,V,V

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

364. (BFC/2016/EBSERH)

A ciclofosfamida é indicada para linfomas malignos, mieloma múltiplo, micose fungóide avançada, neuroblastoma, tumor de Wilm's, entre outras doenças. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I. A administração pode ser realizada por via endovenosa em push ou sob infusão e via oral.

II. Deve-se estimular a ingestão hídrica, pois a hiperhidratação previne a cistite hemorrágica.

III. Tem ação vesicante.

IV. A administração via oral do medicamento deve ser feita sempre à noite, tendo em vista a redução do metabolismo e da micção noturna.

- a) As frases I, II e III estão corretas
- b) As frases I e IV estão corretas
- c) As frases I e II estão corretas
- d) As frases III e IV estão corretas
- e) Apenas a frase III está correta

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

365. (IBFC/2016/EBSERH)

A prevenção do extravasamento, em especial de drogas vesicantes, é importante, pois, mesmo em quantidade mínima produz danos importantes nos tecidos, nervos e tendões subjacentes.

Considerando os cuidados básicos para prevenção do extravasamento de antineoplásicos, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() Evitar o uso de veias puncionadas há mais de 24 horas, mesmo que apresentem bom retorno venoso.

() Observar as queixas do paciente como dor, queimação e agulhadas, que são sintomas de extravasamento.

() Recomenda-se na seguinte ordem de preferência na escolha venosa: 1) antebraço, 2) dorso da mão, 3) punho, e 4) fossa antecubital.

() Não devem ser utilizados recursos como aplicação de calor e garroteamento para prover a dilatação dos vasos sanguíneos.

- a) V,V,V,F
- b) F,F,F,V
- c) F,V,V,V
- d) V,V,F,F
- e) F,V,V,F

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

366. (IBFC/2016/EBSERH)

Uma criança de 6 meses, internada na Unidade de Pediatria, tem a prescrição médica para administrar 500.000UI de Penicilina Cristalina diluída em 50 mL de soro fisiológico 0,9%, via Endovenosa, em 1 hora. O setor de farmácia possui frasco-ampola de 5.000.000UI. Considerando o preparo específico deste medicamento, o profissional de enfermagem deverá introduzir ____mL de diluente para diluição. Posteriormente, aspirar ____ mL do medicamento diluído para colocar no frasco de soro fisiológico 0,9%, conforme prescrição médica. O gotejamento do soro será de ____ microgotas/minuto. Preencha a lacuna e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- a) 6; 2; 17
- b) 10; 1; 17
- c) 4; 0,5; 51
- d) 8; 1; 51
- e) 10; 0,5; 6

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

367. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando o cateter central de inserção periférica (PICC), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() Este procedimento é particularmente útil em recém-nascidos prematuros extremos e bebês em uso de hidratação venosa e nutrição parenteral por mais de sete dias e com manuseio restrito.

() Esse cateter caracteriza-se por ser radiopaco, de silicone, com ou sem guia e é específico para implantação em veia central por acesso periférico.

() Esse cateter deve ser mantido pérvio por meio de infusão contínua de líquidos, sendo proibida a salinização ou heparinização.

() Qualquer acesso venoso pode ser utilizado, porém a veia de preferência é a basilíca.

- a) V,F,F,F
- b) F,F,V,V
- c) V,V,F,V
- d) V,V,V,V
- e) F,V,F,F

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

368. (IBFC/2016/EBSERH)

Um medicamento foi preparado e conectado ao paciente de forma errada. Entretanto, o erro é detectado antes do início da administração do medicamento ao paciente. Considerando os conceitos de segurança do paciente, é correto afirmar que houve a ocorrência de:

- a) Near Miss (quase erro).
- b) Evento Adverso.
- c) Incidente sem dano.
- d) Circunstância notificável.
- e) Violação.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

369. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre administração de medicamentos em via subcutânea (SC), assinale a alternativa correta.

- a) O volume indicado para essa via é de 0,5 ml até 3,0 ml.

b) Essa via deve ser usada quando o paciente tem doença vascular oclusiva.

c) É uma via utilizada com frequência na aplicação de medicamentos em tratamento de longa duração, em pós-operatórios, e na profilaxia de ocorrências vasculares obstrutivas.

d) Essa via é empregada, sobretudo para fins diagnósticos, quando se testam alergias ou reação para tuberculose.

e) Essa via resulta em pouca absorção sistêmica e produz efeito principalmente local.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

370. (IBFC/2016/EBSERH)

Foi prescrito 500ml de Soro Glicosado (SG) a 10% para correr de 8 em 8 horas. Temos disponível 500ml de SG a 5% e ampolas de 20mL de glicose a 50%. Devem ser acrescentados _____ mL de glicose a 50% no frasco de SG a 5% para transformá-lo em SG a 10% e o número de gotas deve ser _____ para correr o medicamento em 8 horas. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) 25; 20 gts/minuto.
- b) 40; 23 gts/minuto.
- c) 55; 21 gts/minuto.
- d) 10; 20 gts/minuto.
- e) 60; 22 gts/minuto.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

371. (IBFC/2016/EBSERH)

Para um paciente internado em uma enfermaria de clínica médica, consta na prescrição: 2 litros de KMnO_4 a 1:40.000, a partir de comprimidos de KMnO_4 de 50mg. Precisa-se de _____ de KMnO_4 , que corresponde a _____ de 50mg para preparar 2 litros na concentração de 1:40.000. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) 0,30g ou 300mg; 6 comprimidos.
- b) 0,10g ou 100mg; 2 comprimidos.
- c) 0,20g ou 200mg; 4 comprimidos.
- d) 0,025g ou 25mg; 1/2 comprimido.
- e) 0,05g ou 50mg; 1 comprimido.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

372. (IBFC/2016/EBSERH)

O médico prescreveu para paciente TFD, 65 anos, leite 08 da Unidade de Clínica Cirúrgica 2.650.000UI de Penicilina Cristalina diluído em 200 mL de soro fisiológico 0,9% para correr em 2 (duas horas), a cada 6 horas. A unidade dispõe de frasco-ampola de 5.000.000UI de Penicilina Cristalina. Para o preparo do medicamento, deverá aspirar _____ de diluente e colocar no frasco-ampola da Penicilina Cristalina para diluição. Após diluição, aspirar _____ do frasco-ampola e colocar no frasco de soro para administração da dose prescrita. O gotejamento do soro será de _____. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) 10 mL, 5,3 mL, 34 gotas/minuto
- b) 6 mL, 2,7 mL, 102 gotas/minuto
- c) 8 mL, 5,3 mL, 34 gotas/minuto
- d) 5 mL, 2,7 mL, 102 gotas/minuto
- e) 10 mL, 5 mL, 11 gotas/minuto

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

373. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Recomenda-se que os produtos hemoterápicos permaneçam 30 minutos a determinados graus, para aquecimento antes de administrá-lo no paciente. Qual é a temperatura ideal?

- a) 30° a 35°.
- b) 20° a 24°.
- c) 16° a 20°.
- d) 36° a 40°.
- e) 40° a 45°.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

374. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A via parenteral é utilizada na administração de medicamentos não absorvíveis pelo trato gastrointestinal e proporciona ação imediata dos medicamentos, além de estar subdividida em diversas vias, sendo elas:

- a) vaginal, sublingual, intradérmica e endovenosa.
- b) IM, ID, oral, retal.
- c) auricular, nasal, tópico, oral.
- d) intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa.
- e) nasal, oftalmológica, intramuscular.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

375. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Prescrição médica solicita Soro Glicosado a 10%. Temos disponível soro glicosado a 5% de 500mL e ampola de glicose 50% de 20 mL. Para chegar à solução solicitada pelo médico, quantas ampolas de glicose 50% devemos utilizar?

- a) 2
- b) 3
- c) 2,5
- d) 1
- e) 1,5

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Imunização

376. (CESPE/2018/EBSERH)

Jane, com cinquenta e dois anos de idade, compareceu a um posto de vacinação juntamente com seus netos — Pedro, com quatro anos de idade, e João, com nove meses de vida. Jane não se lembra de quando foi vacinada pela última vez, mas acredita que tenha sido há mais de vinte anos, e também não sabe contra quais doenças foi vacinada, porque não possui cartão de vacinação. As crianças tomaram, em seu devido tempo, todas as vacinas preconizadas pela Política Nacional de Imunização, como demonstrado em seus respectivos cartões de vacinação. Nenhum deles tem contraindicação para ser vacinado.

Com relação a essa a situação hipotética, julgue o seguinte item.

Jane deverá receber dose única de vacina contra hepatite B, dose única de vacina contra febre amarela, a primeira dose da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e uma dose da vacina dupla — adulto (dT: difteria e tétano).

- c) CERTO
- e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

377. (CESPE/2018/EBSERH)

Com relação a essa a situação hipotética, julgue o seguinte item.

Pedro deverá receber o segundo reforço da dTP (difteria, coqueluche e tétano) e da VOP (oral contra poliomielite) e dose única da vacina contra varicela.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

378. (CESPE/2018/EBSERH)

Com relação a essa a situação hipotética, julgue o seguinte item.

João deverá tomar apenas dose única da vacina contra a febre amarela.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

379. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o próximo item, a respeito de especificidades e indicações relativas a vacinas.

Após a administração de uma vacina, a ocorrência, no vacinado, de temperatura acima de 38,5 °C constitui contraindicação à aplicação de dose subsequente.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

380. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o próximo item, a respeito de especificidades e indicações relativas a vacinas.

Alguns indivíduos apresentam reação anafilática aos componentes dos imunobiológicos, em cujo mecanismo estão envolvidos os mastócitos. Essa reação, que ocorre nas primeiras duas horas após a aplicação, é caracterizada pela presença de urticária, sibilos, laringoespasmos e edema de lábios, podendo evoluir para hipotensão e choque anafilático.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

381. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o próximo item, a respeito de especificidades e indicações relativas a vacinas.

O desenvolvimento das atividades da sala de vacinação é responsabilidade da equipe de enfermagem, após treinamento e capacitação para os procedimentos de manuseio, conservação, preparo e administração, registro e descarte dos resíduos resultantes das ações de vacinação.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

382. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o próximo item, a respeito de especificidades e indicações relativas a vacinas.

A sala de vacinação é classificada como área crítica, devendo ser destinada exclusivamente à administração dos imunobiológicos, mas, excepcionalmente, considerando-se os diversos calendários de vacinação existentes, ela pode ser compartilhada com a administração dos imunobiológicos.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

383. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o próximo item, a respeito de especificidades e indicações relativas a vacinas.

Após a administração de uma vacina, a ocorrência, no vacinado, de temperatura acima de 38,5 °C constitui contraindicação à aplicação de dose subsequente.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

384. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o próximo item, a respeito de especificidades e indicações relativas a vacinas.

No caso de idosos que nunca tenha sido vacinado contra febre amarela ou não tenha comprovante de vacinação, caberá ao médico avaliar a relação custo-benefício da vacinação, além da necessidade de administrar uma dose, considerando o risco da doença e de eventos adversos nessa faixa etária e/ou decorrentes de comorbidades, bem como o histórico vacinal.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

385. (CESPE/2018/EBSERH)
Julgue o próximo item, a respeito de especificidades e indicações relativas a vacinas.

A vacina contra hepatite B está indicada para indivíduos integrantes dos grupos vulneráveis, independentemente da faixa etária ou da comprovação da condição de vulnerabilidade.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

386. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)
Sobre a vacina Tetraviral, é correto afirmar que:

- a) protege contra difteria, tétano, coqueluche e sarampo.
b) a primeira dose deve ser feita aos 09 meses de idade.
c) a via de administração é a subcutânea.
d) a região glútea é o local preferencial de aplicação.
e) deve ser administrada no mesmo dia da vacina de febre amarela.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

387. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)
Paciente feminina de 04 meses foi levada a uma unidade de saúde para vacinação. Sabendo que as vacinas anteriores estão em dia, nessa idade, a paciente receberá a segunda dose das seguintes vacinas, exceto:

- a) vacina pentavalente.
b) vacina meningocócica C conjugada.
c) vacina inativada poliomielite.
d) vacina oral de rotavírus humano.
e) vacina pneumocócica 10 valente.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

388. (IBFC/2017/EBSERH)
De acordo com Ministério da Saúde, a vacina HPV (Papiloma Vírus Humano) quadrivalente estará disponível para o ano de 2017 para:

- a) Sexos feminino e masculino: faixa etária de cinco a nove anos de idade; sendo aplicadas duas doses, com esquema vacinal de 0 e 6 meses.
b) Sexo feminino: faixa etária de nove a quatorze anos de idade; e sexo masculino: faixa etária de doze a treze anos de idade; sendo aplicadas duas doses, com esquema vacinal de 0 e 6 meses.
c) Sexo feminino: faixa etária de dez a quinze anos de idade; sendo aplicadas três doses, com esquema vacinal de 0, 6 meses e 12 meses.
d) Sexo feminino: faixa etária de nove a dezoito anos de idade; sendo aplicadas três doses, com esquema vacinal de 0, 6 meses e 60 meses.
e) Sexos feminino e masculino: faixa etária de onze a dezesseis anos de idade; sendo aplicadas duas doses, com esquema vacinal de 0 e 6 meses.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

389. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)
Bebê de cinco meses é levada à Unidade Básica de Saúde pela mãe, para realização de Consulta de Puericultura com a enfermeira. Na ocasião, a enfermeira verificou que as vacinas a serem administradas no quarto mês de vida da criança estavam em atraso. Essas vacinas correspondem à:

- a) Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite, Pneumocócica 10 valente, Rotavírus.
b) Pentavalente, Vacina Oral Poliomielite, Pneumocócica 10 valente, Rotavírus.
c) Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite, Meningocócica C, Rotavírus.
d) Vacina Oral Poliomielite, Meningocócica C, Rotavírus, Febre Amarela.
e) Vacina Inativada Poliomielite, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C, Rotavírus.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

390. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)
Irritabilidade, vômitos e diarreia moderados e invaginação intestinal constituem eventos adversos que podem ocorrer após a vacinação com:

- a) Vacina Oral Poliomielite.
- b) Meningocócica C.
- c) Pneumocócica 10 valente.
- d) Tríplice Viral.
- e) Rotavírus.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

391. (IBFC/2017/EBSERH)
Sobre os instrumentos do Sistema Nacional de Vigilância dos Eventos Adversos Pós-Vacinação (SNVEAPV), analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. Todos os eventos adversos graves e/ou inusitados devem ser notificados imediatamente ao nível hierárquico superior, com finalidade de alertar a vigilância e obter orientações quanto à investigação, se necessário.

II. Deve ocorrer o fixo imediato desses eventos, dentro das primeiras 24 horas por meio de telefone, e-mail, fax.

III. O tempo máximo para se iniciar uma investigação de campo em tempo oportuno é de 96 horas após a notificação.

Estão corretas as alternativas:

- a) I e II, apenas
- b) I apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e III, apenas
- e) I, II e III

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

392. (IBFC/2017/EBSERH)
Sobre os fatores que influenciam a resposta imune, relacionados à vacina, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() O uso de vias de administração diferentes da preconizada não interferem na resposta imune.

() De modo geral, as vacinas inativadas necessitam de mais de uma dose para uma adequada proteção, enquanto as vacinas virais atenuadas geralmente necessitam apenas de uma dose para uma adequada proteção.

() Os adjuvantes são substâncias presentes na composição de algumas vacinas e que aumentam a resposta imune dos produtos que contêm micro-organismos inativados ou seus componentes.

() Os adjuvantes são utilizados somente em vacinas que contêm micro-organismos vivos.

- a) V,V,V,V
- b) F,F,V,V
- c) F,V,V,F
- d) V,F,V,F
- e) F,V,F,V

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

393. (IBFC/2017/EBSERH)

Sobre a vacina BCG, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. Na rotina, a vacina pode ser administrada em crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

II. No caso de contato intradomiciliar de paciente com diagnóstico de hanseníase que não apresenta sinais e sintomas, independentemente de ser paucibacilar ou multibacilar, o esquema de vacinação deve considerar a história vacinal do contato.

III. O esquema de vacinação com a vacina BCG corresponde à dose única o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade.

- a) I e IV, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) I apenas
- d) II, III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

394. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Uma técnica de enfermagem do trabalho de uma Usina de Álcool realizou uma campanha de vacinação para todos os colaboradores da empresa. Ao atender determinado colaborador, de 22 anos, ela verificou as seguintes informações vacinais:

- Vacina da febre amarela – tomou uma dose em 07/05/2014.
- Vacina da Hepatite B – recebeu a primeira dose em 07/05/2014 e a outra dose em 07/06/2014.
- Vacina dupla adulto – recebeu a primeira dose em 07/05/2014 e outra dose em 07/09/2015.
- Vacina contra gripe – não recebeu nenhuma dose.
- Vacina contra varicela e caxumba – recebeu duas doses.

Considerando as informações apresentadas, quais vacinas esse colaborador deverá tomar para completar o esquema vacinal?

- a) Dupla adulto e febre amarela.
- b) Dupla adulto e hepatite B.
- c) Febre amarela e hepatite B.
- d) Gripe e hepatite B.
- e) Dupla adulto e gripe.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

395. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre a vacina rotavírus humano G1P1[8] (atenuada) (VORH), analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() É indicada para a prevenção de gastroenterites causadas por rotavírus dos sorotipos G1 em crianças menores de 1 ano de idade. Embora seja monovalente, a vacina oferece proteção cruzada contra outros sorotipos de rotavírus que não sejam G1 (G2, G3, G4, G9).

() Mesmo que a criança esteja na faixa etária preconizada, a vacina é contraindicada na presença de imunodepressão severa.

() A vacina não está contraindicada para crianças que tenham histórico de invaginação intestinal ou com malformação congênita não corrigida do trato gastrointestinal.

() O esquema corresponde a duas doses, administradas aos 2 e 4 meses de idade. A primeira dose pode ser administrada a partir de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias. A segunda dose pode ser administrada a partir de 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias. Mantenha intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

() O volume a ser administrado é 0,5 mL.

- a) F,V,F,V,F.
- b) V,V,V,V,V.
- c) F,F,V,F,V.
- d) V,V,F,V,F.
- e) V,F,V,F,V.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

396. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre a vacina contra a varicela, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta

I. A primeira dose da vacina com componente da varicela é administrada aos 15 meses de idade (vacina tetraviral).

II. A segunda dose da vacina com componente da varicela é administrada aos 2 anos de idade (vacina varicela).

III. Na profilaxia de pós-exposição, a vacina pode ser utilizada a partir dos 9 meses de idade.

IV. O volume da dose da vacina é de 0,5 mL.

V. Considerar como válida a dose administrada a menores de 12 meses de idade na vigência de surto.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III, IV e V.
- b) II, IV e V, apenas.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) I, II e III, apenas.
- e) II, III, IV e V, apenas.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

397. (IBFC/2016/EBSERH)

A vacina papilomavírus humano (HPV) é indicada para jovens _____ de _____ anos de idade, para a imunização ativa contra os tipos de HPV _____, a fim de prevenir contra câncer de colo do útero, vulvar, vaginal e anal, lesões pré-cancerosas ou displásicas, verrugas genitais e infecções causadas pelo HPV. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) De ambos os sexos; 9 a 11 anos; 11 e 18.
- b) De ambos os sexos; 10 a 12 anos; 12 e 18.
- c) Do sexo feminino; 9 a 14 anos; 6, 14 e 18.
- d) Do sexo feminino; 9 a 13 anos; 6, 11, 16 e 18.
- e) Do sexo feminino; 10 a 13 anos; 12, 14, 18, 20.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

398. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre a vacina da raiva humana, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. A vacina é indicada somente para a profilaxia da raiva humana em situações de pré e pós-exposição.

II. Pré-exposição são considerados os indivíduos que, por força de suas atividades, estão permanentemente expostos ao risco da infecção pelo vírus, como médicos veterinários, biólogos, profissionais e auxiliares de laboratórios de virologia e anatomopatologia para a raiva, estudantes de veterinária, biologia e agrotecnia; entre outros.

III. Pós-exposição ao vírus rábico em indivíduos que sofreram mordedura, arranhadura e lambadura de mucosa provocadas por animais transmissores da doença.

IV. Não há contraindicação específica para vacina e soro em caso de profilaxia pós-exposição, considerando-se a gravidade e a evolução fatal da doença, mesmo durante a gravidez, mulheres amamentando, doenças intercorrentes ou pessoas imunocomprometidas, incluindo doentes com HIV/aids.

- a) IV apenas
- b) I, II, III e IV
- c) I, II e III, apenas
- d) II e III, apenas
- e) II, III e IV, apenas

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

399. (IBFC/2016/EBSERH)

O calendário nacional de vacinação é o guia para a vacinação correta das crianças, desde o nascimento, de acordo com o calendário do ano de 2016 assinale a alternativa correta.

- a) A única vacina administrada ao nascer é a BCG, não existem contra indicações para essa vacina.
- b) A vacina contra a Hepatite B deve ser administrada nos tempos 2-4-6 meses.
- c) A vacina de Hepatite A deve ser administrada em crianças de 15 meses até menores de 2 anos de idade.
- d) A Vacina contra a influenza é oferecida anualmente às crianças maiores que 6 meses e menores que 3 anos de idade.

e) Pneumocócica 10 valente deve ser administrada em 2 doses aos 4 e 8 meses de idade.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

400. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Paciente feminina, 07 meses, está com suas vacinas em dia. Portanto, nessa faixa etária, a paciente não recebeu dose(s) de qual das vacinas listadas a seguir?

- a) Inativada poliomielite (VIP).
- b) Tríplice viral.
- c) Pneumocócica 10 valente.
- d) Vacina oral de rotavírus humano.
- e) BCG.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

401. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Antes de completar o primeiro ano de vida, quantas doses e com qual idade a criança deverá receber a vacina Meningocócica C?

- a) 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade.
- b) 1(uma) dose, aos 9 (nove) meses.
- c) 2 (duas) doses, aos 3 (três) e 5 (cinco) meses de idade.
- d) 2 (duas) doses, aos 7 (sete) e 9 (nove) meses de idade.
- e) 3 (três) doses, ao nascer, 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

402. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Qual das vacinas descritas a seguir não faz parte das vacinas de rotina do Calendário Básico do Programa Nacional de Imunização?

- a) Hepatite A.
- b) BCG.
- c) Meningocócica B.
- d) Febre Amarela.
- e) Vacina tetra viral.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

403. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Das vacinas do Calendário Básico do Programa Nacional de Imunização, qual deve ser administrada em duas doses, sem reforço, preferencialmente aos 02 e 04 meses de idade?

- a) Tríplice bacteriana.
- b) Hepatite B.
- c) Varicela.
- d) Vacina oral contra poliomielite.
- e) Rotavírus humano.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

404. (2015/ IADES/ AL-GO)

Ao afirmar-se que a presença da cicatriz vacinal é considerada como dose para efeito de registro, independentemente do tempo transcorrido desde a vacinação até o aparecimento da cicatriz, refere-se à vacina:

- A.pentavalente.
- B.poliomielite inativada.
- C.BCG.
- D.contra varicela.
- E.contra hepatite A.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

405. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre a vacina adsorvida difteria e tétano adulto – dT (dupla adulto), assinale a alternativa correta.

- a) O intervalo entre as doses de dT é de 30 dias, com um mínimo de 15 dias.

b) A vacina dT é administrada somente em maiores de 15 anos de idade para os reforços ou usuários com esquema incompleto ou não vacinados.

c) Com esquema incompleto ou sem comprovação vacinal da dT deve-se reiniciar o esquema.

d) Com esquema vacinal completo da dT deve-se administrar uma dose a cada 10 anos.

e) Em gestante com comprovação vacinal de três doses de vacina com componente tetânico, sendo a última dose feita há mais de 5 anos, deve-se reiniciar o esquema.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

406. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre os fatores que influenciam a resposta imune relacionados ao vacinado, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. No primeiro ano de vida, o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Para algumas vacinas, devido a sua composição, e necessária a administração de um número maior de doses, de acordo com a idade, como ocorre com a vacina conjugada pneumocócica 10 valente, a meningocócica C e a vacina hepatite B.

II. As gestantes devem receber apenas vacinas vivas, para que ocorra a passagem dos antígenos vivos atenuados para o feto.

III. De maneira geral, não há contra-indicação de aplicação de vacinas virais atenuadas para as mães que estejam amamentando, pois não foram observados eventos adversos associados à passagem desses vírus para o recém-nascido.

IV. Geralmente, a reação anafilática ocorre na primeira vez em que a pessoa entra em contato com um imunobiológico. Portanto, as próximas doses não estão contra-indicadas.

a) II e IV, apenas

b) I, II, III e IV

c) I e III, apenas

d) II e III, apenas

e) I, II e III, apenas

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

407. (IBFC/2016/EBSERH)

O Manual de rede de frio apresenta orientações para organização dos equipamentos que armazenam imunobiológicos. Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

() Identificar o equipamento e sinalizar “USO EXCLUSIVO”, de maneira visível.

() Verificar no Manual do usuário a capacidade útil máxima do equipamento, entre outras informações relacionadas, antes de iniciar o armazenamento dos imunobiológicos.

() Organizar os imunobiológicos nos compartimentos internos, diferenciando a distribuição dos produtos por tipo ou compartimento, uma vez que as câmaras refrigeradas não possuem distribuição uniforme de temperatura no seu interior.

() Elaborar “Mapa Ilustrativo” do equipamento, indicando os tipos de imunobiológico armazenados por compartimento com: nome, lote, validade, quantidade e fluxo de entrada/saída.

- a) V,F,V,F
- b) V,V,V,V
- c) V,V,V,F
- d) V,V,F,V
- e) F,V,F,V

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

408. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre a vacina da Febre Amarela, assinale a alternativa correta.

- a) Indivíduos a partir de 5 anos de idade que receberam uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade, administrar duas doses do imunobiológico, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
- b) Administrar 1 dose a partir dos 9 meses de idade. Administrar 1 reforço aos 4 anos de idade (intervalo mínimo de 30 dias entre as doses).
- c) Indivíduos a partir de 5 anos de idade que nunca foram vacinados ou sem comprovante de vacinação administrar apenas 1 dose do imunobiológico e considerar vacinado.

d) Indivíduos a partir de 5 anos de idade que receberam 1 dose da vacina após completar 5 anos de idade, não administrar nenhuma dose e considerar vacinado.

e) Indivíduos a partir dos 5 anos de idade que receberam 2 doses da vacina, administrar o reforço 10 anos após a administração dessa dose.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

409. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre imunidade específica e inespecífica, assinale a alternativa correta.

- a) O único componente da imunidade inespecífica é a pele e as mucosas.
- b) A imunidade inespecífica corresponde à proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno.
- c) A imunidade inespecífica necessita de estímulos prévios.
- d) A imunidade inespecífica tem período de latência.
- e) A imunidade inespecífica é constituída de mecanismos de defesa bioquímicos e celulares que já estão presentes no organismo antes mesmo de se iniciar o processo infeccioso, respondendo, prontamente, a infecção.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

410. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre a limpeza da sala de vacinação, assinale a alternativa correta.

- a) A limpeza concorrente é completa e inclui todas as superfícies horizontais e verticais, internas e externas da sala e dos equipamentos.
- b) A limpeza concorrente da sala de vacinação deve ser realizada pelo menos duas vezes por semana.
- c) O produto usado para a desinfecção da sala de vacinação é, de preferência, o hipoclorito a 1%.
- d) A limpeza terminal da sala de vacinação deve ser realizada a cada 2 meses, contemplando a limpeza de piso, teto, paredes, portas e janelas, mobiliário, luminárias, lâmpadas e filtros de condicionadores de ar.

e) Antes de iniciar a limpeza da sala de vacinação, deve-se varrer o chão, para retirada de sujeiras existentes.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

411. (IBFC/2016/EBSERH)

Assinale a alternativa que contemple um exemplo para adiamento da vacinação.

a) Usuário que necessita receber imunoglobulina, sangue ou hemoderivados.

b) Ocorrência de evento adverso em dose anterior de uma vacina, a exemplo da reação local (dor, vermelhidão ou inflamação no lugar da injeção).

c) Doença neurológica estável ou progressiva com sequelas presente.

d) Antecedente familiar de convulsão ou morte súbita.

e) Doença aguda benigna sem febre.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

412. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Avaliando um caso de possível exposição ao vírus da raiva, em um adulto de sexo masculino, o enfermeiro indicou iniciar imediatamente o esquema com soro e cinco doses de vacina administradas nos dias 0, 3, 7, 14 e 28. Referente ao exposto, é correto afirmar que:

a) uma parte da vacina deve ser infiltrada na(s) lesão(ões).

b) a vacina deve ser preferencialmente administrada no glúteo por via intramuscular.

c) após receber soro o paciente deverá ser observado por até 30 minutos.

d) a dose indicada de soro heterólogo é de 40 UI/ kg de peso do paciente.

e) o soro homólogo é o mais utilizado devido à alta disponibilidade e ao baixo custo.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

413. (IBFC/2016/EBSERH)

A vacina adsorvida Difteria, Tétano e Pertussis (DTP) está indicada para os reforços do esquema básico de vacinação. O primeiro reforço deve ser administrado aos _____ e, o segundo, aos _____. Assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas.

a) 15 meses; 4 anos de idade.

b) 9 meses; 5 anos de idade.

c) 18 meses; 6 anos de idade.

d) 12 meses; 7 anos de idade.

e) 24 meses; 5 anos de idade.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

414. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre a vacina da Hepatite A, assinale a alternativa correta.

a) O Programa Nacional de Imunização recomenda a vacinação de crianças de 24 a 36 meses de idade.

b) A vacina não pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do calendário de vacinação do Ministério da Saúde.

c) O volume da vacina a ser administrado é de 0,5 mL via é a intramuscular.

d) A composição da vacina contém vírus da hepatite A, tem como adjuvante antibióticos e não contém hidróxido de alumínio.

e) A vacina hepatite A é apresentada sob a forma líquida em frascos multidoses.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

415. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando a organização e os cuidados com as vacinas, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. A Cadeia de Frio representa o processo logístico (recebimento, armazenamento, distribuição e transporte) da Rede de Frio.

II. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre +0°C e +10°C, sendo ideal +4°C.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

III. Deve-se realizar limpeza do equipamento da vacina principalmente na véspera de feriado prolongado ou ao final da jornada de trabalho.

IV. Os imunobiológicos devem ser organizados em bandejas sem que haja a necessidade de diferenciá-los por tipo ou compartimento, uma vez que a temperatura se distribui uniformemente no interior do equipamento.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e IV, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) II e IV, apenas.

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

416. (IBFC/2016/EBSERH)

A vacina hepatite B (recombinante) é apresentada sob a forma líqüida em frasco unido-se ou multido-se, isolada ou combinada com outros imunobiológicos. Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() A vacina contém o antígeno recombinante de superfície (HBsAg), que é purificado por vários métodos físico-químicos e adsorvido por hidróxido de alumínio, tendo o timerosal como conservante.

() A vacina previne a infecção pelo vírus das hepatites A e B.

() A vacina é indicada para recém-nascidos, o mais precocemente possível, nas primeiras 24 horas, preferencialmente nas primeiras 12 horas, ainda na maternidade ou na primeira visita ao serviço de saúde, até 30 dias de vida.

() A vacina é contraindicada para gestantes em qualquer faixa etária e idade gestacional.

- a) V,V,V,F.
- b) V,V,V,V.
- c) F,V,V,V.
- d) F,F,F,V.
- e) V,F,V,F.

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Processo de Enfermagem e Sistematização da Assistência de Enfermagem

417. (CESPE/2018/EBSERH)

Mariana, com setenta e seis anos de idade, apresenta, em atendimento hospitalar de emergência, forte dor precordial, em aperto, contínua, com irradiação para o pescoço, e leve tontura — segundo a paciente, há cerca de 30 min. Ela tem história de hipertensão arterial crônica e vem sendo acompanhada regularmente por seu cardiologista. No exame, Mariana encontra-se dispneica, agitada, com PA de 190 mmHg × 130 mmHg e oximetria de pulso em 92%.

Acerca desse caso clínico, julgue o item a seguir. No serviço de emergência, Mariana deverá ser mantida em posição de Trendelenburg e ser tranquilizada.

- c) CERTO
- e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

418. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca desse caso clínico, julgue o item a seguir. Segundo o Protocolo de Manchester, Mariana deverá ser classificada na triagem inicial como paciente em risco — cor laranja —, devendo ser reavaliada pela enfermagem a cada 10 min até que receba atendimento médico.

- c) CERTO
- e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

419. (CESPE/2018/EBSERH)

Lúcia, técnica de enfermagem, foi chamada pelo acompanhante de André, um paciente com sessenta e três anos de idade, internado havia dois dias por conta de uma pneumonia. Ao chegar ao quarto de André, Lúcia percebeu que ele parecia não respirar.

Com respeito a esse caso clínico, julgue o próximo item.

Se André não for responsivo, Lúcia deverá verificar a respiração e o pulso carotídeo do paciente, simultaneamente.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

420. (CESPE/2018/EBSERH)

Lúcia, técnica de enfermagem, foi chamada pelo acompanhante de André, um paciente com sessenta e três anos de idade, internado havia dois dias por conta de uma pneumonia. Ao chegar ao quarto de André, Lúcia percebeu que ele parecia não respirar.

Com respeito a esse caso clínico, julgue o próximo item.

Lúcia deverá checar, imediatamente, a responsividade de André, comprimindo um dos dedos dele para verificar se ele responde ao estímulo doloroso.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

421. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o seguinte item, a respeito do processo de trabalho do enfermeiro na assistência à saúde.

Um dos objetivos da assistência de enfermagem perioperatória é a orientação ao cliente e aos membros de sua família para que eles compreendam o problema de saúde, preparem-se para o tratamento e aprendam a utilizar seus próprios mecanismos fisiológicos e psicológicos, de modo a contribuir para o aumento do potencial da intervenção de enfermagem.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

422. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o seguinte item, a respeito do processo de trabalho do enfermeiro na assistência à saúde.

As três classificações de enfermagem — NANDA, NIC e NOC — foram planejadas para serem utilizadas apenas individualmente, a fim de colaborar nas etapas do processo de enfermagem, que são o diagnóstico, o planejamento, a implementação e a avaliação.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

423. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o seguinte item, a respeito do processo de trabalho do enfermeiro na assistência à saúde.

Os erros mais comuns no raciocínio diagnóstico do enfermeiro são: definição do problema a partir de dados insuficientes, ideia preconcebida quanto à resposta da pessoa examinada, omissão de pista significativa e identificação de apenas um sintoma ou uma pista como diagnóstico.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

424. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o seguinte item, a respeito do processo de trabalho do enfermeiro na assistência à saúde.

Uma das linguagens padronizadas para a classificação dos diagnósticos de enfermagem é aquela proposta pela NANDA - I (North American Nursing Diagnosis Association International), que possui, em sua estrutura taxonômica, domínios, classes e diagnósticos de enfermagem.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

425. (IBFC/2017/EBSERH)

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) apresenta várias fases. Sobre a fase do planejamento, correlacione as colunas e a seguir assinale a alternativa correta.

- (A)Estabelecimento de prioridades
(B)Estabelecimento de resultados
(C)Determinação de prescrições de enfermagem
(D)Registro ou documentação do plano

() As intervenções de enfermagem são estratégias específicas, criadas para auxiliar o cliente a chegar aos resultados.

() São também entendidos como metas ou objetivos comportamentais a serem alcançados.

() É a maneira mais eficiente de manter todos os indivíduos envolvidos no atendimento ao cliente informados sobre as modificações dos cuidados de enfermagem.

() Devem-se decidir quais problemas necessitam de atenção imediata e quais podem esperar; quais são de responsabilidade do enfermeiro e quais devem ser comunicados a outro profissional de saúde.

- a) C,B,D,A
- b) A,B,C,D
- c) D,C,B,A
- d) B,C,D,A
- e) B,A,C,D

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

426. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSE RH)

O Exame Físico consiste no levantamento de condições globais do cliente para buscar informações para subsidiar a assistência. Sobre as técnicas utilizadas no exame físico e os possíveis achados, assinale a alternativa correta.

a) Deve ser realizado sempre no sentido cefalopodal, independente da situação ou paciente.

b) No exame do pescoço, é necessário atentar-se para contraturas, glândula tireoide e linfonodos palpáveis.

c) Na avaliação da cabeça e pescoço, utilizam-se as técnicas de inspeção e percussão.

d) Durante a ausculta pulmonar, é possível auscultar sons normais como os ruídos adventícios e também sons anormais como os murmúrios vesiculares que se dividem basicamente em: síbilos, estertores crepantes, roncos e atrito pleural.

e) No exame físico do abdômen, é necessário realizar primeiramente a percussão, pois a realização da ausculta e a palpação podem interferir nos sons observados.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

427. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSE RH)

Paciente, 78 anos, sexo feminino, internada no setor de clínica médica, após a avaliação do enfermeiro, recebe o seguinte diagnóstico de enfermagem: "integridade tissular prejudicada, relacionada à imobilização física de circulação alterada evidenciada por ferida com área de sobreposição de 8cm na região trocantérica direita". O diagnóstico realizado pelo enfermeiro corresponde, na NANDA, ao domínio:

- a) nutrição.
- b) conforto.
- c) segurança/proteção.
- d) enfrentamento/tolerância ao estresse.
- e) eliminação e troca.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

428. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSE RH)

A fase inicial do processo de enfermagem, comumente conhecida como histórico de enfermagem ou coleta de dados de enfermagem, corresponde ao levantamento de dados por meio da aplicação do método científico. Sobre essa fase do processo de enfermagem, assinale a alternativa incorreta.

a) Diz respeito a basicamente três atividades: coleta de dados objetivos e subjetivos, organização dos dados e documentação metódica.

b) Serve de embasamento para as decisões quanto a diagnósticos e intervenções de enfermagem, além da avaliação dos resultados.

c) A coleta de dados é realizada por meio da anamnese, na qual o enfermeiro utiliza um roteiro semiestruturado, e pela realização do exame físico com a aplicação das técnicas propedêuticas.

d) Nessa etapa do processo, devem ser valorizados os dados de natureza clínica, sendo os aspectos psicossociais considerados de pouca relevância nesse momento.

e) A parte do exame físico inclui a mensuração dos SSVV, perímetros, estatura e peso, além de dados coletados por meio da inspeção, palpação, percussão e ausculta, a fim de identificar sinais normais e anormais nos diversos sistemas.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

429. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)

Sobre os aspectos legais da Sistematização da Assistência de Enfermagem e do Processo de Enfermagem, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem – COFEN assinale a alternativa correta.

a) O COFEN estabelece normas e diretrizes sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e implementação do Processo de Enfermagem nos serviços públicos de saúde, porém não contempla os serviços privados de saúde.

b) Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, consiste na fase V do processo de enfermagem, denominada avaliação de enfermagem.

c) Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o Processo de Enfermagem é usualmente denominado como Atendimento de Enfermagem.

d) O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas que são independentes entre si.

e) A determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana, em um dado momento do processo saúde e doença, refere-se à IV etapa do PE, ou seja, Implementação.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

430. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)

Para garantir uma assistência de enfermagem de qualidade, o enfermeiro deve assumir o ensino do paciente, como parte integrante de suas funções, inserindo-o na própria assistência de enfermagem e garantindo sua autonomia. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

a) Nos espaços de ensino do autocuidado, perdem-se, muitas vezes, oportunidades de diálogo com o outro, desprezando-se seus saberes e experiências.

b) O ensino para o autocuidado e a autonomia para o cuidado de si devem ser realizados por meio de orientações técnicas, priorizando-se os aspectos biomédicos.

c) Considerando-se que a saúde é um fenômeno social, o ensino ao paciente deve ser realizado através de projetos unilaterais, individualizados e descontextualizados dirigidos ao ensino de competências para o cuidado de si.

d) O sucesso da promoção do autocuidado como investimento na autonomia dos sujeitos, deve ocorrer por imperativos da saúde através da uniformização de padrões de comportamento.

e) A partir do movimento da promoção da saúde, passou-se a valorizar o potencial de sujeição de modelagens de educação em saúde que não reconhecem, nem valorizam, a autonomia dos indivíduos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

431. (IBFC/2017/EBSERH)

Sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.

II. O Processo de Enfermagem se organiza em seis etapas inter-relacionadas, independentes e não recorrentes.

III. Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o Processo de Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como Consulta de Enfermagem.

- a) I, II e III
- b) I e II, apenas
- c) I apenas
- d) I e III, apenas
- e) II e III, apenas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

432. (IBFC/2016/EBSERH)

Assinale a alternativa que contemple a descrição da fase Histórico de Enfermagem, da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), segundo a resolução do Conselho Federal de Enfermagem número 358/2009.

- a) Determinação dos resultados que se espera alcançar.
- b) Tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem, que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
- c) Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.
- d) Realização das ações ou intervenções determinadas.
- e) Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado .

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

433. (IBFC/2016/EBSERH)

Assinale a alternativa que apresenta a prescrição adequada de enfermagem para as áreas eritematosas para um paciente com diagnóstico de enfermagem “Integridade da pele prejudicada: reações eritematosas e descamativas úmidas à radioterapia”:

- a) Evitar o uso de sabões, cosméticos, perfumes, talcos, loções e pomadas na região afetada.
- b) Romper bolhas que tenham sido formadas na região afetada.
- c) Utilizar barbeador de borda reta na região afetada.
- d) Aplicar bolsas de água quente ou almofadas de aquecimento na região afetada.
- e) Aplicar bolsas de gelo na região afetada.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

434. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando a realização do Processo de Enfermagem, leia as frases abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. Deve ser realizado, por meio de 5 fases: Coleta de Dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem); Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Implementação; e Avaliação de Enfermagem.

II. A implementação de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas do indivíduo, da família ou da comunidade, em um dado momento.

III. O diagnóstico de enfermagem pode ser definido como o julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais apresentadas por indivíduos, famílias e comunidades, a problemas de saúde ou processos de vida.

IV. A evolução de enfermagem tem por finalidade registrar informações sobre a assistência prestada, com a finalidade de comunicá-las aos membros da equipe de saúde, sendo realizada por todos os membros da equipe de enfermagem.

- a) As frases I, II, III e IV estão corretas
- b) As frases I, II e IV estão corretas
- c) As frases I e III estão corretas
- d) As frases I e IV estão corretas
- e) As frases II e III estão corretas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

435. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando o Sistema de Enfermagem de Assistência Perioperatória (SAEP), leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I. Tem como base o atendimento das necessidades humanas básicas e o processo de enfermagem.

II. É constituído de 3 etapas: visita pré-operatória de enfermagem, planejamento da assistência de enfermagem e visita pós-operatória de enfermagem.

III. Consiste exclusivamente na identificação do diagnóstico de enfermagem em pacientes cirúrgicos.

IV. Tem a finalidade de gerenciar casos, incluindo as fases de planejamento, implementação e ordenação dos serviços cirúrgicos.

- a) As afirmativas I e II estão corretas
- b) Apenas a afirmativa III está correta
- c) Apenas a afirmativa I está correta
- d) Apenas a afirmativa IV está correta
- e) As afirmativas I e IV estão corretas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

436. (IBFC/2016/EBSE RH)

Para executar o Processo de Enfermagem devem ser realizados alguns registros formais. Sobre este assunto, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. Um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.

II. Os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.

III. As ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados.

IV. Os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas.

Estão corretas as afirmativas:

- a) III e IV, apenas
- b) II, III e IV, apenas
- c) I, II, III e IV
- d) I, II e III, apenas
- e) I e II, apenas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

437. (IBFC/2016/EBSE RH)

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) número 358/2009, descreve que a fase da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) denominada _____ é o processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Histórico de Enfermagem
- b) Prognóstico de Enfermagem
- c) Avaliação de Enfermagem
- d) Prescrição de Enfermagem
- e) Evolução de Enfermagem

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

438. (IBFC/2016/EBSE RH)

O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem (Resolução COFEN nº 358/2009). O processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem recebe a denominação de _____. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) Contextualização.
- b) Diagnóstico de Enfermagem.
- c) Planejamento de Enfermagem.
- d) Implementação.
- e) Avaliação de Enfermagem.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

439. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

A Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE –, sendo atividade privativa do _____, utiliza método e estratégia do trabalho científico para identificação das situações saúde/doença.

- a) Médico.
- b) Auxiliar de Enfermagem.
- c) Enfermeiro.
- d) Técnico de Enfermagem.
- e) Enfermeiro e do Técnico de Enfermagem.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

440. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) deveser registrada formalmente no prontuário do paciente/ cliente/ usuário, devendo ser composta por:

- a) histórico de enfermagem, entrevista, diagnóstico de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, evolução da assistência de enfermagem, relatório de enfermagem.
- b) histórico de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, evolução da assistência de enfermagem, relatório de enfermagem.
- c) histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, implementação de enfermagem, evolução de enfermagem, relatório de enfermagem.
- d) histórico de enfermagem, avaliação de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, relatório de enfermagem.
- e) histórico de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, processo de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, evolução da assistência de enfermagem, relatório de enfermagem.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

441. (AOCP/2015/EBSERH)

A enfermeira responsável pelo turno de diálise é responsável pela prescrição

- a) da duração e da frequência da diálise.
- b) do tamanho e do material do hemodialisador.
- c) do peso seco estimado e do volume de ultrafiltração.
- d) da composição e do fluxo da solução de diálise.
- e) do local de punção de fístula e dos curativos de cateter temporário.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

442. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O processo de enfermagem resume-se em 5 etapas. São elas, respectivamente:

- a) diagnóstico de enfermagem, implementação, abordagem inicial, planejamento, avaliação.
- b) avaliação, implementação, abordagem inicial, planejamento, execução das atividades.
- c) abordagem inicial, diagnóstico, planejamento, implementação, avaliação.
- d) planejamento, abordagem inicial, diagnóstico de enfermagem, implementação, avaliação.
- e) diagnóstico de enfermagem, abordagem inicial, implementação, avaliação, planejamento.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

443. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O processo de enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. Referente ao assunto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O Histórico de Enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo que tem a finalidade de obter informações sobre a pessoa.
- II. O diagnóstico de Enfermagem é a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa do Planejamento de Enfermagem.
- III. O Planejamento de Enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar.

IV. A Implementação é um processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa.

V. A avaliação é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa.

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, III e V.
- c) Apenas II, IV e V.
- d) Apenas II e IV.
- e) I, II, III, IV e V.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

444. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Paciente, 73 anos, sexo masculino, é levado ao serviço de emergência com queixa de dispnéia/sufoco de início súbito enquanto assistia televisão, mas refere que já havia apresentado episódios de cansaço e falta de ar. Apresenta taquipnéia (30/min), respiração acentuada, com discreta cianose perioral, ansiedade, pressão arterial = 180/120 mmHg, frequência cardíaca = 110/minuto. A ausculta pulmonar revela estertores crepitantes bilaterais. O paciente foi diagnosticado com edema agudo de pulmão, medicado e segue consciente, em observação. A prescrição de enfermagem para o adequado posicionamento desse paciente é

- a) trendelenburg, sempre que possível, com membros inferiores fletidos.
- b) decúbito ventral com membros inferiores estendidos.
- c) decúbito dorsal com cabeceira a, no máximo, 30° de elevação e sempre com membros inferiores elevados.
- d) decúbito dorsal, com cabeceira elevada, na posição sentada e, sempre que possível, membros inferiores pendentes.
- e) decúbito lateral esquerdo com membros inferiores fletidos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

445. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Assinale a alternativa que apresenta a Resolução Cofen que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências.

- a) COFEN 172/94.
- b) COFEN 358/2009.
- c) COFEN 358/2010.
- d) COFEN 440/2013.
- e) COFEN 441/2013.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

446. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Um enfermeiro, em sua prática diária, estabeleceu que a mudança de decúbito de um paciente deve ocorrer a cada 2 horas, repassou esta ordem sistematicamente à sua equipe, cabendo aos membros desta equipe checar a realização do procedimento em impresso próprio, tão logo o procedimento seja executado. Esta ação sistemática desse enfermeiro é correspondente a qual etapa do processo de enfermagem?

- a) Planejamento de Enfermagem.
- b) Diagnóstico de Enfermagem.
- c) Prescrição de Enfermagem.
- d) Avaliação de Enfermagem.
- e) Histórico de Enfermagem.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

447. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Assinale a profilaxia mais eficaz na prevenção da NIMC (nefropatia induzida por meio de contraste).

- a) Hidratação (soro fisiológico 0,9%, 100-150mL/h) antes e depois do uso de meio de contraste iodado (MCI), Furosemida ou Manitol para “forçar” diurese (> 125mL/hora) e hemodíalise precoce quando indicado.
- b) Hidratação (solução salina isotônica ou soro hipotônico, 1,0-1,5mL/kg/h) 12 horas antes e após uso de MCI, associada à Acetilcisteína.
- c) Hidratação (solução salina hipertônica, 1,0-1,5mL/kg/h) 12 horas antes e após uso de MCI, associada à Teofilina.

d) Hidratação (solução salina isotônica, 100-150mL/h) 12 horas antes e após uso de MCI, associada à Dopamina.

e) Uso isolado de Acetilcisteína, sem protocolo de hidratação, uma vez que a desidratação não é um fator de risco bem definido para diminuição ou perda da função renal.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

448. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

São intervenções de enfermagem, segundo a Nursing Interventions Classification (NIC), usadas na prevenção da NIMC (nefropatia induzida por meio de contraste)

a) estimular ingestão hídrica oral e administrar, por via endovenosa, solução salina (SF0,45%), 12 horas antes e após o exame contrastado.

b) prescrever e administrar Acetilcisteína endovenosa antes e depois do uso de meios de contraste iodados (MCI).

c) prescrever e administrar Dopamina endovenosa depois do uso de meios de contraste não iodados (MCNI).

d) prescrever e administrar Teofilina por via oral antes e depois do uso de meios de contraste iodados (MCI).

e) induzir diurese com Furosemida ou Manitol, endovenosos, antes e depois do uso de contrastes iodados (MCI).

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

449. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Sobre diagnósticos de Enfermagem (DE; NANDA) no cateterismo cardíaco diagnóstico ou terapêutico, assinale a alternativa que apresenta o DE prioritário neste tipo de caso.

a) Integridade Tissular Prejudicada.

b) Integridade da Pele Prejudicada.

c) Risco para solidão.

d) Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais.

e) Mobilidade Física Prejudicada.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

450. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Destaca-se como estratégia tecnológica de cuidado importante e resolutive, respaldada por lei, privativa do enfermeiro, que oferece inúmeras vantagens na assistência prestada, facilitando a promoção da saúde, o diagnóstico e o tratamento precoces, além da prevenção de situações evitáveis. O enunciado refere-se

a) aos cuidados de enfermagem.

b) à triagem na enfermagem.

c) à classificação de risco.

d) à consulta de enfermagem.

e) à estratificação de risco.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

451. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Constitui-se em um processo sistemático utilizado para descrever e estimar a possibilidade de efeitos adversos decorrentes da exposição das pessoas e dos ambientes a algum agente ou fator. Deverá subsidiar a tomada de decisão, a escolha de estratégias e ações, a orientação e o monitoramento de todo o processo. O enunciado refere-se

a) ao planejamento da vulnerabilidade.

b) à avaliação de risco.

c) à aquisição de insumos.

d) ao plano de gerenciamento.

e) à governança de pólos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

452. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A tireoide é produtora dos hormônios tireoidianos (T3 e T4), que são responsáveis pelo controle de diversas partes do metabolismo dos órgãos do corpo humano. Sua atividade (produção e liberação dos hormônios) é controlada pela hipófise, através do TSH (hormônio estimulante da tireoide). Os possíveis Diagnósticos de Enfermagem no intraoperatório são:

a) Termorregulação ineficaz relacionada à alteração da taxa metabólica; Perturbação da imagem corporal relacionada à cicatriz cirúrgica; Risco de limpeza ineficaz das vias aéreas relacionadas à obstrução por aumento da tireoide.

b) Comprometimento da deglutição relacionado à obstrução mecânica, (aumento da tireoide); Perturbação da imagem corporal relacionada à cicatriz cirúrgica; Risco de limpeza ineficaz das vias aéreas relacionadas à obstrução por aumento da tireoide.

c) Comprometimento da deglutição relacionado à obstrução mecânica (edema pós-operatório); Termorregulação ineficaz relacionada à alteração da taxa metabólica; Comprometimento da troca gasosa relacionado a sangramento pós-operatório, edema ou incapacidade de deslocar secreção; Limpeza ineficaz das vias aéreas relacionada à obstrução por edema pós-operatório; Risco de infecção relacionado à ferida cirúrgica.

d) Comprometimento da deglutição relacionado à obstrução mecânica (aumento da tireoide); Termorregulação ineficaz relacionada à alteração da taxa metabólica; Perturbação da imagem corporal relacionada à cicatriz cirúrgica; Risco de limpeza ineficaz das vias aéreas relacionada à obstrução por aumento da tireoide.

e) Risco de limpeza ineficaz das vias aéreas relacionada à obstrução por aumento da tireoide.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

453. (INSTITUTO AOC/2015/EBSERH)

Existem três tipos de cirurgia cardíaca: as corretoras, as reconstrutoras e as substitutivas. Normalmente, a cirurgia cardíaca é considerada um período crítico para o paciente, devido à complexidade dos procedimentos a ela inerentes, como a circulação extracorpórea (CEC) e o prolongado tempo intraoperatório. Os diagnósticos de Enfermagem de risco para este paciente são:

a) Risco para lesão perioperatória de posicionamento; Risco para infecção; Dor; Risco para disfunção neurovascular periférica; Risco para integridade da pele prejudicada; Risco para temperatura corporal alterada (hipotermia); Risco para injúria; Mobilidade física prejudicada; Risco para déficit de volume de líquidos.

b) Risco para lesão perioperatória de posicionamento; Risco para infecção; Proteção alterada; Dor; Risco para disfunção neurovascular periférica; Risco para integridade da pele prejudicada; Risco para temperatura corporal alterada (hipotermia); Risco para injúria; Ansiedade e medo; Mobilidade física prejudicada; Risco para déficit de volume de líquidos.

c) Risco para lesão perioperatória de posicionamento; Risco para infecção; Risco para disfunção neurovascular periférica; Risco para integridade da pele prejudicada; Risco para temperatura corporal alterada (hipotermia); Risco para injúria; Risco para déficit de volume de líquidos.

d) Risco para lesão perioperatória de posicionamento; Risco para infecção; Risco para disfunção neurovascular periférica; Risco para integridade da pele prejudicada; Risco para temperatura corporal alterada (hipotermia); Risco para injúria; Ansiedade e medo; Risco para déficit de volume de líquidos.

e) Risco para lesão perioperatória de posicionamento; Risco para infecção; Proteção alterada; Dor; Risco para disfunção neurovascular periférica; Risco para integridade da pele prejudicada; Risco para temperatura corporal alterada (hipotermia); Risco para injúria; Mobilidade física prejudicada; Risco para déficit de volume de líquidos.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

454. (INSTITUTO AOC/2015/EBSERH)

O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. Qual destas etapas consiste em um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença?

- a) Planejamento da Assistência.
- b) Diagnóstico de Enfermagem.
- c) Prescrição de Enfermagem.
- d) Coleta de dados de Enfermagem.
- e) Implementação da Assistência.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Enfermagem em UTI

455. (IBFC/2016/EBSERH)

Em relação à gravidade, utiliza-se a Escala de Coma de Glasgow para se avaliar uma pessoa com TCE (trauma cranioencefálico). Assinale a alternativa que contemple o escore considerado grave no TCE.

- a) Escore acima de 18.
- b) Escore de 9 a 12.
- c) Escore 13 a 15.
- d) Escore 15 a 18.
- e) Escore abaixo de 8.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

456. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando que a pressão venosa central (PVC) é muito utilizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I. A PVC consiste na pressão de enchimento do lado esquerdo do coração, ou na pré-carga do ventrículo esquerdo, e reflete a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo na ausência de lesão valvar tricúspide.

II. A PVC deve ser mensurada nos casos de hipotensão sem resposta ao tratamento clínico, hipovolemia e necessidade de drogas inotrópicas.

III. A PVC é um parâmetro que indica a função cardíaca esquerda na ausência de disfunção cardiopulmonar, o tônus vascular do paciente e sua resposta ao tratamento e o estado de hidratação.

IV. A PVC é monitorizada continuamente por meio de um cateter venoso central inserido comumente pela veia subclávia, jugular interna ou jugular externa, que desemboca na veia cava superior, sendo conectado a um sistema transdutor de pressão.

- a) As frases I e III estão corretas
- b) As frases I, II, III e IV estão corretas
- c) As frases II e IV estão corretas
- d) As frases I e IV estão corretas
- e) Apenas a frase II está correta

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

457. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando a colocação da cânula de Guedel no paciente grave, leia as frases abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. O tamanho ideal corresponde à distância entre o lóbulo da orelha e a boca.

II. Inicialmente, a cânula deve ser introduzida com a concavidade voltada para cima (palato) e, em movimento circular de 180°, deve ser introduzida, posicionando na orofaringe.

III. É contraindicado o uso de cânula de Guedel em crianças menores de 3 anos.

- a) As frases I e II estão corretas
- b) As frases I, II e III estão corretas
- c) As frases I e III estão corretas
- d) Apenas a frase II está correta
- e) Apenas a frase I está correta

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

458. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Lactente de 5 meses, 6 kg, com história de febre alta (40° C), tosse produtiva, espirros e coriza há 4 dias, queda do estado geral e dispneia com piora progressiva há 1 dia. O diagnóstico é de pneumonia bacteriana com falência respiratória. Sem melhora após atendimento inicial, evolui para intubação orotraqueal (IOT) e ventilação mecânica (VM). Considerando os diferentes tipos de ventilação e interação paciente-ventilador, o enfermeiro pode afirmar que:

a) a Ventilação assistido-controlada (A/CV) é o modo que combina a aplicação de CPAP com PSV geralmente de maneira não invasiva, por meio de máscaras nasais ou faciais.

b) na Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV) os ciclos controlados são disparados de maneira assincronizada aos esforços respiratórios do paciente (disparo à pressão ou fluxo).

c) a Ventilação com Pressão de Suporte (PSV) não permite ajustar a quantidade de suporte que o paciente precisa. Caso o paciente não apresente esforço respiratório após um intervalo de tempo pré-estabelecido, o ventilador também irá disparar um ciclo (disparo a tempo).

d) na Pressão positiva contínua, nas vias aéreas em dois níveis (BiPAP), os ciclos respiratórios podem ser disparados pelo esforço do paciente (ciclos assistidos) e, caso este apresente um período de apneia e um intervalo de tempo pré-determinado seja atingido, o ventilador também irá disparar ciclos completo (ciclos controlados).

e) a Pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) refere-se à aplicação de uma pressão constante na via aérea, objetivando aumentar a capacidade residual funcional, mantendo as vias aéreas abertas, atuando nas unidades alveolares colapsadas e prevenindo atelectasias.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

459. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Mulher, 50 anos, admitida na UTI, vinda do centro cirúrgico, POI de Tumor Cerebral em VM, em uso de PIC (pressão intracraniana), precisa ser monitorizada para mensuração da PIC. Diante desse caso, qual é o valor normal da PIC?

- a) 5 a 10 mmhg.
- b) 0 a 15 mmhg.
- c) 15 a 20 mmhg.
- d) 20 a 25 mmhg.
- e) 30 a 40 mmhg.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

460. (IBFC/2016/EBSERH)

_____ é o melhor parâmetro de avaliação da intensidade da dor. É solicitado ao paciente que assinale a intensidade de seus sintomas em uma escala de 0 a 10, correspondendo o zero a ausência de dor e o 10 a pior dor imaginável. Preencha a lacuna e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) A escala de coma de Glasgow (ECG)
- b) A escala comportamental da dor (ACD)
- c) A escala visual analógica (EVA)
- d) O questionário McGill de dor (QMD)
- e) O inventário breve de dor (IBD)

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

461. (IBFC/2016/EBSERH)

É uma das estratégias recomendadas para redução de Pneumonias Associadas à Ventilação Mecânica (PAV):

- a) Continuidade da sedação, com o objetivo de evitar lesão e proceder a extubação precoce
- b) Monitorar a porcentagem de aderência à vacina Anti-Pneumocócica entre profissionais de saúde
- c) Avaliação da realização de Hemocultura, com resultado negativo ou positivo

d) Manutenção do decúbito elevado (acima de 30°C)

e) Periodicamente monitorar a frequência de testes diagnósticos positivos para Leishmaniose em pacientes de alto risco

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

462. (IBFC/2016/EBSERH)

Os avanços na tecnologia de aparelhos de ventilação mecânica têm permitido diferentes abordagens ventilatórias do recém-nascido (RN). Entre as modalidades de ventilação, o modo _____ é quando o aparelho fornece suporte ventilatório com picos de pressão ou volumes correntes e tempos inspiratórios predeterminados em resposta ao esforço respiratório espontâneo (ciclos assistidos). Se o RN não realizar esforço inspiratório em um determinado período de tempo, o respirador fornece ventilações mecânicas controladas na frequência predeterminada (ciclos controlados).

Preencha a lacuna e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- a) Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV)
- b) Pressão de suporte (PS)
- c) Volume garantido (VG)
- d) Pressão inspiratória (PIP)
- e) Assistida/Controlada (A/C)

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

463. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)
Paciente, no 6º dia de internação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), vítima de acidente automobilístico, com traumatismo cranioencefálico moderado, intubado (tubo orotraqueal), sedação suspensa nas últimas 12 horas, exames laboratoriais satisfatórios, respondendo a estímulos verbais e evoluindo favoravelmente para extubação. Nos cuidados de enfermagem na extubação, o enfermeiro deve

a) retirar o tubo orotraqueal. Após isso, decidir e avaliar se o paciente tem condições de realizar a troca gasosa sem ajuda do ventilador.

b) avaliar o estado de consciência, o padrão respiratório e a estabilidade hemodinâmica do paciente, dentre outros cuidados.

c) colocar o paciente em decúbito ventral e deixá-lo descansar antes da extubação.

d) monitorar os sinais vitais durante a extubação, atinando que o suporte ventilatório com uso de tubo orotraqueal consiste em ventilação mecânica não invasiva.

e) manter o paciente em posição de litotomia para facilitar a retirada do tubo orotraqueal.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

464. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
De acordo com o artº 14 da resolução anvisa nº 7/2010, deve ser designada uma equipe multiprofissional, legalmente habilitada, a qual deve ser dimensionada, quantitativa e qualitativamente, de acordo com o perfil assistencial, a demanda da unidade e legislação vigente para atuação exclusiva na unidade de terapia intensiva. Quantos enfermeiros assistenciais e técnicos de enfermagem devem ter, por turno, a UTI?

a) 3 enfermeiros assistências para cada oito leitos e 01 técnico de enfermagem para cada dois leitos.

b) 2 enfermeiros assistências para cada seis leitos e 02 técnicos de enfermagem para cada quatro leitos.

c) 3 enfermeiros assistências para cada dez leitos e 01 técnico de enfermagem para cada leito.

d) 1 enfermeiro assistencial para cada oito leitos e 01 técnico de enfermagem para cada dois leitos.

e) 2 enfermeiros assistências para cada sete leitos e 02 técnicos de enfermagem para cada três leitos.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

465. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Sobre a estrutura física da UTI, nos termos da resolução anvisa nº50/202, a lavagem das mãos deve ser realizada exclusivamente no lavatório. Em relação ao assunto, é correto afirmar que

a) deve existir um lavatório a cada 5 leitos de não isolamento.

b) deve existir um lavatório a cada 2 leitos de não isolamento.

c) deve existir um lavatório a cada 4 leitos de não isolamento.

d) deve existir um lavatório a cada 3 leitos de não isolamento.

e) não deve existir nenhum lavatório na UTI.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

466. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Homem, 34 anos, que está internado na UTI em VM (ventilação mecânica), apresentou pressão de 60/30. Qual é a medicação a ser usada para este paciente?

- a) Dobutamina.
- b) Dopexamina.
- c) Nipride.
- d) Adrenalina.
- e) Noradrenalina.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

467. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Ao realizar Escala de Coma de Glasgow em uma paciente, foi identificado que ela apresentava abertura ocular ao ser chamada, falava palavras inapropriadas e não movimentava os membros, porém apontava o local da dor. Qual é a pontuação, de acordo com a ECG, para este paciente?

- a) 8.
- b) 9.
- c) 10.
- d) 11.
- e) 15.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

468. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Mulher, 32 anos, internada na UTI com diagnóstico de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) em VM (Ventilação Mecânica), apresentou fibrilação ventricular. Administra-se adrenalina. Qual é o tempo em que deve ser administrada essa medicação?

- a) 2 a 4 minutos.
- b) 2 a 5 minutos.
- c) 3 a 4 minutos.
- d) 1 a 5 minutos.
- e) 3 a 5 minutos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

469. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Mulher, 50 anos, admitida na UTI, vinda do centro cirúrgico, POI de Tumor Cerebral em VM, em uso de PIC (pressão intracraniana), precisa ser monitorizada para mensuração da PIC. Diante desse caso, qual é o valor normal da PIC?

- a) 5 a 10 mmhg.
- b) 0 a 15 mmhg.
- c) 15 a 20 mmhg.
- d) 20 a 25 mmhg.
- e) 30 a 40 mmhg.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

470. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Paciente, 40 anos, internado na UTI em VM 50%, com crise epilética, apresentou episódio de crise convulsiva. Administrou-se diazepam sem sucesso. Diante desse caso, qual é a medicação a ser utilizada para este paciente?

- a) Cefalotina.
- b) Fentanil.
- c) Midazolam.
- d) Fenegan.
- e) Fenitoína.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

471. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Paciente que está internado na UTI em VM (ventilação mecânica), ao exame físico, foi diagnosticado com derrame pleural. O exame físico, para os principais achados relacionados à presença de derrame pleural, deve ser desenvolvido por meio da:

- a) palpação e inspeção.
- b) inspeção, palpação e ausculta.
- c) palpação e ausculta.
- d) inspeção e ausculta.
- e) palpação, percussão e ausculta.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

472. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

A mensuração da PVC (pressão venosa central) deve ser feita com manômetro graduado em cm de água, ou através de transdutores calibrados em escala de 0 a 40 mmHg. O ponto zero de referência é na linha _____.

- a) abdominal
- b) apêndice xifoide
- c) torácica
- d) axilar média
- e) hemiclavicular

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

473. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Assinale a alternativa que apresenta os valores normais da PVC.

- a) 5 – 8 mmhg.
- b) 2 – 8 mmhg.
- c) 2 – 10 mmhg.
- d) 4 – 8 mmhg.
- e) 2 – 6 mmhg.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

474. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

A _____ é definida como a medida da pressão do compartimento abdominal, podendo ser realizada diretamente a partir da inserção de um cateter no compartimento abdominal.

- a) PVC
- b) PIA
- c) PIC
- d) PAM
- e) PPC

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

475. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Paciente internado na UTI há 02 dias, 42 anos, em VM por TOT, apresentando queimadura de 2º grau em 40% do corpo, em região facial, abdominal, membros superiores, genitália e coxa está em uso de sedação e drogas vasoativas. O plantonista solicitou a passagem de PAM. Diante deste caso, qual é o local mais indicado para punção?

- a) Artéria radial.
- b) Artéria ulnar.
- c) Artéria jugular.
- d) Artéria pediosa.
- e) Artéria poplitea.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

476. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O EAP (Edema Agudo de Pulmão) é uma forma grave de apresentação das descompensações cardíacas, constituindo uma emergência clínica que se manifesta por um quadro de insuficiência respiratória de rápido início e evolução. Diante desse quadro, o enfermeiro deve estar atento para as manifestações clínicas, que são caracterizadas por:

a) ansiedade, dispneia, cianose central, sudorese profusa acompanhada de vômitos em jato, bradicardia e hipotensão.

b) dispneia, hipotensão arterial, poliúria, turgência de jugulares, edema de membros inferiores, cianose.

c) cefaleia pulsátil, hiperglicemia, hipertensão arterial, broncoespasmo severo com cianose labial e expectoração de aspecto róseo.

d) agitação psicomotora súbita, cianose central, sudorese, taquipneia e saída de secreção amarelada pelas narinas.

e) inquietação, ansiedade, obnubilação frequência respiratória, tiragem, dispneia, sibilos, tosse, expectoração de aspecto róseo, cianose e hipoperfusão periférica.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

477. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Paciente está internado na UTI em VM (ventilação mecânica), sem sedação há 24 horas e reflexo fotomotor ausente. A fisioterapeuta, na aspiração, observou que não havia estímulo, e comunicou a enfermeira e o médico. Diante desse caso, qual é a conduta a ser realizada?

- a) Extubação.
- b) Iniciar sedação.
- c) Comunicar a família e iniciar o protocolo de Morte Encefálica.
- d) Aguardar 12 horas, e observar se o paciente apresenta estímulo.
- e) Iniciar protocolo de Morte Encefálica.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

478. (AOCP/2015/EBSERH)

Paciente internado na UTI com infarto agudo do miocárdio apresenta hipoxemia arterial, mas ainda está consciente e orientado, sendo decidido iniciar cateter nasal para suplementação de oxigênio a 2l/min. A fração inspirada de oxigênio neste caso é estimada em aproximadamente:

- a) 28%.
- b) 24%.
- c) 32%.
- d) 21%.
- e) 50%.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

479. (AOCP/2015/EBSERH)

Homem, 79 anos, internado na UTI, irá realizar enema opaco. Após a radiografia piloto, que posição deve ser adotada para a sondagem retal e administração de contraste?

- a) Litotomia.
- b) Sims.
- c) Ventral.
- d) Supina.
- e) Ortostática.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

480. (AOCP/2015/EBSERH)

Paciente com hidrocefalia foi admitido na UTI após inserção de cateter de drenagem ventricular externa. No cuidado deste paciente, o nivelamento do ponto zero do sistema de drenagem ventricular externa deve ser realizado:

a) na linha hemiaxilar, que é o referencial anatômico para o eixo flebotático.

b) na borda superior da sínfise púbica, que é o referencial anatômico vesical.

c) na ponta do nariz, que é o referencial anatômico para o forâmen magno.

d) no lóbulo inferior da orelha, que é o referencial anatômico para o forâmen de Magendie.

e) no conduto auditivo externo, que é o referencial anatômico para o forâmen de Monro.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

481. (AOCP/2015/EBSERH)

Homem, 42 anos, foi internado na UTI para terapia trombolítica com rtPA devido acidente vascular cerebral isquêmico. O regime de tratamento durante a infusão de rtPA e nas primeiras 24 horas desta terapia inclui:

a) passar sonda nasogástrica e mantê-la aberta para drenagem.

b) passar cateter venoso central e administrar aminas vasoativas para manter pressão arterial sistólica superior a 180mmHg.

c) não passar sonda vesical de demora, mas se for imprescindível, esperar pelo menos 30 minutos do término da infusão de rtPA.

d) administrar heparina para potencializar o efeito da rtPA.

e) puncionar cateter arterial para monitorização contínua e rigorosa da pressão, que deve ser mantida em até 120mmHg com uso de vasodiladores potentes.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

482. (AOCP/2015/EBSERH)

Nos termos da Seção I do Capítulo III da Resolução ANVISA nº 7/2010, a UTI adulto deve dispor de equipamentos e materiais que permitam a monitorização contínua de:

a) saturação arterial de oxigênio, eletrocardiografia, pressão arterial invasiva e capnografia.

b) frequência respiratória, oximetria de pulso, frequência cardíaca, cardioscopia, temperatura e pressão arterial não-invasiva.

c) oftalmoscópio, otoscópio e negatoscópio.

d) pressão de cânula endotraqueal, saturação periférica de oxigênio, frequência cardíaca, pressão arterial não invasiva e temperatura.

e) débito cardíaco, pressão de artéria pulmonar, pressão de artéria pulmonar ocluída, pressão intracraniana e débito urinário.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

483. (AOCP/2015/EBSERH)

Nos termos do Art. 14 da Resolução ANVISA nº 7/2010, uma UTI de 24 leitos deve dispor de, no mínimo, quantos enfermeiros assistenciais por turno?

- a) 1.
- b) 4.
- c) 2.
- d) 5.
- e) 3.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

484. (AOCP/2015/EBSERH)

Sobre a estrutura física da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), nos termos da Resolução ANVISA nº 50/2002, é correto afirmar que:

a) o posto de enfermagem deve estar instalado de forma a permitir observação visual direta ou eletrônica dos leitos.

b) deve existir no mínimo um sanitário para ser compartilhado entre o público e os funcionários.
c) todo leito deve, obrigatoriamente, possuir um sanitário para uso do paciente.

d) é obrigatória a existência de sala de espera para acompanhantes e visitantes anexo à UTI.

e) a sala de espera deve ser exclusiva da UTI, não sendo permitido compartilhamento com outros setores.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

485. (AOCP/2015/EBSERH)

Mulher, 33 anos, está internada na UTI sob ventilação mecânica e em uso de analgo-sedação em infusão contínua. Diante deste caso, quais são as escalas mais apropriadas para monitorar o nível de sedação?

- a) Sedation and Agitation Scale (SAS) e Richmond Agitation and Sedation Scale (RASS).
- b) Richmond Agitation and Sedation Scale (RASS) e Escala de Coma de Glasgow.
- c) Escala de Coma de Glasgow e Escala Cincinatti.
- d) Escala Cincinatti e Sedation and Agitation Scale (SAS).
- e) Richmond Agitation and Sedation Scale (RASS) e Escala Cincinatti.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

486. (AOCP/2015/EBSERH)

Homem, 29 anos, está internado na UTI, sob ventilação mecânica e em uso de dexmedetomidina, apresenta-se alerta e calmo. Na avaliação com a Escala de Richmond de Agitação-Sedação (RASS), sua pontuação equivale a:

- a) +2 pontos.
- b) +1 ponto.
- c) 0 ponto.
- d) -1 ponto.
- e) -2 pontos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

487. (AOCP/2015/EBSERH)

Homem, 81 anos, internado na UTI, encontra-se totalmente dependente da equipe de enfermagem para mobilização no leito. Ao utilizar superfícies de apoio para prevenir úlcera por pressão nos calcâneos, é INCORRETO afirmar que:

- a) utilizar uma almofada ou travesseiro na região dos gêmeos para elevar os calcâneos e mantê-los flutuantes.
- b) manter os calcâneos afastados da superfície da cama.
- c) manter a hiperextensão do joelho.
- d) manter ligeira flexão do joelho.
- e) utilizar dispositivos que permitam distribuição do peso da perna ao longo da sua parte posterior, sem pressão sobre o tendão de Aquiles.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

488. (AOCP/2015/EBSERH)

Homem, 21 anos, sob ventilação mecânica em tubo orotraqueal desde sua admissão na UTI há 7 dias, evoluiu com parada cardiorrespiratória. Na reanimação cardiorrespiratória do referido paciente, deve-se:

- a) realizar 15 compressões torácicas para 2 ventilações.
- b) realizar 15 compressões torácicas para 1 ventilação.
- c) realizar 30 compressões torácicas para 2 ventilações.
- d) realizar compressões torácicas contínuas e 8 a 10 ventilações por minuto.
- e) realizar apenas compressões torácicas contínuas.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

489. (AOCP/2015/EBSERH)

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. A Síndrome do Compartimento Abdominal é caracterizada por uma pressão intra-abdominal sustentada acima de _____ associada com nova disfunção ou falência orgânica.

- a) 20 mmHg.
- b) 20 cmH₂O.
- c) 15 mmHg.
- d) 15 cmH₂O.
- e) 10 mmHg.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

490. (AOCP/2015/EBSERH)

Jovem, 19 anos, politraumatizado, com suspeita de lesão medular por acidente automobilístico, foi intubado pela equipe de resgate pré-hospitalar no local da ocorrência e manejado de forma adequada até o hospital. Após avaliação inicial do clínico geral do Pronto Socorro, foi encaminhado para imagiologia, sendo constada fratura toracolombar. Após o exame de imagem, foi admitido na UTI, onde o plano de cuidados, até avaliação do neurocirurgião, inclui:

- a) retirar o colar cervical.
- b) manter o paciente na prancha rígida.
- c) administrar altas doses de metilprednisolona.
- d) manter repouso no leito e mobilização em bloco.
- e) estimular hiperextensão mentoniana.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

491. (AOCP/2015/EBSERH)

No caso de pacientes em unidade de terapia intensiva, em pós-operatório de abdome agudo, qual modalidade dialítica é menos indicada?

- a) Diálise peritoneal de alto volume.
- b) Hemodiálise intermitente.
- c) Hemodiafiltração estendida diária.
- d) Hemodiálise contínua de baixa eficiência.
- e) Ultrafiltração contínua lenta.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

492. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A abordagem integral da saúde da equipe multidisciplinar de uma UTI deve levar em conta os riscos aos quais os profissionais estão expostos diariamente no ambiente de trabalho. Quais são esses riscos?

- a) Riscos ocupacionais, ambientais, biológicos, ergonômicos, físicos e químicos.
- b) Riscos ambientais, biológicos, físicos, químicos e de radiação ionizante.
- c) Riscos biológicos, físicos, químicos, ambientais e de adquirir glaucoma.
- d) Riscos ergonômicos, ocupacionais, emocionais, biológicos e de adquirir miopia.
- e) Riscos físicos, químicos, ergonômicos, ocupacionais e de adquirir cataratas.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Fundamentos e Procedimentos de Enfermagem

493. (IBFC/2017/EBSERH)

Colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo com a cabeça apoiada no travesseiro. O corpo deve estar ligeiramente inclinado para a frente, com o braço esquerdo sob a cabeça, de modo que parte do peso do corpo se apoie sobre o peito. O braço direito é posicionado de forma confortável. Os membros inferiores devem estar flexionados, o direito, mais acentuadamente que o esquerdo.

Assinale a alternativa que contemple a posição de exame descrita.

- a) Ginecológica
- b) Sims
- c) Genupeitoral
- d) Fowler
- e) Trendelenburg

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

494. (IBFC/2016/EBSERH)

Assinale a alternativa correta. Para venopunção para coleta de exames, as veias preferencialmente utilizadas do membro superior, excluído o dorso da mão, são:

- a) Cefálica acessória e basilica
- b) Basilica mediana e cefálica
- c) Basilica mediana e cefálica acessória
- d) Veia mediana e cefálica
- e) Veia mediana e cefálica acessória

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

495. (IBFC/2016/EBSERH)

A posição _____ é utilizada essencialmente na cirurgia do rim, do quadril, na cirurgia torácica e na neurocirurgia da fossa posterior. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Trendelenburg
- b) Ginecológica
- c) Decúbito lateral
- d) Decúbito dorsal
- e) Decúbito ventral

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

496. (IBFC/2016/EBSERH)

Na coleta de sangue venoso periférico é muito importante a orientação sobre os cuidados básicos com o paciente após a coleta, essa orientação, na maioria das vezes, deve ser dada pelo coletor que normalmente é o técnico de enfermagem. Assinale a alternativa incorreta:

- a) O técnico de enfermagem deve orientar aos pacientes idosos ou em uso de anticoagulantes manterem pressão sobre o local de punção por cerca de 3 minutos ou até parar o sangramento
- b) O técnico de enfermagem deve orientar os pacientes em geral para não carregarem peso imediatamente após a coleta

c) O técnico de enfermagem deve orientar os pacientes em geral a observarem o uso de relógio, pulseira ou mesmo vestimenta que possa estar garroteando o braço punccionado

d) O técnico de enfermagem deve orientar os pacientes em geral para massagearem o local da punção enquanto pressiona o local

e) A compressão do local de punção é de responsabilidade do técnico de enfermagem. Se não puder executá-lo, deverá estar atento à maneira do paciente fazê-lo

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

497. (IBFC/2016/EBSERH)

Os Cateteres Venosos Centrais (CVCs) fazem parte da rotina de trabalho do técnico de enfermagem, esse deve manter sua permeabilidade e realizar o curativo de forma correta para que o cateter se mantenha livre de infecções. Leia as afirmativas a seguir.

I. O técnico de enfermagem poderá utilizar gaze ou curativo estéril transparente semipermeável para cobrir o sítio de inserção dos cateteres de acordo com a rotina estabelecida na unidade.

II. O técnico de enfermagem deverá sempre trocar o curativo na presença de sujidade.

III. Após a limpeza da pele, proceder à desinfecção com os anti-sépticos estabelecidos na rotina da unidade a cada troca de curativo. Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- c) Apenas a afirmativa I está correta
- d) Apenas a afirmativa III está correta
- e) Apenas a afirmativa II está correta

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

498. (IBFC/2016/EBSERH)

O processo de remoção de microrganismos patogênicos de objetos, tornando-os seguros para o manuseio é denominado:

- a) Desinfecção de baixo nível
- b) Esterilização
- c) Limpeza
- d) Desinfecção de alto nível
- e) Descontaminação

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

499. (IBFC/2016/EBSERH)

Para realizar clister ou lavagem intestinal, o paciente deve ser colocado em posição:

- a) Ginecológica
- b) Sims
- c) Genupeitoral
- d) Litotomia
- e) Trendelenburg

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

500. (IBFC/2016/EBSERH)

Um paciente realizou cirurgia cardíaca e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva, com monitorização cardíaca, ventilação mecânica, acesso venoso central, cateter vesical de demora e alimentação por sonda nasoenteral. O técnico de enfermagem, que estava escalado com paciente, realizou os cuidados de enfermagem, conforme a prescrição de enfermagem. Entretanto, como o paciente perdeu o acesso venoso central, o técnico de enfermagem não administrou a medicação e chegou como se tivesse realizado o procedimento. O paciente apresentou complicações pela falta da medicação não administrada, sendo constatado o fato pelo médico. Considerando os conceitos éticos, o técnico de enfermagem cometeu:

- a) Imperícia
- b) Negligência
- c) Imprudência
- d) Homicídio
- e) Indulto

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

501. (IBFC/2016/EBSERH)

O paciente RDF, sexo masculino, 56 anos, foi encaminhado para realização de exame cardíaco no Setor de Hemodinâmica. O médico estava realizando o exame e solicitou para o técnico de enfermagem administrar contraste no paciente. O técnico de enfermagem preparou e administrou o medicamento por via endovenosa no paciente. Imediatamente, após a administração do medicamento, o paciente apresentou reação alérgica e, conseqüentemente, parada cardiorrespiratória. O paciente foi reanimado, entretanto, acabou evoluindo a óbito. Posteriormente, foi constatado que o técnico de enfermagem administrou o medicamento errado ao paciente. Nesse caso, considerando os conceitos de segurança do paciente, ocorreu:

- a) Imperícia
- b) Incidente sem dano
- c) Circunstância Noticiável
- d) Evento Adverso
- e) Near Miss

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

502. (IBFC/2016/EBSERH)

A sondagem gastrointestinal (GI) é a inserção de uma sonda no estômago, duodeno ou intestino. Sobre as funções da sondagem GI, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Somente a remoção de líquido na cavidade GI.
- II. Lavar o estômago e remover as substâncias tóxicas ingeridas.
- III. Diagnosticar a motilidade GI e outras disfunções.
- IV. Administrar medicamentos e alimentos.

- a) II, III e IV, apenas
- b) I, II, III e IV
- c) I, II e IV, apenas
- d) IV apenas
- e) II e IV, apenas

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

503. (IBFC/2016/EBSERH)

A sondagem vesical consiste na introdução de um cateter estéril através da uretra até a bexiga, com o objetivo de drenar a urina. Sobre as finalidades da sondagem vesical, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Esvaziar a bexiga dos pacientes com políúria.
- () Controlar volume urinário.

() Preparar para as cirurgias, principalmente as abdominais.

() Promover drenagem urinária dos pacientes com incontinência urinária.

- a) F,V,V,V
- b) V,V,V,V
- c) F,V,F,V
- d) V,F,V,F
- e) V,V,F,F

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

504. (IBFC/2016/EBSERH)

Assinale a alternativa que apresenta a posição em que o paciente é colocado em decúbito dorsal, com as coxas flexionadas sobre o abdome, afastadas uma da outra com as pernas sobre as coxas, utilizada para cirurgias ou exames de perineo, vagina e bexiga:

- a) Trendelenburg
- b) Fowler
- c) Genupeitoral
- d) Litotomia
- e) Sims

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

505. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando os cuidados com as condições gerais do cliente para o transporte intra-hospitalar, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

I. Observar os parâmetros de monitorização cardíaca e de oximetria.

II. O posicionamento do paciente na maca deve ser preferencialmente a posição de Sims para evitar aspiração de secreções.

III. Observar nível de consciência.

IV. Verificar perfusão periférica.

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- c) As afirmativas I, III e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

506. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

O enfermeiro da clínica médica avalia o nível de consciência de um paciente como letárgico, pois esse paciente:

a) se apresenta completamente inconsciente, não respondendo à dor ou a qualquer estímulo interno ou externo.

b) parece não manter atividade reflexa e está gemente.

c) está inconsciente, respondendo apenas à agitação vigorosa ou à dor.

d) parece sonolento, respondendo adequadamente às perguntas ou comandos, mas o pensamento parece lento e confuso, desatento.

e) está desperto, orientado, completamente consciente de estímulos externos e internos e responde de forma adequada.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

507. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Para a OMS, segurança do paciente corresponde à redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Assim, são contribuições da segurança do paciente para a qualidade do cuidado de saúde, EXCETO:

a) chamar atenção para o impacto do erro e as consequências do dano.

b) mostrar com clareza como o cuidado de saúde pode ser danoso para os pacientes. [

c) minimizar a atenção nas questões colocadas pela ergonomia e pela psicologia.

d) abordar diretamente a questão do erro no cuidado de saúde, sua natureza e suas causas.

e) ampliar a atenção sobre o desempenho humano.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

508. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando os decúbitos e posições do paciente, a figura abaixo indica:

a) Posição de Trendelenburg.

b) Posição de Fowler.

c) Posição Supina.

d) Posição de Prona.

e) Posição de Sims.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

509. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Quando o cliente está impossibilitado de urinar espontaneamente, sendo necessária a drenagem artificial através de cateteres, utiliza-se o:

a) dreno de tórax.

b) acesso venoso central.

c) cateterismo vesical.

d) cateterismo cardíaco.

e) dreno de penrose.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

510. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Adolescente de 16 anos, sexo feminino, após discussão com familiares ingeriu 20 comprimidos de paracetamol, tendo dado entrada no pronto-atendimento, aproximadamente, 1 hora após o ocorrido, apresentando-se totalmente assintomática. É indicada pelo Centro de Intoxicações do serviço a passagem de sonda nasogástrica para lavagem gástrica. Sobre esse procedimento, assinale a alternativa correta.

a) O paciente deve estar posicionado em trendelenburg com coxim em região cervical.

b) Medir a distância de introdução da sonda, colocando a extremidade dela do lóbulo da orelha ao ápice da pirâmide nasal e, daí para baixo, até o apêndice xifoide, mais 10 cm.

c) Para passar a sonda do esfíncter cricofaríngeo para o esôfago, solicitar ao paciente para que tussa, o que facilita a progressão da sonda.

d) A sonda nasogástrica deve sempre ser introduzida fechada para evitar a saída precoce de conteúdo gástrico.

e) Quando de sua retirada, a sonda nasogástrica deve estar sempre fechada, o que evita o escoamento do conteúdo gástrico - pelos orifícios da sonda - no trato digestivo alto.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

511. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A realização de medidas antropométricas da população-alvo de determinado projeto é uma forma de prevenir estresse desnecessário e até acidentes graves. Sobre antropometria e ergonomia, assinale a alternativa correta.

a) Normalmente as medidas antropométricas são representadas por uma matriz identidade.

b) Desde a década de 50, os automóveis são dimensionados para motoristas do sexo masculino.

c) As saídas de emergência devem ser projetadas por meio de projetos para indivíduos extremos para acomodar pelo menos 95% dos casos.

d) Desenvolver produtos para 100% de uma população apresenta ganhos imensuráveis, sendo, portanto, o objetivo principal da indústria.

e) Por meio da antropometria surge o conceito de que o fundamental não é adaptar o trabalho ao homem, mas procurar adaptar o homem às suas condições de trabalho.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

512. (INSTITUTO AACP/2015/EBSERH)
Define-se flect enema a introdução de solução no intestino grosso para facilitar a passagem das fezes. Assinale a alternativa que indica corretamente sua utilização.

- a) Prevenir escape involuntário de material fecal durante os procedimentos cirúrgicos e promover a visualização do trato intestinal por exame radiográfico.
- b) Em caso de intoxicação por ingestão de substâncias tóxicas.
- c) Para prevenir infecção do trato gastrointestinal.
- d) Como procedimento realizado privativamente pelo enfermeiro.
- e) Como prevenção de retocolite ulcerativa.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

513. (INSTITUTO AACP/2015/EBSERH)
Mulher, 23 anos, com dificuldade e desconforto (dor) para urinar; qual terminologia de Enfermagem deve ser usada para descrever este sintoma?

- a) Enurese.
- b) Hematúria.
- c) Disúria.
- d) Oligúria.
- e) Omalgia.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

514. (INSTITUTO AACP/2015/EBSERH)
Em caso de solicitação de cateterismo vesical de demora, quais são os materiais corretos para o procedimento completo?

- a) Luva de procedimento (não-estéril), degermante tópico e gases.
- b) Luva esteril, degermante tópico, gases esteréis, água destilada, seringa esteril grande, campo esteril, cuba-rim, pinça Kocher, lubrificante esteril (Lidocaína gel), sonda de Foley e coletor de urina em sistema fechado.

c) Luva esteril, degermante tópico, gases esteréis, água destilada, seringa esteril pequena, campo esteril, lubrificante esteril (Lidocaína gel) e sonda uretral de alívio.

d) Luva de procedimento, gases esteréis, água destilada, seringa esteril, campo esteril, lubrificante esteril (Lidocaína gel), sonda de Foley e coletor de urina em sistema aberto.

e) Luva esteril, água e sabão, água destilada, seringa esteril, campo esteril, lubrificante esteril (Lidocaína gel), sonda uretral de alívio e coletor de urina em sistema fechado.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

515. (INSTITUTO AACP/2015/EBSERH)
Quando um Índice de Massa Corporal (IMC) de um adulto caracteriza obesidade?

- a) IMC de 25 a 29,9 kg/m².
- b) IMC de 30 a 40 kg/m².
- c) IMC de 19 a 19,9 kg/m².
- d) IMC de 09 a 19,9 kg/m².
- e) IMC de 01 a 09,9 kg/m².

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

516. (INSTITUTO AACP/2015/EBSERH)
Mulher internada na UTI em VM será submetida à punção lombar. Para facilitar a entrada da agulha nos espaços intervertebrais e a penetração no espaço subaracnoide, o paciente deverá ser colocado na posição:

- a) supina com hiperextensão.
- b) trendelenburg invertida.
- c) decúbito lateral (posição fetal).
- d) supina com elevação.
- e) decúbito dorsal.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

517. (INSTITUTO AACP/2015/EBSERH)
Homem, 40 anos, admitido na UTI, entubado, que sofreu politrauma com fratura de face, fratura de bacia e fratura de fêmur, apresentou vômito. O procedimento a ser realizado é a passagem de sonda para drenagem. Diante deste caso, qual é o tipo de sonda a ser utilizada?

- a) SNE.
- b) SNG.
- c) SOG.
- d) Sonda do BOFF.
- e) Sonda Levine.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

518. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O profissional de enfermagem, junto com os demais membros da equipe multidisciplinar, pode utilizar métodos não farmacológicos para o alívio da dor, como

- a) aplicação de calor local, sedação, ioga, bloqueios.
- b) aplicação de calor local, aplicação de frio, exercícios físicos, massagem e posicionamento adequado paciente.
- c) aconselhamento psicológico, fisioterapêutico, atividades físicas e analgesia.
- d) aplicação de tratamentos alternativos homeopáticos.
- e) direcionamento religioso, tratamento alternativo e atividades físicas.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

519. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A Infecção do Trato Urinário (ITU) é uma das causas prevalentes de infecções relacionadas à assistência à saúde – IRAS de grande potencial preventivo, visto que a maioria está relacionada à cateterização vesical. Em relação às ITU, é correto afirmar que:

- a) as bactérias gram positivas são as mais frequentemente identificadas nas ITU.
- b) a assistência para pacientes com úlcera por pressão não é um indicativo para inserção de cateter vesical.
- c) o sistema de drenagem poderá ser desconectado para a coleta de urina para cultura.
- d) a utilização de cateter impregnado com prata ou outro antimicrobiano constitui medida preventiva eficaz para as ITU.
- e) limpar rotineiramente o meato uretral com soluções antissépticas é desnecessário, mas a higiene rotineira do meato é indicada.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

520. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O profissional de enfermagem é a pessoa mais indicada para cuidar do corpo, após a morte, com dignidade e sensibilidade. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- a) O cuidado deve ser o mais rápido possível. O profissional de enfermagem prepara o quarto e o corpo, retirando os equipamentos e lençóis.
- b) O profissional de enfermagem comunica a família que serão retirados os órgãos para doação.
- c) O profissional de enfermagem não permite que a família entre na UTI para não ter má impressão do falecido.
- d) O profissional de enfermagem leva o corpo para o necrotério, sem retirar os adornos, deixando a família fazer isso.
- e) O profissional de enfermagem deve esperar os responsáveis pelo funeral para levar o corpo até o necrotério.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

521. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Paciente sob riscos de complicações devido à imobilidade requerem um plano de enfermagem. Esse plano inclui:

- a) passar sonda vesical, elevar cabeceira a 30° e sentar pacientes em cadeiras.
- b) manter vias aéreas e efetuar mudanças de decúbito de 3/3 h.
- c) manter ambiente tranquilo, sentar o pacientes e aspirar secreções de vias aéreas.
- d) manter o paciente em isolamento e efetuar mudança de decúbito de 2/2 h.
- e) recuperar o alinhamento corporal adequado, reduzir traumatismo na pele e manter vias aéreas.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

522. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A assistência de enfermagem é de fundamental importância em um laboratório de hemodialis. As ações prestadas contribuem para o adequado andamento do serviço, além disso, o profissional de enfermagem busca tranquilizar e esclarecer dúvidas frequentes da família do paciente.

- a) Essas ações iniciam-se desde o dia da marcação do procedimento diagnóstico e terapêutico até após a alta do paciente.
- b) As ações de enfermagem iniciam-se quando o paciente está deitado na mesa para o procedimento.
- c) A melhor ação de enfermagem é quando o paciente recebe alta.
- d) A melhor ação é orientar o paciente para pesquisar sobre seu quadro clínico na internet.
- e) A ação da enfermagem deve ser orientar a família para o paciente não ficar ansioso antes do procedimento.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

523. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A diarreia consiste na alteração da função intestinal com perda excessiva de água e eletrólitos pelas fezes/vômitos. O Plano B é indicado ao tratamento da diarreia com desidratação. Nesse plano, o usuário deve:

- a) ser atendido e dispensado com orientações de cuidados domiciliares, levando sais hidratantes para casa.
- b) ser atendido e dispensado com orientações para ingestão de qualquer tipo de líquido.
- c) ser mantido em observação com TRO.
- d) iniciar reidratação endovenosa.
- e) ser hospitalizado.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

524. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Paciente, 43 anos, deu entrada no Hospital com queixa de rebaixamento de nível de consciência, febre e retenção urinária. Em seu atendimento, foram verificados sinais vitais e glicemia capilar, foi punccionado com abocath 18 em jugular direita e foram coletados exames laboratoriais. Inseriu-se sonda vesical de demora e administrada medicação. Dos procedimentos realizados, assinale a alternativa que apresenta procedimentos de competência privativa do enfermeiro no âmbito da equipe de enfermagem.

- a) Punção de jugular, Inserção de sonda vesical de demora e medicação endovenosa.
- b) Glicemia capilar, aferição de pressão arterial e coleta arterial de exames laboratoriais.
- c) Coleta arterial de exames laboratoriais, punção de jugular e inserção de sonda vesical de demora.
- d) Inserção de sonda vesical de demora, punção de jugular e coleta venosa de exames laboratoriais.
- e) Coleta arterial de exames laboratoriais, Inserção de cateter venoso central e glicemia capilar.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

525. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

No exercício diário da enfermagem, para prevenir interações medicamentosas, algumas medidas de ordem prática com a finalidade de contribuir na prevenção de reações adversas decorrentes de interações podem ser tomadas. Faz parte dessas medidas:

- a) associar grupos de “medicamentos-alvo” e “precipitadores” nos mesmos horários de administração.
- b) usar a mesma via de infusão na vigência de associação de medicamentos de compatibilidade desconhecida ou duvidosa.
- c) administrar no mesmo horário medicamentos que possuem os mesmos efeitos tóxicos (Ex: Aminoglicosídeos e Anfotericina B).
- d) não lavar os dispositivos de infusão com soluções neutras, se houver necessidade de administração de vários medicamentos na mesma via de acesso vascular.

e) observar alterações visíveis quando da reconstituição e diluição de medicamentos (turbidez, precipitação, mudança de coloração).

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

526. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Um ambiente cirúrgico adequado ao conforto dos pacientes e das equipes requer o controle das condições de temperatura e umidade. A umidade recomendada para o ar da sala de operações é de:

- a) 55 a 60%.
- b) 10 a 35%.
- c) 70 a 80%.
- d) 20 a 40%.
- e) 90 a 100%.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

527. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Qual é o conceito de hipotermia profunda?

- a) Temperatura corpórea entre 28 e 32°C.
- b) Temperatura corpórea entre 35 e 36°C.
- c) Temperatura corpórea entre 28 e 35°C.
- d) Temperatura corpórea entre 21 e 27°C.
- e) Temperatura corpórea igual ou menor que 20°C.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

528. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A temperatura que mais, aproximadamente, reflete a temperatura cerebral durante a hipotermia é a:

- a) retal.
- b) visceral.
- c) axilar
- d) timpânica.
- e) esofágica.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

529. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

No que se refere à punção de veia jugular é correto afirmar que:

- a) compete ao enfermeiro a realização deste procedimento, desde que o profissional seja dotado de habilidade, competência técnica e científica para tal procedimento.

b) é um procedimento de rotina permitido a toda equipe de enfermagem, sendo esta a veia de primeira escolha para punção devido ao seu grosso calibre.

c) trata-se de um procedimento exclusivamente médico, sendo proibido a qualquer membro da equipe de enfermagem, sob risco de exercício ilegal da medicina.

d) compete ao enfermeiro e ao técnico de enfermagem devidamente treinado para tal procedimento uma vez que não há quaisquer riscos ao paciente neste procedimento,

e) A veia jugular não pode ser puncionada, independente das condições em que se encontre o paciente, cabendo processo ético a todo aquele que realizar tal procedimento.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

530. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Sobre a Educação em Saúde, assinale a alternativa correta.

a) O papel do profissional de saúde é ser mero transmissor de informações.

b) Paulo Freire exerceu forte influência no movimento da educação popular em saúde no Brasil.

c) Didaticamente, o plano de educação em saúde deve ser realizado somente com intervenção individual.

d) O cliente deve ser receptor passivo de informações e abster-se de relatar suas experiências.

e) A finalidade da educação em saúde é atender aos objetivos meramente técnicos de campanhas sanitárias.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

531. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

No que diz respeito à heparinização dos cateteres de longa permanência, é correto afirmar que:

a) o cateter totalmente implantado deve ser heparinizado a cada 7 dias e o parcialmente implantado a cada 30 dias.

b) tanto o cateter totalmente implantado como o parcialmente implantado devem ser heparinizados a cada infusão de droga.

c) quando não em uso, o cateter totalmente implantado deve ser heparinizado a cada 30 dias e o parcialmente implantado a cada 7 dias.

d) cateteres de longa permanência não necessitam de heparinização.

e) ambos devem ser heparinizados diariamente.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Auditoria e Gestão de Qualidade em Enfermagem

532. (2016/ CESPE/ TRT)

No que diz respeito à auditoria nos serviços de saúde, assinale a opção correta.

a) As auditorias retrospectivas são as que ocorrem quando há ordem judicial para investigações de casos de pacientes que foram a óbito.

b) Nas instituições de saúde, a auditoria pode ocorrer de forma retrospectiva, simultânea ou prospectiva.

c) A definição de padrões preexistentes está sendo cada vez menos utilizada para a verificação do desempenho da qualidade dos serviços.

d) A auditoria é um exame não oficial e assistemático de registro, processo, estrutura, ambiente ou relatório para avaliação de desempenho.

e) As auditorias de resultados são utilizadas para reduzir custos assistenciais e selecionar os pacientes que têm cobertura assistencial para o atendimento.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

533. (IBFC/2017/EBSERH)

Em relação à auditoria em enfermagem, leia as frases abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. É a avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem prestada ao cliente pela análise dos prontuários e verificação da compatibilidade entre o procedimento realizado e os itens que compõem a conta hospitalar cobrada.

II. Pode ser entendida como uma avaliação sistemática da assistência de enfermagem, verificada por meio das anotações de enfermagem no prontuário dos pacientes e/ou das próprias condições destes.

III. O objetivo da auditoria de enfermagem é, essencialmente, a fiscalização da assistência que o profissional de enfermagem se propõe a oferecer à comunidade, ou que tem por obrigação social oferecer.

IV. A auditoria de enfermagem é realizada em hospitais, clínicas e operadoras de planos de saúde, exceto em ambulatórios e home care.

- a) Apenas as frases I e II estão corretas
b) Apenas as frases III e IV estão corretas
c) As frases I, II, III e IV estão corretas
d) Apenas as frases I e III estão corretas
e) Apenas as frases II e IV estão corretas

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

534. (IBFC/2017/EBSERH)

Considerando as finalidades da auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS), leia as frases abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. Aferir a observância dos padrões estabelecidos de qualidade, quantidade, custos e gastos da atenção à saúde.

II. Avaliar os elementos componentes dos processos da instituição, serviço ou sistema auditado, objetivando a melhoria dos procedimentos, por meio da detecção de desvios dos padrões estabelecidos.

III. Avaliar a qualidade, a propriedade e a efetividade dos serviços de saúde prestados à população.

IV. Produzir informações para subsidiar o planejamento das ações que contribuam para o aperfeiçoamento do SUS.

- a) Apenas a frase I está correta
- b) Apenas as frases II e IV estão corretas
- c) As frases I, II, III e IV estão corretas
- d) Apenas a frase III está correta
- e) Apenas as frases II, III e IV estão corretas

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

535. (IBFC/2017/EBSERH)

Considerando a regulamentação da auditoria de enfermagem, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I. A auditoria na área de enfermagem é prevista na Lei no . 7.498/1986, que dispõe sobre regulamentação do exercício da enfermagem.

II. A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) no 260/2001 fixa a Auditoria como uma Especialidade de Enfermagem, de competência do Enfermeiro.

III. De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) no 266/2001, o Enfermeiro auditor tem direito de acesso ao prontuário do paciente, devendo registrar seu nome completo e número do registro junto ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN), e interferir, quando necessário, nos registros de enfermagem e da equipe multiprofissional.

IV. De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) no 266/2001, o Enfermeiro Auditor, no cumprimento de sua função, tem o direito de visitar e entrevistar o paciente com objetivo de constatar a satisfação do mesmo com serviço prestado bem como a qualidade. Se necessário, também pode acompanhar procedimentos realizados.

- a) Apenas a afirmativa IV está correta
- b) As afirmativas I, II e IV estão corretas
- c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- d) As afirmativas III e IV estão corretas
- e) Apenas as afirmativas I e II estão corretas

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

536. (IBFC/2017/EBSERH)

_____ é o serviço de auditoria realizado por profissional enfermeiro contratado pela operadora de planos de saúde. É responsável pela auditoria realizada dentro das instalações dos prestadores de serviço, pela análise de contas hospitalares, após a alta do paciente. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Auditoria de Enfermagem Interna “in loco”
- b) Auditoria de Enfermagem Interna na Operadora de Planos de Saúde
- c) Auditoria de Enfermagem Externa na Operadora de Planos de Saúde

d) Auditoria de Enfermagem Interna no faturamento

e) Auditoria de Enfermagem Externa em educação continuada

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

537. (IBFC/2017/EBSERH)

Assinale a alternativa correta. A evolução da auditoria no Brasil está relacionada, primordialmente, com a instalação das empresas de origem estrangeiras de auditorias independentes, por conta de seus investimentos. No setor público da saúde, antes de 1976, as atividades eram realizadas:

a) Pelos supervisores do Instituto Nacional de Previdência Social por meio de apurações em prontuários de pacientes e em contas hospitalares, não havendo auditorias diretas em hospitais

b) Pelos auditores do Sistema Nacional de Auditoria por meio de fiscalização dos prestadores de serviços de saúde existentes no país

c) Pelos auditores do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) por meio de fiscalização e controle das contas hospitalares

d) Pelos consultores da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por meio de criação de normas, o controle e a fiscalização de segmentos de mercado explorados por empresas para assegurar o interesse público

e) Pelos servidores das Instituto de Aposentadorias e Pensões (IAPs) por meio de criação de normas e controles das empresas de saúde, não havendo auditorias diretas em serviços ambulatoriais, apenas em hospitais

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

538. (IBFC/2017/EBSERH)

O Sistema Nacional de Auditoria (SNA) do Sistema Único de Saúde (SUS) utiliza sistemas e redes como ferramentas para obtenção de dados, análise e suporte à realização de auditorias analíticas e auditorias operacionais (in loco). Dos sistemas e redes de informações disponíveis, o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS):

a) Apresenta informações sobre os Programas: Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família, quanto ao número de nascidos vivos, número de crianças menores de 2 anos, pesadas e vacinadas, as gestantes cadastradas, número de hipertensos, diabéticos, hansenianos e tuberculosos, o número de visitas domiciliares e o número de consultas realizadas por médicos e enfermeiros

b) Integrada à internet, promove acesso e intercâmbio de informações em saúde para gestão, planejamento e pesquisa aos gestores, agentes e usuários do SUS

c) Apresenta o número de ambulatorios e hospitais existentes, sua produtividade, o tempo médio de fila de espera e de permanência do paciente no hospital, quando são públicos ou credenciados pelo SUS

d) Informa a capacidade instalada de municípios, isto é, o número de postos de saúde, policlínicas, maternidades, prontos-socorros, consultórios médicos e odontológicos, dentre outros

e) Disponibiliza dados básicos, indicadores e análises de situação sobre as condições de saúde e suas tendências no País, para melhorar a capacidade operacional de formulação, coordenação e gestão de políticas e ações públicas dirigidas à qualidade de saúde e de vida da população

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

539. (IBFC/2017/EBSERH)

De acordo com o Sistema Nacional de Auditoria (SNA) do Sistema Único de Saúde (SUS) para escolha do percentual que será auditado (amostragem), considerar a representatividade e o quantitativo de Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) apresentado. A Unidade com mais de 500 AIH, o percentual a ser auditado será de:

- a) 50%
- b) 20%
- c) 10%
- d) 75%
- e) 100%

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

540. (IBFC/2017/EBSERH)

O Enfermeiro Auditor deve ter conhecimento sobre os conceitos de custos hospitalares. Considerando os conceitos de custos, correlacione as colunas abaixo, enumerando-as, de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.

- (1) custos diretos
- (2) custos indiretos
- (3) custos variáveis
- (4) custos fixos

() Itens de custos que permanecem constantes, mesmo que ocorram alterações de volume de serviços, dentro de uma determinada capacidade de produção.

() Custos identificados com os centros de custos. Exemplos: pessoal, consumo de medicamentos e materiais.

() Calculados por meio de rateio. Exemplos: aluguel, energia e água.

() Custos que variam à mesma proporção do volume de atendimento do hospital.

- a) 4,3,2,1
- b) 1,2,4,3
- c) 3,2,1,4
- d) 4,2,1,3
- e) 4,1,2,3

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

541. (IBFC/2017/EBSERH)

Considerando que o Sistema Nacional de Auditoria (SNA) foi instituído no âmbito do Ministério da Saúde, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. Ao SNA compete exclusivamente a avaliação contábil e financeira do Sistema Único de Saúde, que é realizada de forma descentralizada.

II. O Sistema Nacional de Auditoria ocorre por meio da centralização das ações realizadas pelo Ministério da Saúde.

III. Os órgãos do SNA exercem atividades de controle, avaliação e auditoria nas entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, com as quais a respectiva direção do SUS tiver celebrado contrato ou convênio para realização de serviços de assistência à saúde.

IV. O Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria (DCAA) é o órgão de atuação do SNA, no plano federal.

- a) As afirmativas I, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- d) Apenas a afirmativa I está correta
- e) Apenas a afirmativa IV está correta

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

542. (IBFC/2017/EBSERH)
Durante a auditoria, são utilizadas algumas técnicas de coleta de informações indicadas conforme a finalidade. Caso a finalidade da coleta seja caracterizar a dinâmica de uma atividade; sendo um exemplo de questão: “Os enfermeiros realizam os procedimentos adequadamente?”; a técnica de coleta mais adequada seria:

- a) Extração de dados de sistema
- b) Confirmação externa
- c) Entrevista
- d) Grupo focal
- e) Observação direta

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

543. (IBFC/2017/EBSERH)
Um tipo de técnica adotada no processo de auditoria é _____, que consiste na aplicação de questionários para obter informações de forma padronizada sobre um grande número de unidades de pesquisa, sejam indivíduos ou organizações. Presta-se a descrever aspectos do tema pesquisado de forma quantitativa, usando estatística, como, por exemplo, obter o percentual de usuários que aprovam o serviço prestado e as reclamações mais frequentes. Preencha a lacuna e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) Requisição de informações
- b) Triangulação
- c) Sondagem
- d) Entrevista
- e) Grupo focal

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

544. (IBFC/2017/EBSERH)
A análise de informações em auditoria é um dos pilares da qualidade de uma auditoria, pois responde pela qualificação das evidências que sustentarão as constatações. Usa-se _____ para obter uma compreensão mais profunda de percepções, razões e motivações acerca de um problema e seu contexto. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Análise Quantitativa
- b) Análise Qualitativa
- c) Análise Descritiva
- d) Observação Direta
- e) Avaliação Comportamental

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

545. (IBFC/2017/EBSERH)
No Brasil, na década de 1990, instituições de saúde e governos começaram a se preocupar fortemente com a avaliação dos serviços oferecidos à população. Foi nesse período que surgiram as primeiras iniciativas regionais de acreditação. Sobre o processo de Acreditação, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. A Organização Nacional de Acreditação (ONA) coordena o Sistema Brasileiro de Acreditação (SBA), que reúne organizações e serviços de saúde, entidades e instituições acreditadoras em prol da segurança do paciente e da melhoria do atendimento.

II. Considera o processo de acreditação como um sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de saúde.

III. Tem um caráter eminentemente fiscalizador, voltado para a melhoria contínua, com finalidade de controle oficial/governamental.

IV. O processo acreditação é pautado por três princípios fundamentais: voluntário, periódico e reservado.

- a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- b) As afirmativas I, II e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, II e IV estão corretas
- e) Apenas a afirmativa III está correta

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

546. (IBFC/2017/EBSERH)

Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. A auditoria de enfermagem está em crescente expansão e a atuação do enfermeiro auditor tem grande importância quando a finalidade é:

- () Otimizar os custos.
- () Evitar desperdícios.
- () Garantir que todos os procedimentos sejam realizados de forma adequada.
- () Maior qualidade da assistência prestada e satisfação do paciente/cliente.
- () Fiscalização com punição de servidores.

- a) V,V,V,V,F
- b) V,V,V,V,V
- c) F,F,V,V,V
- d) F,F,F,V,V
- e) V,F,V,V,F

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

547. (IBFC/2017/EBSERH)

Baseando-se na auditoria de enfermagem (AE), leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I. A AE tem como objetivos identificar áreas de deficiência do serviço, fornecer dados para melhoria dos programas e da qualidade do cuidado no serviço de enfermagem, e também obter dados para programação de atualização do pessoal de enfermagem.

II. Os registros de enfermagem contribuem para as melhores práticas assistenciais, entretanto, não constituem fontes fidedignas para a AE.

III. O enfermeiro auditor tem como função fiscalizar as unidades de assistência à saúde, bem como o próprio paciente/cliente, tendo como único objetivo de avaliar a compatibilidade do procedimento realizado e o que está sendo cobrado, garantindo um menor custo da assistência.

IV. São alguns instrumentos de trabalho utilizados na AE como: Tabela de preços de diárias e taxas hospitalares acordadas entre convênio e prestador de serviços; Prontuário Médico; Prontuário contábil; Tabela da Associação Médica Brasileira (AMB); Protocolos; entre outros.

- a) As frases I, II, III e IV estão corretas
- b) Apenas a frase I está correta
- c) Apenas as frases I e IV estão corretas
- d) Apenas as frases II e III estão corretas
- e) Apenas as frases III e IV estão corretas

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

548. (IBFC/2017/EBSERH)

Analise as frases abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. São princípios éticos e profissionais do auditor:

- () Objetividade.
- () Parcialidade.
- () Ceticismo e julgamento profissional.
- () Uso de informações de terceiros.

- a) V,V,V,V
- b) V,F,F,F
- c) V,F,F,V
- d) F,F,F,F
- e) V,F,V,V

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

549. (IBFC/2017/EBSERH)

Assinale a alternativa correta. Os aspectos tipicamente focalizados numa auditoria de desempenho, que tem o objetivo de avaliar o desempenho da gestão de um órgão, processo ou serviço, são:

- a) Eficácia, qualidade, equidade e efetividade
- b) Legalidade, legitimidade, desvios de recursos e fraudes
- c) Desvios de recursos, fraudes, eficiência e desperdício
- d) Economicidade, qualidade, efetividade e desvios de recursos
- e) Eficácia, efetividade, fraude e desvios de recursos

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

550. (IBFC/2017/EBSERH)

O Relatório de Saída Efetivo do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) é um grupo constituído por documentos de consulta obrigatória, que retrata o perfil da atividade, serviço ou unidade auditada, sendo um exemplo o:

- a) Relatório de Créditos Bancários Efetuados (relatório extraído pelo gestor municipal ou estadual após cada processamento)
- b) Relatório Frequência de Procedimentos – TAB (pode ser extraído utilizando o programa TABWIN ou Planilha Eletrônica)
- c) Relatório da Situação da Produção Ambulatorial (relatório extraído pelo gestor municipal ou estadual após cada processamento)

d) Relatório Síntese de Produção da Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade/ Custo - Apac (relatório extraído pelo gestor municipal ou estadual após cada processamento)

e) Relatório de Acompanhamento da Programação Físico-Orçamentária (pode ser extraído utilizando o programa CADSIÁ)

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

551. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Quando integrante da Equipe de Auditoria em Saúde, o Enfermeiro Auditor:

a) pode atuar na elaboração de contratos e adendos que dizem respeito à assistência médica.

b) pode atuar em todas as atividades de competência do enfermeiro e enfermeiro auditor, em conformidade com o previsto nas Leis do Exercício da Enfermagem e Legislação pertinente.

c) deverá identificar-se, fazendo constar o número de registro no COREN, assim podendo interferir nos registros do prontuário do paciente.

d) para executar suas funções de Auditoria, terá acesso ao prontuário do paciente apenas com a prévia autorização por parte de outro membro auditor, enfermeiro ou multiprofissional.

e) no cumprimento de sua função, não tem o direito de visitar/entrevistar o paciente, pois assim estará infringindo seu código de ética profissional.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

552. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Considerando o Prisma Ético, em relação à profissão do Enfermeiro Auditor, assinale a alternativa INCORRETA.

a) O Enfermeiro Auditor, no exercício de sua função, deve fazê-la com clareza, lisura, sempre fundamentado em princípios Constitucional, Legal, Técnico e Ético.

b) O Enfermeiro Auditor, como educador, deverá participar da interação interdisciplinar e multiprofissional, contribuindo para o bom entendimento e desenvolvimento da Auditoria de Enfermagem.

c) O Enfermeiro Auditor, quando integrante de equipe multiprofissional, deve delegar ou repassar o que é privativo do Enfermeiro Auditor a outro membro da equipe multiprofissional.

d) O Enfermeiro Auditor, quando em sua função, deve sempre respeitar os princípios Profissionais, Legais e Éticos no cumprimento do seu dever

e) A Competência do Enfermeiro Auditor abrange todos os níveis em que há a presença da atuação de Profissionais de Enfermagem.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

553. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O Sistema Nacional de Auditoria (SNA) exerce, sobre as ações e serviços desenvolvidos no âmbito do SUS, as atividades de, EXCETO:

a) controle, avaliação e auditoria nas entidades privadas, com fins lucrativos, com as quais a respectiva direção do SUS não tiver celebrado contrato ou convênio para realização de serviços.

b) controle da execução, para verificar a sua conformidade com os padrões estabelecidos ou detectar situações que exijam maior aprofundamento.

c) avaliação da estrutura, dos processos aplicados e dos resultados alcançados.

d) aferição da adequação aos critérios e parâmetros exigidos de eficiência, eficácia e efetividade.

e) auditoria da regularidade dos procedimentos praticados por pessoas naturais e jurídicas, mediante exame analítico e pericial.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

554. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Observada a Constituição Federal, as Constituições dos Estados-Membros e as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, compete ao Sistema Nacional de Auditoria (SNA) verificar, por intermédio dos órgãos que o integram no plano municipal:

a) as ações e serviços previstos no plano estadual de saúde.

b) a aplicação dos recursos estaduais repassados aos Municípios, em conformidade com a legislação específica de cada unidade federada.

c) as ações e serviços de saúde de abrangência nacional em conformidade com a política nacional de saúde.

d) as ações e serviços desenvolvidos por consórcio intermunicipal ao qual esteja o Município associado.

e) a aplicação dos recursos transferidos aos Estados e Municípios mediante análise dos relatórios de gestão.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHOM DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

555. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A Regulação da Atenção à Saúde tem como objeto a produção das ações diretas e finais de Atenção à Saúde, estando, portanto, dirigida aos prestadores de serviços de saúde públicos e privados. Podemos listar como típicas da Regulação da Atenção à Saúde as seguintes ações, EXCETO:

- a) contratação e de controle assistencial.
- b) regulação do acesso à assistência.
- c) as que têm como objetivo único os fins lucrativos.
- d) as de avaliação da atenção à saúde.
- e) as de auditoria assistencial.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHOM DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

556. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A regulação do acesso à assistência, inscrita nas diretrizes do SUS de universalidade, integralidade e equidade da atenção, busca a qualidade da ação, a resposta adequada aos problemas clínicos e a satisfação do usuário. Constituem-se ações da Regulação do Acesso à Assistência ou Regulação Assistencial, EXCETO:

- a) a regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar às urgências.
- b) o controle dos leitos disponíveis.
- c) o controle e o monitoramento da utilização mais adequada dos níveis de complexidade.
- d) o estabelecimento de referência entre unidades, seguindo a ordem de solicitação da assistência pelo usuário.

e) a organização de fluxos de referência especializada intermunicipal.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHOM DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

557. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Quanto aos Princípios Básicos da Auditoria, o auditor deve:

- a) ter relação com a área/elemento a ser auditado, de forma a influenciar os resultados.
- b) participar nos casos em que há conflitos de interesses que possam influenciar no seu julgamento, tomando partido ou emitindo opiniões.
- c) durante o desenvolvimento do seu trabalho solicitar a opinião de outro profissional para a definição de suas conclusões e a elaboração dos seus relatórios e pareceres.
- d) se abster a proteger os interesses da sociedade, as normas de conduta ético-profissionais e confidencialidade das informações recebidas.

e) possuir conhecimento técnico específico e das diversas áreas relacionadas com as atividades auditadas, o que lhe permitirá comprovar a legitimidade e a legalidade no desempenho dos objetivos do órgão ou entidade sob exame.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHOM DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

558. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Os auditores estão obrigados a manter o sigilo e a privacidade em relação ao que vierem a constatar ou observar. Os Códigos de Ética são parâmetros fundamentais destinados a nortear a conduta profissional quanto ao aspecto de:

- a) censurar o consentimento prévio do paciente.
- b) manter sigilo e privacidade no manuseio de prontuário.
- c) favorecer informações do quadro clínico do paciente a outros.
- d) promover atos de imperícia, imprudência ou negligência.
- e) proporcionar a isenção pelo ato profissional.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHOM DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

559. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O órgão de auditoria deve, por meio de seu responsável, encaminhar um ofício informando ao gestor que será realizada auditoria em seu estado/ município/unidade de serviço. Nessa ocasião, qual é o documento a ser encaminhado ao gestor?

- a) Ofício de Comunicação.
- b) Comunicado de Auditoria.
- c) Roteiro.
- d) Protocolo.
- e) Papéis de Trabalho como Instrumento de Apoio.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

560. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

No que consiste a fase Operativa da Auditoria?

- a) Análise dos documentos e dados disponíveis nos sistemas informatizados, que permitam subsidiar a fase operativa.
- b) Diagnóstico do objeto da auditoria, permitindo um melhor planejamento da fase operativa da auditoria.
- c) Verificação in loco das ações, com exame direto dos fatos e situações, tendo por objetivo sistematizar procedimentos.
- d) Definição do escopo do trabalho, inclusive das unidades que deverão ser visitadas.
- e) Elaboração do relatório analítico a partir das informações levantadas nessa fase.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

561. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Os resultados dos trabalhos de uma auditoria são consubstanciados no Relatório de Auditoria que deve conter as informações quanto às ações, fatos ou situações observadas e deve reunir, entre outros, EXCETO:

- a) o escopo e o objetivo da auditoria.
- b) a identificação da equipe de auditoria e do auditado.
- c) as não conformidades constatadas seguidas de recomendações punitivas às pessoas responsáveis.
- d) documentos auditados e descrição das não conformidades encontradas.
- e) data da auditoria.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

562. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

De acordo com o Departamento Nacional de Auditoria do SUS / DENASUS, na aplicação da glosa, é importante observar alguns procedimentos. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- a) A prática de atos ilegais ou ilegítimos ocasiona ressarcimento ao erário, recomendação de correção do procedimento e responsabilização dos autores do ato e da autoridade administrativa competente com envio para o Ministério Público.
- b) A prática de atos antieconômicos ou indevidos em que não seja constatada a má fé gera punição ao gestor de correção do procedimento realizado.
- c) Toda glosa deverá ser apresentada mediante um simples relatório.
- d) Na glosa do prontuário médico, deve ser anexado um simples xerox da planilha de distorções.
- e) A glosa não necessitará de acompanhamento de documentação comprobatória, uma vez que já tem a assinatura do enfermeiro auditor.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

563. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

De acordo com o Departamento Nacional de Auditoria / DENASUS, uma das atividades gerais de auditoria no âmbito do SUS é:

- a) auditar a regularidade dos procedimentos técnico-científicos praticados por pessoas físicas e jurídicas dos Planos de Saúde Privada.
- b) fiscalizar o controle contábil, financeiro e patrimonial na gestão do Sistema de Saúde privado.
- c) verificar a adequação, a resolutividade e a qualidade dos procedimentos e serviços de saúde disponibilizados à população estrangeira.
- d) fiscalizar a assistência à saúde e os recursos públicos destinados ao Sistema Único de Saúde.
- e) verificar os controles e os procedimentos na assistência médica privada e as condições físico-funcionais da prestação de serviços de saúde.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

564. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Qual é a Legislação que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde?

- a) Portaria nº 2.266, de 12 de dezembro de 2001.
- b) Portaria nº 1.069, de 19 de agosto de 1999.
- c) Resolução COFEN nº 311/2007.
- d) Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995.
- e) Resolução Cofen nº 266/2001.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

565. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Quanto a Natureza das Auditorias, apresenta-se de forma _____ as ações inseridas no planejamento anual de atividades dos componentes de auditoria ou de forma _____ as ações não inseridas no planejamento, realizadas para apurar denúncias ou para atender alguma demanda específica.

- a) Regular ou Ordinária / Especial ou Extraordinária
- b) Regular ou Ordinária / Compartilhada
- c) Regular ou Ordinária / Direta
- d) Especial ou Extraordinária / Integrada
- e) Especial ou Extraordinária / Regular ou Ordinária

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

566. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
A fase da Auditoria Analítica ou Pré-Auditoria é de fundamental importância para o sucesso da auditoria operativa. O relatório analítico deve ser substanciado e objetivo, de modo que possibilite à equipe, na fase de auditoria operativa, elementos para o bom desenvolvimento dos trabalhos. Em relação à fase da Auditoria Analítica, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Tem a finalidade de subsidiar a verificação in loco
- b) É um conjunto de procedimentos especializados que consiste na análise de relatórios, processos e documentos.
- c) É um conjunto de procedimentos especializados que consiste na verificação in loco.
- d) Seus resultados subsidiarão o planejamento da auditoria operativa.

e) Nessa fase do processo utilizam-se dados extraídos dos Sistemas de Informações do SUS.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

567. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

O relatório de auditoria deve reunir, principalmente, os seguintes atributos, visando à sua melhor qualidade: _____: para assegurar que os resultados da auditoria correspondam aos objetivos da mesma; _____: deve conter apenas informações relevantes para elucidação dos fatos auditados; _____: linguagem clara, a fim de que o leitor entenda facilmente, ainda que não versado na matéria, o que se quer transmitir, sem necessidade de explicações adicionais; e _____: contendo objetivamente a análise final em decorrência das constatações de conformidades e não conformidades.

- a) Objetividade / Clareza / Conclusão / Coerência
- b) Clareza / Conclusão / Coerência / Objetividade
- c) Conclusão / Coerência / Objetividade / Clareza
- d) Coerência / Objetividade / Clareza / Conclusão
- e) Coerência / Conclusão / Clareza / Objetividade

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

568. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
A auditoria do SUS verifica a execução das ações e serviços de saúde quanto aos aspectos orçamentário, operacional, patrimonial, além de analisar a conformidade do gasto, bem como dos processos e resultados. Assinale a alternativa que corresponde a uma das Diretrizes para a atuação da auditoria do SUS.

- a) Capilaridade, centralização e desintegração para garantir atuação em todo o território nacional.
- b) Multiplicação de tarefas específicas de cada esfera de gestão do SUS.
- c) Desintegração dos órgãos das estruturas gestoras do SUS.
- d) Improvisação, monitoramento e avaliação, regulação e vigilância em saúde e outros órgãos integrantes do sistema de controle interno e externo.

e) Ênfase na mensuração do impacto das ações de saúde, na aplicação dos recursos e na satisfação do usuário.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

569. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Por que a auditoria no SUS é importante?

- a) Sua existência traz maleficência ao SUS.
- b) Tem a finalidade de contribuir com a gestão por meio da análise dos resultados das ações e serviços privados de saúde.
- c) Colabora para a imprudência da gestão pública.
- d) Favorece o uso de recursos com a finalidade de diminuir o desperdício e combater a corrupção.
- e) Tem papel importante no controle do desperdício dos recursos públicos.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Enfermagem em Oncologia

570. (IBFC/2017/EBSERH)
Sobre Leucemia, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Leucemias são neoplasias malignas das células primitivas hematopoéticas (stem cells) que surgem na medula óssea e que se distribuem pelo sangue circulante e por outros órgãos.
- () Na leucemia linfocítica crônica (LLC), as células hematopoéticas imaturas (blastos) proliferam sem sofrer diferenciação em células maduras normais.
- () A leucemia aguda caracteriza-se pela proliferação de linfócitos imunologicamente incompetentes.
- () As leucemias agudas são divididas em duas grandes categorias: a leucemia linfoblástica aguda (LLA) e a leucemia mieloblástica aguda (LMA).

- a) V,F,F,V
- b) V,V,V,V
- c) V,F,V,F
- d) F,V,F,V
- e) F,V,V,V

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

571. (IBFC/2016/EBSERH)
O osteossarcoma (neoplasia maligna ósseo) é ao que tudo indica causado pela exposição a (ao):

- a) Chumbo
- b) Mercúrio
- c) Níquel
- d) Radiação ionizante
- e) Benzeno

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

572. (IBFC/2016/EBSERH)
Leucemias têm relação causal, principalmente, com exposição ocupacional a (ao):

- a) Benzeno
- b) Cádmio
- c) Berílio
- d) Fósforo vermelho
- e) Sílica

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

573. (IBFC/2016/EBSERH)
Os quimioterápicos antineoplásicos somente devem ser preparados em área exclusiva e com acesso restrito aos profissionais diretamente envolvidos. A área deve dispor de condições mínimas, entre as quais não se inclui:

- a) Material para uso da enfermagem em situações de emergência
- b) Vestiário de barreira com dupla câmara
- c) Sala de preparo dos quimioterápicos
- d) Local destinado para as atividades administrativas
- e) Local de armazenamento exclusivo para estocagem

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

574. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando a lista nacional de agentes cancerígenos para humanos, assinale aquele que é considerado confirmado como carcinogênico para homens:

- a) Uretano
- b) Ácido dimetilarsênico
- c) Acrilamida
- d) Aflatoxinas
- e) Acetato de vinila

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

575. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando a prevenção do câncer de colo de útero, é correto afirmar que:

- a) É um método diagnóstico e não de rastreamento. Utiliza-se o auxílio do colposcópico
- b) Mulheres hysterectomizadas e idosas não necessitam realizar o exame de Papanicolaou
- c) Mulheres vacinadas para o Papiloma Vírus Humano não necessitam realizar o exame de Papanicolaou
- d) O exame de Papanicolaou é um exame de rastreamento por excelência para o câncer de colo uterino. É um exame simples, prático e baixo custo
- e) O exame de Papanicolaou apresenta uma taxa de 35% de falso negativo e sua especificidade é maior que 70%

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

576. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando a Resolução do COFEN 210/1998, que dispõe sobre a atuação dos profissionais de Enfermagem que trabalham com quimioterápicos antineoplásicos. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Administrar quimioterápico antineoplásico, conforme farmacocinética da droga e protocolo terapêutico, sob supervisão médica.
- () Realizar consulta com base no processo de enfermagem direcionado a clientes em tratamento quimioterápico antineoplásico.

() Elaborar protocolos terapêuticos de Enfermagem na prevenção, tratamento e minimização dos efeitos colaterais em clientes submetidos ao tratamento quimioterápico antineoplásico.

() Formular e implementar manuais educativos aos clientes e familiares, adequando-os a sua realidade social.

- a) F,V,V,V
- b) V,V,V,V
- c) V,F,V,V
- d) F,V,F,F
- e) V,F,F,F

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

577. (IBFC/2016/EBSERH)

O medicamento utilizado para tratamento de condições associadas ao aumento da atividades osteoclásticas, tais como metástases ósseas predominantemente líticas, hipercalcemia induzida por tumor e doença de Paget é:

- a) Palonosetrona
- b) Rasburicase
- c) Dexrazoxano
- d) Pamidronato Dissódico
- e) Aprepitanto

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

578. (IBFC/2016/EBSERH)

Existem alguns antídotos utilizados na redução da toxicidade local devido ao extravasamento de drogas citotóxicas vesicantes. Entre os antídotos disponíveis, pode-se citar a Hialuronidase. Considerando a Hialuronidase, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. Acelera a difusão da droga, aumentando a permeabilidade celular.
- II. Indicada para extravasamento de vincristina e vimblastina.
- III. Disponível exclusivamente na forma de creme para aplicação tópica.
- IV. O medicamento deve ser utilizado após realização de desbridamento cirúrgico da área afetada.

- a) As frases I, II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as frases III e IV estão corretas
- c) Apenas as frases I e II estão corretas
- d) Apenas a frase II está correta
- e) Apenas a frase III está correta

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

579. (IBFC/2016/EBSERH)

Na unidade oncológica, encontra-se internado um paciente com diagnóstico de enfermagem “Risco para infecção relacionado com as defesas inadequadas decorrentes da imunossupressão secundária à radiação ou a agentes antineoplásicos”. Considerando as medidas adotadas para reduzir infecção nesse paciente, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I. Evitar frutas cruas, carnes vermelhas, peixes e vegetais crus quando a contagem absoluta de leucócitos menor que 1000/mm³.

II. Dar preferência para verificação de temperatura retal, por se tratar de procedimento mais fidedigno para identificação de febre.

III. Usar emolientes fecais para evitar a constipação intestinal e esforço para defecar.

IV. Realizar preferencialmente injeções intramusculares.

- a) As frases I, II e IV estão corretas
- b) Apenas as frases I e III estão corretas
- c) Apenas as frases II e IV estão corretas
- d) Apenas a frase II está correta
- e) Apenas a frase III está correta

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

580. (IBFC/2016/EBSERH)

A radiação é energia que se move através do espaço ou de um meio material, na forma de onda ou partículas. De acordo com os tipos de radiação, _____ é fóton emitido pelo núcleo. É muito penetrante, sendo necessária a blindagem para detê-los (chumbo, concreto, aço ou ferro). Preencha a lacuna corretamente e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) A Radiação Beta
- b) A Radiação Alfa
- c) A Radiação Gama
- d) O Nêutron
- e) A Radiação Não-Ionizante

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

581. (IBFC/2016/EBSERH)

Os tumores de pele e subcutâneo representam uma parcela significativa dos encaminhamentos para a cirurgia ambulatorial. Considerando as características das lesões, assinale a alternativa incorreta.

a) Fibroma (dermatofibroma) é um tumor de origem conjuntiva, duro, único ou múltiplo, de tamanho variável frequentemente indolor e arredondado

b) Cisto epidérmico é um nódulo amolecido, envolto por epiderme verdadeira, com cavidade que contém queratina, com localização predominantemente nas regiões distais dos membros, nádegas, sendo facilmente distinguido do cisto sebáceo através do exame clínico

c) Lipoma é um tumor benigno composto de células adiposas, encontrado em todos os locais onde se acha tecido gorduroso. A predominância é em regiões: cervical, costas, nádegas e porção proximal das extremidades

d) Mancha em vinho do porto é uma lesão não involutiva, de limites bem precisos, sendo de coloração rósea ao nascimento e escurece com o passar dos anos, até atingir uma coloração vinhosa. Sendo normalmente unilateral e terminando na linha média da cabeça

e) Neurofibroma é uma neoplasia benigna constituída por células da bainha de Schwann, sendo o tumor primitivo mais comum dos nervos periféricos, sendo as lesões frequentemente múltiplas e caracterizam-se por serem nódulos da cor da pele, duros ou moles de tamanho variável

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

582. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

No caso da atenção ao câncer de colo de útero e mama, qual é o nível assistencial no qual são realizados os procedimentos cirúrgicos e de alta complexidade em oncologia (cirurgia oncológica, radioterapia e quimioterapia) e que é responsável pela oferta ou coordenação dos cuidados paliativos das pacientes com câncer?

- a) Atenção primária à Saúde.
- b) Atenção terciária à Saúde.
- c) Atenção secundária à Saúde.
- d) Atenção quaternária à Saúde.
- e) Atenção básica de Saúde.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

583. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Assinale a alternativa que apresenta os tipos mais comuns de cânceres em homens brasileiros.

- a) De pele e de próstata.
- b) De mama e de estômago.
- c) Linfomas e leucemias.
- d) De pulmão e de cólon.
- e) De reto e de tireoide.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

584. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
O enfermeiro deve manter-se atualizado, para que possa orientar a população em relação a medidas de prevenção e/ou redução do risco de câncer. Fazem parte dessas orientações:

- a) evitar o tabagismo e exposição excessiva ao sol.
- b) controlar o peso, diminuir ou evitar a ingestão de álcool e de sal na dieta.
- c) evitar exercícios periódicos e boa alimentação.
- d) evitar emoções negativas e aumentar o consumo de alimentos ricos em fibras.
- e) evitar atividades físicas periódicas.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

585. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
De acordo com os objetivos de tratamento quimioterápico neoadjuvante, adjuvante e paliativo, assinale a alternativa correta.

- a) O tratamento neoadjuvante tem como objetivo a redução tumoral para posterior tratamento local adequado.
- b) O tratamento adjuvante é usado como tratamento de primeira opção com finalidade de combater micrometástase.
- c) O tratamento paliativo é utilizado em pacientes com metástase, diagnosticado com recidiva em que a possibilidade de cura é certa.
- d) O tratamento adjuvante é utilizado em pacientes com diagnóstico com recidivas e possibilidades de cura remota.
- e) O tratamento paliativo é utilizado em outras modalidades de tratamento, com finalidade de combates à micrometástase.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

586. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Conforme à RDC/ANVISA nº 220 de 2004, regulamentar a manipulação de drogas antineoplásicas e similares, nos estabelecimentos de saúde, é atribuição privativa do:

- a) enfermeiro.
- b) técnico de enfermagem.
- c) médico.
- d) farmacêutico.
- e) auxiliares de enfermagem.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

587. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Conforme regulamentação da RDC/ANVISA nº 220 de 2004, a administração de drogas quimioterápicas é privativo do:

- a) farmacêutico.
- b) técnico de enfermagem.
- c) auxiliar de enfermagem.
- d) enfermeiro.
- e) médico.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

588. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Dentre as várias modalidades de tratamento de câncer, está a radioterapia, que utiliza a radiação para terapêutica. Há três tipos de radioterapia, são elas:

- a) teleterapia, tomografia e braquiterapia.
- b) braquiterapia, iodoterapia e ressonância magnética.
- c) isotopoteria, ressonância magnética e iodoterapia.
- d) teleterapia, braquiterapia e isotopoteria.
- e) tomografia, teleterapia e iodo terapia.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

589. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A radioterapia é um tratamento locorregional que tem por objetivo erradicar tumores, lesionando o mínimo possível os tecidos adjacentes saudáveis. Esse tratamento acontece:

- a) em regime hospitalar, com seções de aplicações periódicas semanais por até três meses.
- b) em regime hospitalar, com aplicações diárias, sendo a dose total aplicada a cada seção.

c) em regime ambulatorial, diariamente, de segunda a segunda, sendo aplicada a dose total por período de até dois meses.

d) em regime ambulatorial, uma ou duas vezes ao dia, de segunda a sexta, sendo a dose total fracionada e aplicada por um período de até dois meses.

e) em regime ambulatorial, inicialmente seguido de hospitalização, para complemento do ciclo, e aplicações diárias por período de até dois meses.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

590. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Dentre os efeitos locais provocados pela radioterapia, podemos citar principalmente as reações cutâneas conhecidas como

- a) flebites.
- b) radiodermites.
- c) mucosites.
- d) pneumonites.
- e) gastroenterites.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

591. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
O risco de câncer de pulmão atribuível à ocupação varia de 4 a 40%, de acordo com o agente analisado. Ainda que a relação nexa causal exija a investigação de diversos fatores, um agente etiológico de natureza ocupacional bastante conhecido para a Neoplasia Maligna de Brônquios e Pulmões é a

- a) exposição ao fósforo.
- b) exposição à sílica.
- c) execução de atividades repetitivas.
- d) exposição à radiação ultravioleta.
- e) exposição ao ar comprimido.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

592. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Em geral, os tumores vesicais originam-se na base da bexiga e envolvem os orifícios ureterais e o colo da bexiga. São manifestações clínicas do câncer de bexiga:

- a) Hematúria indolor e visível; Infecção do trato urinário; Polaciúria; Urgência urinária; Disúria.

b) Polaciúria; urgência urinária e disúria; Massa no flanco; Dor maciça nas costas.

c) Hematúria indolor e visível; Massa no flanco; Dor maciça nas costas.

d) Hematúria indolor e visível; Infecção do trato urinário; Polaciúria; Massa no flanco.

e) Hematúria indolor e visível; Dor maciça nas costas; Urgência urinária.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

593. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
A situação clínica comum em pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico, caracterizada por febre e queda brusca das células sanguíneas, denomina-se

- a) neutropenia.
- b) pancitopenia.
- c) anemia.
- d) plaquetopenia.
- e) leucopenia.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

594. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Dentre as modalidades de tratamento do câncer, temos a quimioterapia (QT) e a radioterapia (RTX). A principal diferença entre essas duas modalidades é

- a) a forma de tratamento: a QT é sistêmica, enquanto a RTX é localizada.
- b) a eficácia: a QT é mais eficiente que a RTX.
- c) a duração: a QT dura poucos dias e a RTX muitos dias.
- d) a forma de tratamento: a QT é localizada e a RTX é sistêmica.

e) a eficácia e a duração: a QT é menos eficiente e dura poucos dias, enquanto a RTX é mais eficiente e dura muitos dias.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

595. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Dentre os agentes biológicos relacionados ao desenvolvimento do câncer, está um que se relaciona à gastrite. Este agente é o:

- a) Papiloma Vírus Humano (HPV).
- b) Vírus da hepatite B.
- c) *Helicobacter pylori*.
- d) Ebbastem-Baar vírus.
- e) Vírus linfotrópico da célula humana (HTLA).

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

596. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 Proto-oncogene é a porção genética de DNA que regula o crescimento e a reparação celular normal. Uma mutação pode permitir que as células proliferem além das necessidades normais do corpo. A afirmação acima se refere a fenômenos envolvidos em qual fase da carcinogênese?

- a) Promoção.
- b) Iniciação.
- c) Progressão.
- d) Desenvolvimento.
- e) Invasão.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

597. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 Em uma situação de Síndrome de Lise Tumoral (SLT), qual é o principal raciocínio clínico exercido na assistência de enfermagem?

- a) Manter o paciente em monitorização cardíaca contínua, devido à compressão tumoral.
- b) Observar a função renal com controle de diurese rigoroso e observar os distúrbios hidroeletrólíticos.
- c) Observar a regressão da massa tumoral, uma vez que está ocorrendo a lise.
- d) Manter o paciente em isolamento protetor, devido ao grande risco de infecções, pois a maior ocorrência de SLT é na doença onco-hematológica.
- e) Manter material de intubação preparado, devido ao risco de edema de glote gerado pela lise tumoral.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

598. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 A ocorrência de radiodermite em pacientes com câncer em tratamento radioterápico é muito frequente. Assim, é correto afirmar que

- a) o paciente deve receber orientações para lavar o local irradiado somente com água e sabão neutro.
- b) o uso de hidratantes à base de óleo, no local irradiado previne estas lesões.

c) todo paciente em radioterapia, apresentará esse tipo de lesão, independente do cuidado com a área irradiada.

d) compressas com chá de camomila na área irradiada previnem estas lesões.

e) o uso de glicerina no local a ser irradiado é eficaz no tratamento das radiodermites.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

599. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 Plantonista recebe paciente que dá entrada apresentando ficha de internação contendo o diagnóstico de "Linfonodomegalia a esclarecer". Ao exame físico: linfonodos cervicais bilaterais com aproximadamente 5 a 6 cm de diâmetro e inguinais bilaterais aproximadamente com 3 a 4 cm de diâmetro, indolor à palpação. Hemograma de entrada: normal. Exames de imagem: massa em tórax infiltração de mediastino com aproximadamente 25 cm de diâmetro. Qual é o sintoma clínico mais provável da paciente apresentar e que requer maior atenção do enfermeiro?

- a) Deglutição prejudicada pelos linfonodos da cadeia cervical.
- b) Os linfonodos descritos não trazem alterações clínicas importantes, além da hematológica.
- c) Insuficiência respiratória restritiva por compressão.
- d) Dificuldade para deambular devido à presença de linfonodos em cadeia inguinal.
- e) Compressão da veia cava.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

600. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 A Política Nacional de Atenção Oncológica, instituída em 2005, está baseada nos seguintes pontos: prevenir o que for prevenível; curar o que for curável; aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida dos pacientes; além de gerar os recursos de saúde para se alcançar o sucesso.

Sobre o assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() O controle do tabagismo, evitar exposição à radiação e estimular a alimentação saudável requerem do enfermeiro conhecimentos para incentivar a realização de ações eficazes para a prevenção primária da doença.

() A dificuldade para o controle do câncer de mama e colo de útero pode ser representada pela falta de conhecimento, portanto, o enfermeiro deve incrementar a oferta de colpocitologia oncológica na rede básica, bem como de avaliação clínica das mamas.

() A inserção da vacina contra o HPV no calendário vacinal brasileiro é uma das estratégias para atender a esta política.

() O controle dos cânceres de próstata, pele e boca são os principais alvos desta política de controle do câncer.

- a) F – F – F – F.
b) F – F – F – V.
c) V – V – F – F.
d) V – F – F – V.
e) V – V – V – F.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

601. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Referente à carcinogênese, são considerados carcinógenos indutores e promotores:

- a) asbesto e benzeno.
b) fumo e álcool.
c) fumo e asbesto.
d) benzeno e álcool.
e) asbesto, fumo e benzeno.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

602. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Entre as metas nacionais propostas pelas Políticas de saúde de relevância para o controle do câncer do colo do útero e da mama estão, EXCETO:

- a) aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos.
b) ampliar a cobertura de exame citopatológico em mulheres de 35 a 55 anos.
c) tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer.
d) aperfeiçoamento do rastreamento dos cânceres do colo do útero e da mama.
e) garantia de 100% de acesso ao tratamento de lesões precursoras de câncer.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

603. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito do SUS e do papel do enfermeiro na vigilância em saúde, julgue o item seguinte:

Embora as taxas de mortalidade por diabetes e certos tipos de câncer estejam subindo, nota-se uma queda na mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, o que representa uma grande conquista para a saúde no Brasil.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

604. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito do SUS e do papel do enfermeiro na vigilância em saúde, julgue o item seguinte.

A morbimortalidade causada pelas doenças crônicas não transmissíveis é maior na população mais rica, o que exige uma atenção especial da enfermagem para esse grupo, buscando, por exemplo, realizar intervenções para o tratamento das disfunções metabólicas e cardiovasculares.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

605. (2018/ CESPE)

A respeito de noções básicas de epidemiologia e vigilância à saúde do trabalhador, bem como acerca de registros em bases de dados, documentos e legislações nacionais relativos a esse tema, julgue o item a seguir. Entre as seis doenças ou agravos à saúde do trabalhador de notificação compulsória e monitorados por meio da estratégia de vigilância em unidades sentinelas, os transtornos mentais relacionados ao trabalho foram os mais registrados entre 2010 e 2015.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

606. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito do SUS e do papel do enfermeiro na vigilância em saúde, julgue o item seguinte.

Embora as taxas de mortalidade por diabetes e certos tipos de câncer estejam subindo, nota-se uma queda na mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, o que representa uma grande conquista para a saúde no Brasil.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

607. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito do SUS e do papel do enfermeiro na vigilância em saúde, julgue o item seguinte.
Ainda persistem no cenário de saúde brasileiro grandes desafios, como a redução da alta frequência de cesarianas, de nascimentos pré-termo e de abortos ilegais.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

608. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito do SUS e do papel do enfermeiro na vigilância em saúde, julgue o item seguinte.
As doenças crônicas não transmissíveis são a principal fonte de carga de doença, detendo os transtornos neuropsiquiátricos a maior parcela de contribuição, o que indica que o enfermeiro necessita de preparo clínico adequado para intervenção nos problemas de saúde dessa natureza.

- a) CERTO
b) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

609. (IBFC/2017/EBSERH)

No Brasil, são doenças de notificação compulsória imediata:

- a) Síndrome da Rubéola Congênita, Sífilis adquirida, congênita e em gestante
b) Tétano, Toxoplasmose Gestacional e Congênita
c) Raiva Humana, Sarampo e Rubéola
d) Tuberculose, Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana
e) HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Hepatites Virais e Hanseníase

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

610. (IBFC/2016/EBSERH)

Estudos analíticos são aqueles delineados para examinar a existência de associação entre uma exposição e uma doença ou condição relacionada à saúde. Entre os principais delineamentos de estudos analíticos não se inclui:

- a) Ecológico
b) Transversal
c) Piramidal
d) Coorte prospectivo
e) Casos-controle

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

611. (IBFC/2016/EBSERH)

A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais, agregados de casos ou surtos, suspeitos ou confirmados, de agravos relacionados na portaria do ministério da saúde.

Assinale a alternativa incorreta.

- a) São doenças de notificação compulsória: dengue, febre amarela, hanseníase, sífilis congênita, rubéola, sarampo
b) São doenças de notificação compulsória: doença de chagas, febre amarela, hanseníase, sífilis em gestante, AIDS, tuberculose
c) São doenças de notificação compulsória: Poliomielite, dengue, hanseníase, sífilis em gestante, AIDS, leptospirose

d) São doenças de notificação compulsória: Poliomielite, dengue, febre amarela, raiva humana, sífilis congênita, AIDS, sarampo

e) São doenças de notificação compulsória: tétano, crohn, lúpus, faringite, dengue, hanseníase, sífilis em gestante, AIDS, tuberculose

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

612. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando os indicadores básicos de saúde no Brasil, a taxa de mortalidade neonatal precoce é calculada pelo:

- a) Número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado
b) Número de óbitos de 0 a 28 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado

c) Número de óbitos de 0 a 1 dia de vida completo, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado

d) Número de óbitos de 1 a 40 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado

e) Número de óbitos de 0 a 6 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

613. (IBFC/2016/EBSERH)

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal. É uma doença de notificação compulsória imediata:

- a) Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)
- b) Doença aguda pelo vírus Zika
- c) Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e Criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV
- d) Hantavirose
- e) Sífilis Adquirida, Congênita ou em gestante

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

614. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A detecção precoce e o controle efetivo, ainda nos estágios iniciais do surto, são exigências no processo de vigilância epidemiológica das IRAS, como determinada pela Portaria MS nº 2.616, de 12 de Maio de 1998 (BRASIL, 1998). Para isso, um conjunto de etapas deve ser repetido até o alcance dos objetivos. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a essas etapas.

- a) Consolidação e análise de informações já disponíveis.
- b) Conclusões preliminares a partir dessas informações.

c) Apresentação das conclusões preliminares e formulação de hipóteses.

d) Definição e coleta das informações necessárias para testar as hipóteses.

e) Definição e adoção de medidas de prevenção e controle somente ao término do processo.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

615. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A Epidemiologia é o estudo da distribuição e dos determinantes de estados ou eventos relacionados à saúde em populações específicas, e a aplicação dos resultados para o controle de problemas de saúde (APECIH, 2000; p. 1). A razão entre o número de indivíduos mensuravelmente afetados ou doentes por um agente em uma população definida em um período particular, sem considerar quando o processo ou doença começou, refere-se à taxa de

- a) morbidade.
- b) letalidade.
- c) mortalidade.
- d) densidade de incidência.
- e) prevalência.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

616. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A notificação compulsória consiste na comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal. Assinale a alternativa que denomina as doenças/agravos de notificação compulsória imediata.

- a) Varíola; Hantavirose; Febre Amarela.
- b) Varíola; Influenza humana produzida por novo subtipo viral; Leishmaniose Tegumentar Americana.
- c) Leishmaniose Tegumentar Americana; Síndrome da Paralisia Flácida Aguda; Tuberculose.
- d) Tuberculose; Febre Amarela; Hantavirose.
- e) Hantavirose; Leishmaniose Tegumentar Americana; Tuberculose.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

617. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Enfermeira foi contratada para o Serviço de Controle de Infecção da Santa Casa. Ao analisar os dados sobre infecção hospitalar, identificou como um dos pontos críticos a falta de informações sobre a Taxa de Incidência das ISC, a partir das seguintes informações: total de colecistectomias realizadas no mês de novembro de 2014 = 25; diagnosticadas duas ISC superficiais, duas ISC profundas e uma ISC de órgão/cavidade. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o valor correto da Taxa de Incidência.

- a) 2%.
- b) 16,6%.
- c) 5%.
- d) 20%.
- e) 5,2%.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

618. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
As situações das condições de saúde revelam uma importância relativa crescente de qual tipo de condições no quadro epidemiológico atual?

- a) Crônicas.
- b) Agudas.
- c) Instáveis.
- d) Variáveis.
- e) Transmissíveis.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

619. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
São os componentes da vigilância em saúde, EXCETO:

- a) ações de vigilância.
- b) hierarquização das ações.
- c) controle de agravos à saúde.
- d) promoção à saúde.
- e) prevenção de doenças.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

620. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A análise da situação de saúde permite a identificação, descrição, priorização e explicação dos problemas de saúde da população. Por exemplo: conhecer o número de habitantes, com distribuição por sexo, idade, local de residência e fluxos de migração, pode ser uma análise por meio da:

- a) caracterização do perfil de doenças.
- b) caracterização das condições de saúde.
- c) caracterização da população.
- d) descrição dos problemas.
- e) caracterização dos agravos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

621. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
O intenso trânsito internacional e nacional de pessoas e mercadorias viabiliza o contato com distintas fontes de infecção, com consequentes transtornos à saúde individual e coletiva. Dessa forma, os pontos de entrada internacional fornecem uma oportunidade para implementar medidas para prevenir a propagação internacional de doenças. Estas medidas incluem, EXCETO:

- a) acesso a serviços médicos apropriados.
- b) bloqueio de tratamento ao doente e imediata extradição para o seu país de origem.
- c) profissionais capacitados para a inspeção de meios de transporte, como navios e aviões.
- d) instalações para implementar medidas de emergência (como a observação temporal de doentes).
- e) planos de contingência para emergências de saúde pública.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

622. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Nas últimas décadas, a população brasileira experimentou importantes mudanças em seu padrão demográfico e epidemiológico, como:

- a) a diminuição da expectativa de vida.
- b) a queda importante da fecundidade.
- c) a diminuição da relevância das doenças crônicas não transmissíveis.
- d) a diminuição da relevância das causas externas.
- e) o aumento da fecundidade.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

623. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Este indicador persiste, ainda nos dias de hoje, como um dos principais fatores associados à saúde e ao bem-estar das populações brasileiras.

Têm sido descritas associações entre baixos níveis deste indicador e maior risco de morte infantil, maior risco de morte por causas externas e maior risco de doenças infecciosas. O enunciado refere-se a qual indicador?

- a) Envelhecimento.
- b) Fecundidade.
- c) Escolaridade.
- d) Faixa etária.
- e) Gênero.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

624. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Comparando a mortalidade proporcional segundo grupos de causas para os homens e mulheres, nas últimas décadas, entre as mulheres, observou-se, no período de 1980 a 2004, uma redução absoluta da representatividade das mortes por:

- a) doenças do aparelho digestivo.
- b) neoplasias.
- c) doenças do aparelho circulatório.
- d) doenças do aparelho respiratório.
- e) doenças infecciosas e parasitárias.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

625. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A informação para a vigilância epidemiológica destina-se à tomada de decisões – informação para a ação. Este princípio deve reger as relações entre os responsáveis pela vigilância e as diversas fontes que podem ser utilizadas para o fornecimento de dados. Qual é o principal instrumento de coleta dos dados de notificação compulsória?

- a) SINAN.
- b) SISVAN.
- c) SIM.
- d) SIAB.
- e) SINASC.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

626. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

É um estudo realizado com base nos dados existentes nos registros dos serviços de saúde ou de outras instituições. Geralmente não é um estudo amostral e destina-se a coletar dados para complementar informações já existentes. O enunciado refere-se

- a) ao sistema sentinela.
- b) ao inquérito qualitativo.
- c) ao levantamento epidemiológico.
- d) à investigação Sanitária.
- e) ao levantamento bibliográfico.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

627. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Historicamente, tinha como função exercer o saneamento da cidade, fiscalizar as embarcações, os cemitérios e o comércio de alimentos, com o objetivo de vigiar a cidade para evitar a propagação das doenças. O enunciado refere-se:

- a) a agentes comunitários de saúde.
- b) à polícia sanitária.
- c) a agentes de endemias.
- d) à reforma sanitária.
- e) à liga médica de higiene.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

628. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Nas décadas de 60 e 70, um dos principais fatores que propiciaram a disseminação da 'vigilância' como instrumento em todo o mundo foi:

- a) a vacinação contra a dengue.
- b) o alargamento de vias públicas de transporte.
- c) a higienização de cortiços no Recife.
- d) o saneamento dos portos no Rio de Janeiro.
- e) a campanha de erradicação da varíola.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

629. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

São ações prioritárias de Vigilância em Saúde, EXCETO:

- a) notificação de doenças e agravos.
- b) alimentação e manutenção de sistemas de informação.
- c) vigilância ambiental.
- d) controle social no SUS.
- e) imunizações.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

630. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O Sistema de Informação em Saúde (SIS) integra as estruturas organizacionais dos sistemas de saúde. Dentre eles, aquele que possibilita a constituição de indicadores voltados para a avaliação de riscos à saúde do segmento materno infantil, a exemplo dos coeficientes de mortalidade infantil, é o:

- a) SISPRE.
- b) SISMAT.
- c) SINASC.
- d) SISTEC.
- e) SIM.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

631. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 A notificação negativa funciona como um indicador de eficiência do sistema de informações e consiste em:

- a) notificação da ocorrência de casos de doenças transmissíveis em uma determinada área.
- b) envio dos instrumentos de coleta de notificação, mesmo na ausência de casos.
- c) flexibilidade do envio de dados aos sistemas de notificação.
- d) diminuição de número de casos de determinado agravo.
- e) determinação das taxas de tuberculose de uma região de saúde.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

632. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 Este sistema de informação é um dos mais importantes para a Vigilância Epidemiológica e tem o objetivo de coletar e processar dados sobre agravos de notificação em todo o território nacional. O enunciado refere-se ao:

- a) SISREG.
- b) SINAN.
- c) SISVE.
- d) SISMEM.
- e) SINESP.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

633. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 Assinale a alternativa que constitui um indicador composto na medida em que combina dados de mortalidade (anos de vida perdidos por óbito precoce) com dados de morbidade (grau e tempo de incapacidade devido a uma dada patologia).

- a) Taxa de mortalidade infantil.
- b) DALY.
- c) ILDDE.
- d) Coeficiente de morbidade.
- e) Mortalidade geral.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Farmacologia

634. (CESPE/2018/EBSERH)
 Acerca da atuação de medicamentos no organismo humano, julgue o item seguinte.
 O acetaminofeno, ou paracetamol, e a dipirona são analgésicos puros capazes de aliviar dor de intensidade leve a moderada e febre, pois eles afetam a produção de substâncias conhecidas como prostaglandinas.

- c) CERTO
- e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

635. (CESPE/2018/EBSERH)
 Acerca da atuação de medicamentos no organismo humano, julgue o item seguinte.
 Antieméticos são fármacos que atuam nos rins, aumentando o volume e o grau do fluxo urinário e promovendo a eliminação de eletrólitos como o sódio e o potássio.

- c) CERTO
- e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

636. (CESPE/2018/EBSERH)
 Acerca da atuação de medicamentos no organismo humano, julgue o item seguinte.
 Medicamentos anti-histamínicos têm a função de reduzir ou eliminar os efeitos da histamina, que é um mediador químico secretado pelo corpo especialmente nos casos de reação alérgica.

- c) CERTO
- e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

637. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)

Qual dos fármacos a seguir pode estar associado ao aumento da pressão arterial?

- a) Polivitamínicos.
- b) Betabloqueadores.
- c) Protetores gástricos.
- d) Descongestionantes nasais.
- e) Antitireoidianos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

638. (IBFC/2016/EBSERH)

Temos várias drogas utilizadas em Centro Cirúrgico. Assinale a alternativa que contemple um exemplo de analgésicos maiores, droga mais utilizada atualmente durante uma anestesia geral.

- a) Protóxido de nitrogênio
- b) Isoflurano
- c) Sevoflurano
- d) Sufentanil
- e) Propofol

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

639. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre os anestésicos locais, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. Um anestésico local é uma substância que, colocada em contato com as fibras nervosas, tem a propriedade de interromper a transmissão do impulso nervoso.

II. Os ésteres, entre os quais o principal é a cocaína, são os anestésicos locais mais utilizados.

III. Os ésteres são muito raramente responsáveis por problemas alérgicos.

IV. A lidocaína ou xilocaína é a mais conhecida de todos os anestésicos locais.

- a) I, II e III, apenas
- b) I, II, III e IV
- c) II e III, apenas
- d) I e IV, apenas
- e) I, III e IV, apenas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

640. (IBFC/2016/EBSERH)

O medicamento _____, usado para a anticoncepção hormonal de emergência, insere-se no contexto da Rede Cegonha como insumo eficaz para evitar a gravidez indesejada e, conseqüentemente, o abortamento inseguro, contribuindo para a redução da morbimortalidade materna. Tem apresentação de comprimidos de 0,75mg (cartela com 2 comprimidos) e 1,5mg (cartela com 1 comprimido).

Preencha a lacuna e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) Acetato de ciproterona
- b) Desogestrel
- c) Gestodene
- d) Norgestrel
- e) Levonorgestrel

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

641. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando o medicamento Nitroglicerina, leia as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. São efeitos colaterais: hipotensão postural, rubor facial, taquicardia, choque, edema periférico, cefaleia, náuseas, vômitos, fraqueza muscular e visão borrada.

II. Deve ser diluída com soro fisiológico 0,9%, soro glicosado 5% ou bicarbonato de sódio.

III. É um vasodilatador venoso e arterial.

IV. É um inotrópico não digitalico, sendo uma droga simpatomimética.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) As afirmativas II e IV estão corretas
- c) Apenas a frase III está correta
- d) As afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a frase IV está correta

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

642. (IBFC/2016/EBSERH)

As drogas vasoativas são muito utilizadas na Unidade de Terapia Intensiva e o Enfermeiro deve ter conhecimento adequado no preparo, administração e avaliação do paciente. Entre as drogas vasoativas utilizadas, a (o) _____ pode causar efeitos colaterais como tremores, ansiedade, náuseas, hemorragia cerebral, aumento do consumo de oxigênio, insuficiência renal, isquemia de extremidades ou visceral, aumento da resistência vascular pulmonar, bradicardia reflexa em doses elevadas, cefaleia, arritmia e necrose de pele em casos de extravasamento.

Preencha a lacuna corretamente e, a seguir, assinale a alternativa correta.

- a) Dopamina
- b) Dobutamina
- c) Nitroprussiato de sódio
- d) Codeína
- e) Noradrenalina

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

643. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando os meios de contrastes utilizados em procedimentos de imagem para visualização do sistema cardiovascular, assinale a alternativa incorreta:

- a) Utiliza-se o contraste iodado, e não o meio de contraste a base de bário, em procedimentos para visualização do sistema cardiovascular
- b) A injeção do contraste ocorre durante a realização dos procedimentos
- c) Somente poderá ser injetado o contraste com a presença da equipe médica
- d) O risco de reação alérgica aos contrastes iodados é pequeno em relação a quantidade de procedimentos realizados
- e) O contraste iônico é o único utilizado em procedimentos de imagem para visualização do sistema cardiovascular, pois apresenta menor risco de reação alérgica do que o não iônico

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

644. (IBFC/2016/EBSERH)

A reação anafilática é situação de absoluta emergência, tendo como objetivo do tratamento a manutenção da oxigenação e a perfusão de órgãos vitais. A droga de escolha e que deve ser imediatamente administrada é:

- a) Noradrenalina, por via endovenosa.
- b) Atropina, por via intramuscular ou subcutânea.
- c) Antihistamínico, por via intramuscular.
- d) Adrenalina, por via intramuscular ou subcutânea.
- e) Dobutamina, por via endovenosa.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

645. (INSTITUTO AOC/2015/EBSERH)

Na classificação dos psicofármacos, quais são os psicotrópicos?

- a) Sedativos-hipnóticos.
- b) Psicoestimulantes, biotrópicos.
- c) antiepiléticos.
- d) sedativos ansiolíticos, antipsicóticos, antidepressivos.
- e) Anti-inflamatórios.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

646. (AOC/2015/EBSERH)

No tratamento do infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST são utilizados diferentes tipos de drogas. Sobre estas drogas, é correto afirmar que o/a:

- a) morfina e nitratos são drogas psicoativas que causam analgesia.
- b) enoxaparina e heparina não-fractionada são fibrinolíticos.
- c) propranolol e metoprolol são bloqueadores dos canais de cálcio.
- d) ácido acetilsalicílico e derivados tienopiridínicos são antiplaquetários.
- e) fenilalquilaminas e benzoazepínicos são betabloqueadores.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

647. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Opióides são medicamentos usados quando o paciente oncológico apresenta dores de forte intensidade. É comum essas medicações causarem reações indesejadas, as quais devem ser conhecidas pelo enfermeiro para que ele possa avaliar a necessidade dos cuidados em cada caso. São efeitos colaterais esperados no uso de opióides:

- a) constipação e hipertensão.
- b) emese e hipertermia.
- c) depressão respiratória e prurido.
- d) hematêmese e vertigem.
- e) obstipação e hipertensão.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

648. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O extravasamento, quando ocorrido, acontece por administração não intencional de medicamentos ou soluções vesicantes. Medicamentos vesicantes são aqueles que:

- a) provocam irritação leve, com formação de vesículas, causando danos funcionais, alterações neurológicas e corporais, e perda da confiança no profissional de saúde.
- b) provocam irritações leves, causando pequenos danos funcionais, alterações neurológicas e corporais, e perda da confiança no profissional de saúde.
- c) causam danos ao paciente, como alterações neurológicas e corporais, trazendo grande abalo emocional e levando à perda da confiança no profissional de saúde.
- d) provocam irritação severa, com formação de vesículas e subsequente necrose tecidual, causando danos funcionais, alterações neurológicas e corporais, e perda da confiança no profissional de saúde.
- e) provocam vermelhidão intensa, dor e possível formação de vesículas subsequentes e necrose tecidual causada alterações motoras do membro punccionado

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

649. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu, nesta quarta-feira, que a resistência a antibióticos deixou de ser uma ameaça e se tornou uma realidade na saúde pública global. A afirmação está em um novo relatório, o primeiro elaborado pela entidade sobre a escala mundial do problema. Segundo a OMS, a resistência a antibióticos acontece “em cada região do mundo e afeta a todos, independentemente da idade ou país de origem”.

(<http://veja.abril.com.br/noticia/saude/oms-aler-ta-para-impacto-da-resistencia-a-antibioticos-sobre-saude-global>. 30/04/2014)

Com relação à temática da resistência bacteriana aos antibióticos, assinale a alternativa correta.

- a) Os antibióticos podem ser considerados um dos pilares da saúde mundial e uma forma de fazer com que as pessoas vivam saudáveis por mais tempo. Porém, o uso inapropriado desses medicamentos os tornou praticamente ineficazes em alguns casos.
- b) O mundo caminha para uma era pós-antibiótico na qual infecções correntes e feridas menores poderão ser curadas com facilidade, sem incorrer em risco de morte, restando aos profissionais e autoridades de saúde a preocupação com as superinfecções.
- c) A resistência aos antibióticos está relacionada à utilização de antibióticos inadequados para cada infecção e não ao tempo de uso de tal medicamento.
- d) O acompanhamento e a vigilância de casos envolvendo superbactérias tem se mostrado instrumentos eficientes no controle das infecções, dispensando quaisquer outras medidas mais dispendiosas.
- e) A bactéria *Staphylococcus epidermidis*, encontrada na pele e responsável principalmente por Infecções de pele, foi a primeira a apresentar resistência à penicilina, em 1950.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

650. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Qual é, dentre as alternativas a seguir, o medicamento que deve ser suspenso antes do cateterismo cardíaco?

- a) AAS.
- b) Clopidogrel.
- c) Sinvastatina.
- d) Atenolol.
- e) Rivaroxabana.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

651. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Quais são os cuidados que o profissional de enfermagem deve ter ao administrar a droga nitroprussiato de sódio?

- a) Administrar em soro fisiológico 0,9%, em 50 ml, em 1 hora.
- b) Controlar rigorosamente o gotejamento em bomba de infusão.
- c) Administrar intravenosa em bólus.
- d) Administrar intramuscular em região no músculo deltoide.
- e) Administrar intramuscular na região do glúteo.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

652. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Os medicamentos neurolépticos que mais provocam efeitos extrapiramidais são os grupos das fenotiazidas e o haloperidol. Os efeitos colaterais desses medicamentos especificamente podem ser evitados com medicamentos de forte ação anticolinérgica, como :

- a) carbonato de lítio e ácido valproico.
- b) carbamazepina e clorpromazina.
- c) prometazina e biperideno.
- d) levomepromazina e trifluoperazina.
- e) imipramina e olanzapina.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

653. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O medicamento Dissulfiram é utilizado no tratamento de alcoolismo. Dentre os efeitos colaterais esperados deste medicamento, incluem-se:

- a) dores no peito, calafrios e hipertensão.
- b) pulso lento, calafrios e excitação.
- c) pulso lento, frequência respiratória lenta e hipertensão.
- d) dores no peito, cefaleia e hipotensão.
- e) pulso acelerado, calafrios e dores no peito.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

654. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O principal mecanismo de ação da heparina administrada a um indivíduo consiste na inibição da transformação da protrombina em trombina, que converte o fibrinogênio em fibrina. Esse efeito é resultado da fusão das moléculas da heparina com as moléculas de uma proteína conhecida como:

- a) tromboplastina II.
- b) antiplasmina.
- c) plasmina.
- d) protamina.
- e) antitrombina III.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

655. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Para potencializar os efeitos do potássio na parada instantânea das atividades elétrica e mecânica do miocárdio, algumas soluções cardioplégicas são acrescentadas de:

- a) cloro.
- b) magnésio.
- c) fósforo.
- d) albumina.
- e) heparina.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

656. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A otimização da perfusão depende de uma série de fatores, alguns dos quais estão relacionados à composição do perfusato. Dentre os componentes habituais do perfusato, um parece também contribuir para a remoção dos radicais livres formados no período da reperfusão, após o desclameamento aórtico. Esse componente é:

- a) a glicose.
- b) o manitol.
- c) o bicarbonato de sódio.
- d) a heparina.
- e) a albumina.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

657. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Na circulação extracorpórea convencional, observou-se que um nível plasmático de heparina de 3 UI/ml correspondeu ao TCA mínimo de 300 segundos e não mostrou evidências de trombose.

Devido às variações na velocidade do metabolismo e da eliminação da heparina, recomenda-se que, durante a CEC, seja mantido um TCA mínimo de:

- a) 150 a 300 segundos.
- b) 400 a 600 segundos.
- c) 100 segundos.
- d) 200 a 300 segundos.
- e) até 180 segundos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

658. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A administração da protamina para a neutralização da heparina, em certos pacientes, pode determinar o aparecimento de diversas reações. O fator mais importante para o desenvolvimento das reações hemodinâmicas em seguida à administração da protamina é:

- a) a dose da protamina.
- b) a velocidade da infusão.
- c) o local da infusão.
- d) o tipo de heparina.
- e) o tipo de protamina.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

659. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

De acordo com as diretrizes do American College of Cardiology e da American Heart Association, a anticoagulação oral crônica é indicada para a prevenção e tratamento de:

- a) todos os casos de miocardiopatia dilatada
- b) todos os casos de estenose mitral.
- c) pacientes em uso de próteses valvulares biológicas (primeiros dois anos).
- d) pacientes em uso de próteses valvulares metálicas.
- e) infarto agudo do miocárdio lateral extenso.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

660. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Acerca da anticoagulação oral crônica (AOC) nas DCV, assinale a alternativa correta.

- a) O maior risco da AOC é a hemorragia, que pode atingir mais do que 15% dos pacientes.
- b) Pacientes com prótese valvar cardíaca têm um risco menor de eventos hemorrágicos induzidos pela AOC.

c) A estabilidade da AOC com drogas cumarínicas é notória não exige um controle laboratorial frequente.

d) O controle laboratorial da AOC é feito com a RNI (Relação Normalizada Internacional), derivada do TTPa.

e) A monitoração laboratorial da AOC deve ser feita com a RNI em todos os pacientes anticoagulados oralmente, mesmo nos pacientes em uso dos novos anticoagulantes orais (Rivaroxabana, por exemplo)

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

661. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Em relação aos novos anticoagulantes orais usados para profilaxia ou tratamento do tromboembolismo venoso (TEV), assinale a alternativa correta.

a) A Ximelagatrana é um dos anticoagulantes novos mais seguros, mormente por seu metabolismo hepático.

b) A Rivaroxabana é um inibidor direto do fator X ativado, útil na profilaxia e no tratamento do TEV.

c) A Dabigatrana é um inibidor indireto da trombina, usado, por via oral, na profilaxia do TEV.

d) A Ximelagatrana é mais segura e eficaz do que a heparinização plena em cirurgias maiores de quadril e joelho.

e) A Rivaroxabana é inferior, em segurança e eficácia, à terapia plena com Enoxaparina, em todos os cenários clínicos ou cirúrgicos já estudados.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

662. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Embora sejam formulados para prevenir, aliviar e curar enfermidades, os produtos farmacêuticos podem produzir efeitos indesejáveis, assim, para proteger as populações de danos causados por produtos comercializados, por meio da identificação precoce do risco e intervenção oportuna, é necessário:

- a) similaridade farmacêutica.
- b) critérios de legitimidade.
- c) consultoria de órgãos particulares.
- d) farmacovigilância.
- e) estocagem de produtos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

663. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Compete à Anvisa avaliar o cumprimento, de caráter jurídico-administrativo e técnico-científico, de critérios relacionados à eficácia, à segurança e à qualidade de medicamentos. Sendo o instrumento indispensável para introdução de um medicamento no mercado para comercialização e consumo:

- a) o registro de medicamento.
- b) a fisiodisponibilidade do medicamento.
- c) a consulta internacional de medicamentos.
- d) a averiguação de inspeção farmacêutica.
- e) a certificação Internacional de Controle de frequência do medicamento.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

664. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Um avanço no uso indiscriminado de antimicrobianos foi a aprovação da ANVISA de normatização para a venda de antibióticos no Brasil. Assim, a receita de medicamentos antimicrobianos é válida em todo o território nacional por:

- a) 05 (cinco) dias a contar da data de sua emissão.
- b) 15 (quinze) dias a contar da data de sua emissão.
- c) 10 (dez) dias a contar da data de sua emissão.
- d) 20 (vinte) dias a contar da data de sua emissão.
- e) 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

665. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Os medicamentos não são bens de consumo comuns e, sim, bens de saúde, por isso sua propaganda está sujeita a regras específicas. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Gases medicinais e medicamentos homeopáticos não estão sujeitos à regulamentação de propaganda e publicidade de acordo com as normas da ANVISA.
- b) A propaganda ou publicidade de medicamentos não registrados pela Anvisa pode ser realizada em jornais e revistas.

c) Nem todas as informações veiculadas na propaganda de medicamentos devem ser comprovadas cientificamente.

d) Anunciar promoções como “leve 3 pague 2” para medicamentos é permitido.

e) É permitido às drogarias divulgar os preços de medicamentos.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

666. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Assinale a alternativa que apresenta o medicamento que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículo, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca.

- a) Medicamento inspecionado.
- b) Medicamento controlado.
- c) Medicamento de referência.
- d) Medicamento similar
- e) Medicamento padrão.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Saúde Mental

667. (IBFC/2017/EBSERH)

Demência é conceituada como síndrome, geralmente crônica e progressiva, devido a uma patologia encefálica, de caráter adquirido, na qual se verificam diversas deficiências das funções corticais superiores.

Sobre este assunto, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. A consciência é afetada e as deficiências cognitivas não são acompanhadas por deterioração do controle emocional, da conduta social ou da motivação.

II. Pode estar associada a inúmeras doenças que atingem primária ou secundariamente o cérebro, entre elas, epilepsia, alcoolismo, degeneração hepatolenticular, hipotireoidismo adquirido, lúpus eritematoso sistêmico, tripanosomiase, intoxicações, doenças pelo HIV, doença de Huntington, doença de Parkinson, ocorrência de infartos múltiplos, outras doenças vasculares cerebrais isquêmicas e contusões cerebrais repetidas, como as sofridas pelos boxeadores.

III. Quadros de demência têm sido encontrados em trauma crânio-encefálico (TCE) e pelos efeitos da exposição ocupacional às seguintes substâncias químicas tóxicas como substâncias asfiantes: monóxido de carbono (CO) e sulfeto de hidrogênio (H₂S); e em metais pesados como manganês, mercúrio, chumbo e arsênio.

IV. Na demência se verificam diversas deficiências entre elas a memória, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, capacidade de aprender, linguagem e julgamento.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV
- b) I, III e IV, apenas
- c) II, III e IV, apenas
- d) I e II, apenas
- e) II e IV, apenas
- c) Medicamento de referência.
- d) Medicamento similar
- e) Medicamento padrão.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

668. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSEH)

A avaliação cognitiva deve fazer parte da avaliação clínica das pessoas idosas, pois auxilia na identificação das principais alterações na saúde mental.

Uma das escalas mais comuns para avaliar o estado cognitivo, por sua rapidez e facilidade de aplicação, é o:

- a) mini exame do estado mental.
- b) mini exame da memória intacta.
- c) mini exame cognitivo.
- d) mini exame neurológico.
- e) mini exame da idade adulta.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

669. (IBFC/2016/EBSEH)

O diagnóstico de episódio depressivo requer a presença de pelo menos cinco sintomas entre alguns considerados característicos. Assinale aquele que não se inclui entre esses sintomas:

- a) Diminuição da capacidade de pensar e de se concentrar
- b) Crises agudas de medo
- c) Humor triste
- d) Fadiga
- e) Agitação

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

670. (IBFC/2016/EBSEH)

Caracterizam-se por humor triste, perda do interesse e prazer nas atividades cotidianas, sendo comum uma sensação de fadiga aumentada. O paciente pode se queixar de dificuldade de concentração, pode apresentar baixa autoestima e autoconfiança, desesperança, ideias de culpa e inutilidade; visões desoladas e pessimistas do futuro, ideias ou atos suicidas. Assinale a alteração de saúde mental que melhor corresponde à descrição acima:

- a) Transtorno da ansiedade
- b) Síndrome de pânico
- c) Disfunção cognitiva leve
- d) Depressão
- e) Demência

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

671. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSEH)

Uma técnica de enfermagem, 51 anos e casada, de um hospital de grande porte, há mais de 15 anos, muito dedicada e envolvida com a instituição e com os pacientes durante a assistência direta, atualmente, demonstra desinteresse pelo trabalho e insensibilidade emocional frente às situações vivenciadas pelos seus pacientes. Com base nesse caso, qual é o transtorno mental relacionado ao trabalho que essa técnica pode estar apresentado?

- a) Depressão.
- b) Síndrome de Burnout.
- c) Transtorno Bipolar.
- d) Esquizofrenia.
- e) Sofrimento mental.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

672. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Paciente feminina, 17 anos, foi levada pela mãe ao serviço de saúde. A mãe refere que a filha está muito magra e que não está se alimentando direito, evita se alimentar, não come nenhum alimento calórico e exagera nas atividades físicas. Ultimamente, começou a usar roupas muito largas e escondeu todos os espelhos da casa. De acordo com o enunciado, o que a paciente poderia estar apresentando?

- a) Um quadro de anorexia.
- b) Um quadro de bulimia.
- c) Um quadro de esquizofrenia.
- d) Um quadro de confusão mental.
- e) Um quadro de transtorno do pânico.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

673. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Durante o atendimento a um paciente, a equipe de saúde realizou a seguinte conduta: protegeu a cabeça do paciente, manteve-o em decúbito dorsal com a cabeça lateralizada e protegida, afrouxou as roupas, principalmente em torno do pescoço, e monitorou os sinais vitais. De acordo com a conduta apresentada, qual é o quadro desse paciente?

- a) Edema agudo de pulmão.
- b) Derrame pleural.
- c) Infarto agudo do miocárdio.
- d) Acidente vascular cerebral.
- e) Epilepsia.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

674. (IBFC/2016/EBSERH)

Os transtornos mentais são classificados conforme a existência de um conjunto de sintomas psíquicos ou alterações no comportamento, que, em geral, estão associadas a grande sofrimento psicológico e prejuízos no desempenho social e ocupacional da pessoa. É um exemplo de transtorno orgânico mental:

- a) Pânico
- b) Personalidade
- c) Demência
- d) Ansiedade Generalizada
- e) Intoxicação por álcool e outras drogas psicoativas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

675. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Paciente feminino, 05 meses, é admitida na UTI pediátrica com diagnóstico de microcefalia, apresentando Perímetro Cefálico (PC) menor que dois (2) desvios-padrão (DP) do que a referência para a idade e história de infecção materna pelo vírus Zika durante a gestação. Assim, o enfermeiro deve estar atento às principais complicações que podem estar relacionadas à microcefalia, considerando:

- a) coordenação e equilíbrio otimizados.
- b) função neurológica, motora e sensorial aprimorada.
- c) acromegalia.
- d) estrutura facial e cefálica aumentada.
- e) déficit no desenvolvimento cognitivo, motor e fala.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

676. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Paciente masculino chega ao serviço de Emergência Psiquiátrica com história de uso de bebidas alcoólicas há mais de 30 anos, com suspensão do uso há 24 horas, apresentando confusão, agitação e sudorese intensa. Está irritado e com alucinações visuais. Esse pode ser um sinal de:

- a) comportamento violento.
- b) embriaguez.
- c) transtorno bipolar.
- d) delirium tremens.
- e) transtorno obsessivo compulsivo.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

677. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Paciente dá entrada no setor de emergência, com histórico de transtorno mental, confuso, agitado e agressivo. Não aceita a medicação há uma semana. Discute-se a necessidade de contenção terapêutica. Sobre essa técnica, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Previne eventos como quedas, ferimentos e deslocamentos de dispositivos como sondas, cateteres e drenos.
- b) Pode ser indicada em alguns casos especificamente para preservar a integridade física do paciente e da equipe.
- c) Pode ser feita com cordas, esparadrapos e cadarços, amarrando bem para evitar fuga e risco de agressão contra a equipe médica e de enfermagem.

d) Deve ser usada, em último recurso, no manejo de episódios de agressividade.

e) Manter a intervenção verbal antes, durante e após o processo de contenção.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

678. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Acerca das práticas em Saúde Mental na Atenção Básica, assinale a alternativa correta.

a) O que unifica o objetivo dos Profissionais para o cuidado em Saúde Mental é o entendimento do território em que atua, apenas.

b) O que unifica o objetivo dos Profissionais para o cuidado em Saúde Mental é unicamente a relação de vínculo da equipe de Saúde com os usuários.

c) O que unifica o objetivo dos Profissionais para o cuidado em Saúde Mental é primordialmente a escolha entre uma das diferentes compreensões sobre a saúde mental que uma equipe venha a se identificar.

d) A Saúde Mental não faz parte dos Protocolos da Atenção Básica no Brasil, sendo uma especialidade médica.

e) As práticas em Saúde Mental na Atenção Básica podem e devem ser realizadas por todos os Profissionais de Saúde.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

679. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Em relação às práticas da Saúde Mental, é uma ação que pode ser realizada por todos os profissionais da Atenção Básica, nos mais diversos dispositivos de cuidado:

a) não proporcionar ao usuário um momento para pensar/refletir, o que só perturbaria a sua saúde mental.

b) lembrar-se de não escutar o que o usuário precisa dizer, já que é irrelevante o que se diz enquanto doente.

c) oferecer suporte na medida certa, ou seja, uma medida que não torne o usuário dependente do mesmo.

d) oferecer suporte na medida certa, ou seja, uma medida que gere no profissional uma sobrecarga.

e) não acolher o usuário e suas queixas emocionais como legítimas antes de uma análise demorada.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

680. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

É um fator de risco para saúde mental de crianças e adolescentes no domínio da Escola:

a) o atraso escolar.

b) o cuidado parental inconsistente.

c) a discórdia familiar excessiva.

d) a ausência abrupta de membro da família.

e) pais/cuidadores com transtorno mental.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

681. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

É um fator protetor para saúde mental de crianças e adolescentes no domínio da Comunidade:

a) o desenvolvimento físico apropriado à idade.

b) a exposição à violência.

c) experiências culturais positivas.

d) a falta de senso de pertencimento.

e) condições socioeconômicas desfavoráveis.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

682. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Acerca da Atenção Básica em Saúde Mental, é uma regra da Terapia Comunitária:

a) respeitar quem está falando, interrompendo o interlocutor com frequência para corrigi-lo.

b) dar aconselhamento, discursar ou dar sermões, pois são condutas sempre bem-vindas.

c) jamais utilizar músicas, mesmo que tenham a ver com o tema escolhido, bem como piadas, histórias e provérbios relacionados.

d) preservar segredo do que é exposto na TC apenas em comunidades violentas.

e) falar da própria história, utilizando a 1ª pessoa do singular eu.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

683. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Na abordagem medicamentosa em paciente adulto com crise convulsiva com duração superior a 05 minutos, deve-se utilizar, preferencialmente:

- a) midazolam intramuscular 30 mg, repetir a cada 10 minutos.
- b) diazepam 10 mg intravenoso lento (1 a 2 mg/min) até o controle da crise.
- c) glicose 50% em bólus se glicemia menor que 90 mg/dl.
- d) prometazina 25 mg, um comprimido sublingual a cada 20 minutos.
- e) clorpromazina 75 mg associado a fenobarbital 10 mg intravenoso lento.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

684. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Nise da Silveira (1946) recusou-se a usar o arsenal terapêutico da época (como eletrochoque, choque coma insulínico e tratamentos cirúrgicos), pois considerava muito agressivo. Em seu lugar ela optou por usar a:

- a) psicoterapia.
- b) pedagogia hospitalar.
- c) terapia ocupacional.
- d) terapia cognitiva.
- e) terapia mística.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

685. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Segundo Mello (2008), além do papel de enfermeiro psiquiátrico e de saúde mental, o profissional, de enfermagem exerce outras funções dentro do plano de tratamento. São funções do profissional de enfermagem, exceto:

- a) conselheiro.
- b) professor.
- c) psicólogo .
- d) técnico.
- e) terapeuta.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

686. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Conforme Townsend (2002), existem mitos e fatos sobre a prática de suicídio. É correto afirmar como fato que:

- a) as pessoas que falam em suicídio não o cometem.
- b) as pessoas que querem se matar só apresentam tendências suicidas por um período limitado. Caso se recuperem dos sentimentos de autodestruição, elas passam a levar uma vida normal.
- c) todos os indivíduos suicidas são doentes mentais, e o suicídio é o ato de uma pessoa psicótica.
- d) não se pode impedir uma pessoa de cometer suicídio, pois sua mente está voltada para morrer.
- e) as pessoas geralmente cometem suicídio tomando uma dose excessiva de drogas.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

687. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Um paciente esquizofrênico, que começou a tomar Haloperidol há 1 semana apresenta agora movimentos espasmódicos do pescoço e da boca. Esses são sinais de:

- a) distonia.
- b) mania.
- c) acatisia.
- d) parkinsonismo.
- e) anedonia.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

688. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Em um paciente que tenha predisposição ao transtorno bipolar, um episódio bipolar pode ser desencadeado por:

- a) ciclotimia.
- b) hipertireoidismo.
- c) hipotireoidismo.
- d) droga antimaníaca.
- e) drogas anticonvulsivantes.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

689. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Um paciente com história de ataques de pânico relata que se sente preso após um ataque. Ele teme muito provavelmente a perda:

- a) da maturidade.
- b) do controle.
- c) da memória.
- d) da identidade.
- e) da tranquilidade.

690. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Conforme MELLO (2008), o conceito de Saúde Mental considera o contexto de tempo e espaço, a capacidade de adaptação ao meio ambiente, com pessoas recorrendo a mecanismos de defesa saudios e buscando soluções satisfatórias para suas dificuldades. O indivíduo considerado mentalmente saudável costuma possuir habilidades, como:

- a) engajar-se em pensamentos de ações dependentes.
- b) exibir certo domínio sobre o ambiente.
- c) obter uma visão pacificadora sobre a vida.
- d) perceber a realidade de forma individual e coletiva.
- e) aceitar as qualidades e não aceitar as limitações.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

691. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
A técnica de contenção mecânica é um procedimento muito utilizado pela equipe de enfermagem para pacientes em quadro de agitação psicomotora. Para tal procedimento, necessita-se seguir o(s) seguinte(s) passo(s):

- a) Colocar paciente em uma cama Fowler com grades laterais/faixas de contenção/lençóis e cobertores.
- b) Reunir 3 elementos da equipe de enfermagem e formar um círculo em volta do paciente.
- c) O líder do grupo deve abordar o paciente na tentativa de acalmá-lo. Em momento oportuno, sinalizar aos demais da equipe para realizarem a mobilização (segurarem o paciente).
- d) Em qualquer situação de paciente agitado, deve-se realizar contenção nos pulsos, tornozelos, braços e tórax.
- e) Não deve-se utilizar o reforço de contenção em coxas, pois devido à agitação poderá causar traumas ao paciente.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

692. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Sensações de um estado semelhante a um sonho, ou de ser um observador distante, ocorrem tipicamente:

- a) na fuga dissociativa.
- b) na amnésia dissociativa.
- c) no transtorno de despersonalização.
- d) no transtorno dissociativo da identidade.
- e) no estresse e trauma extremos.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

693. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Em âmbito internacional, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reuniu, em 1990, um conjunto de entidades, juristas e parlamentares da América Latina, dos Estados Unidos da América (EUA) e da Espanha para discutir a atenção à saúde mental. O resultado é o que se chamou de:

- a) Declaração de Caracas.
- b) Declaração dos Direitos Humanos.
- c) Declaração do pacto José da Costa Rica.
- d) Declaração de Alma Ata.
- e) Declaração Dorgival Dantas.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

694. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Entende-se como Serviços Residenciais Terapêuticos as moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na comunidade, destinadas a cuidar dos:

- a) pacientes desprovidos de aposentadoria egressos de internações psiquiátricas.
- b) pacientes de longa permanência egressos de internações psiquiátricas.
- c) pacientes jovens abandonados pelos pais egressos de internações psiquiátricas.
- d) pacientes portadores de deficiência física egressos de internações psiquiátricas.
- e) pacientes idosos abandonados pela família egressos de internações psiquiátricas.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

695. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Se um paciente com transtorno de personalidade dependente relatar queixas físicas, o profissional de enfermagem deve:

- a) desconsiderar os sintomas.
- b) encorajá-lo a falar sobre os sintomas.
- c) desconsiderar os sintomas até que as questões emocionais tenham sido exploradas.
- d) ouvir os sintomas de forma restritiva.
- e) explorar os sintomas de maneira direta.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

696. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Nos termos da Portaria/GM nº 336, de 19 de fevereiro de 2002. Os Serviços Substitutivos passaram a ser categorizados por porte e clientela. Em relação a esses serviços, podemos classificá-los como:

- a) CAPS I, CAPS II, CAPS III e Ambulatório.
- b) CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi e CAPSad.
- c) CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSad e CAPSf.
- d) CAPSi e CAPSad, Emergência Psiquiátrica e Ambulatório de psiquiatria.
- e) CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSIV e CAPSV.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

697. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
A complicação mais grave da anorexia nervosa é:

- a) o alto risco de mortalidade.
- b) uma depressão coexistente.
- c) a má relação familiar.
- d) o isolamento social.
- e) a ideiação suicida passiva.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

698. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Quanto ao ambiente de recuperação da experiência traumática, segundo Green, Wilson e Lindy (1985), é correto afirmar que dentre as variáveis ambientais inclui-se:

- a) a eficácia dos recursos adaptativos.
- b) o fator demográfico.
- c) o grau de coesão e proteção de familiares e amigos.
- d) o desenvolvimento psicossocial.
- e) a hipervigilância.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

699. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Philippe Pinel (1745-1826) foi fundamental na mudança do estatuto do louco e autor de uma obra original, relatando que a ideia de loucura seria uma doença passiva de tratamento e cura. Essa ideia partiu de seus estudos sobre:

- a) mania do inconsciente.
- b) mania escrófala.
- c) mania degenerescente.
- d) mania e melancolia.
- e) mania intermitente.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

700. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Tendo em vista a criação de uma escola para formar enfermeiros psiquiátricos, o Governo provisório da República (1842) mandou buscar profissionais de enfermagem de origem:

- a) francesa.
- b) portuguesa.
- c) italiana.
- d) japonesa.
- e) mexicana.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Fisiologia

701. (IBFC/2017/EBSERH)

O sistema hematopoiético constitui um complexo formado pela medula óssea e outros órgãos hemoformadores e pelo sangue. Sobre este assunto, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.


I. Entre os agentes hematotóxicos de menor interesse para a saúde do trabalhador são o benzeno e as radiações ionizantes, por acarretarem raros casos de doença no sangue.

II. Os valores de referência de hematologia em adultos normais, considera 13-18g/dl de hemoglobina para homem e 12-16g/dl para mulher.

III. Os valores de referência de hematologia em adultos normais, considera 40-52% hematócrito para homem e 35-47% para mulher.

IV. A análise desses valores deve levar em conta as variações interindividuais, como idade, sexo, etnia, raça, altitude, temperatura ambiental, condições socioeconômicas e intra-individuais, como a hora do dia, exercício físico, tabagismo, uso de medicamentos, entre outros fatores. Eles apresentam uma distribuição gaussiana na população, sendo que 2,5% dos normais estarão abaixo e acima desses limites.

- a) I, II, III e IV
- b) II, III e IV, apenas
- c) I, III e IV, apenas
- d) I e II, apenas
- e) II e III, apenas



702. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Assinale a alternativa que apresenta os valores pressóricos que devem ser considerados para classificar a pressão arterial em normotensa, pressão arterial limítrofe e hipertensão arterial sistêmica (estágio 1).


a) Normotensa: PAS < 130mmHg/ PAD < 85mmHg ; Limítrofe: PAS = 130 – 139mmHg/ PAD = 85 – 89 mmHg; hipertensão arterial sistêmica (estágio 1): PAS=140–159mmHg/PAD= 90 – 99 mmHg.

b) Normotensa: PAS < 150 mmHg/ PAD < 70mmHg; Limítrofe: PAS = 120 – 129 mmHg/ PAD=75 – 89 mmHg; Hipertensão Arterial Sistêmica (estágio 1): PAS= 139 – 159mmHg/ PAD = 95 – 110 mmHg.

c) Normotensa: PAS < 100mmHg/ PAD < 70mmHg; Limítrofe: PAS = 125 – 133mmHg/ PAD = 80 – 89 mmHg; Hipertensão Arterial Sistêmica (estágio 1): PAS = 140 – 159 mmHg/ PAD = 90 – 99 mmHg.

d) Normotensa: PAS < 110 mmHg/ PAD < 80 mmHg; Limítrofe: PAS = 130 – 139mmHg/ PAD = 85 – 89 mmHg; Hipertensão Arterial Sistêmica (estágio 1): PAS = 140 – 159 mmHg/ PAD = 90 – 99 mmHg.


e) Normotensa: PAS < 125mmHg/ PAD < 80 mmHg; Limítrofe: PAS = 130 – 139 mmHg/ PAD = 85 – 89 mmHg; Hipertensão Arterial Sistêmica (estágio 1): PAS = 140 – 159 mmHg/ PAD = 90 – 99 mmHg.



703. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Paciente do sexo masculino, 58 anos, deu entrada no serviço de saúde com diagnóstico de Trombose Venosa Profunda (TVP). Uma das principais complicações dessa patologia é:

- a) embolia pulmonar.
- b) anemia profunda.
- c) asma brônquica.
- d) doença pulmonar obstrutiva.
- e) síndrome da angústia respiratória.



704. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Paciente do sexo feminino, 19 anos, foi internada no serviço de saúde com o diagnóstico de Síndrome de Guillain-Barret. Sobre essa síndrome, é correto afirmar que:


a) é uma doença congênita caracterizada por um número reduzido de vértebras cervicais ou por múltiplas hemivértebras fundidas em uma massa óssea única.

b) é uma doença que ocorre quando o par de cromossomos X não é normal, podendo apresentar um cromossomo X ausente ou parcialmente ausente.

c) é uma doença descrita como uma tríade que consiste de hemangiomas capilares cutâneos, hipertrofia óssea e de tecidos moles e dilatações venosas.

d) é uma doença caracterizada por instalação aguda de alterações funcionais, envolvendo os nervos cranianos, espinhais e periféricos.

e) é uma reação alérgica grave, que causa lesão da pele, olhos e mucosas. É um tipo de hipersensibilidade mediada por complexos imunes.



705. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando o desenvolvimento humano durante a gestação, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() No 3º dia após a fertilização, o ovo com 16 ou mais blastômeros é denominado mórula e penetra na cavidade uterina.

() Com 28 semanas, quando o feto tem aproximadamente 1000 gramas, os pulmões estão suficientemente desenvolvidos, o que permite a sobrevivência do recém nascido pré-termo.

() Na 2ª semana, todos os principais órgãos e sistemas do corpo estão formados a partir das três camadas germinativas.

() Os movimentos fetais são originados entre 8 e 12 semanas de gestação. Entretanto, a mãe começa a perceber os movimentos fetais entre 16 e 20 semanas da gestação.

- a) F,F,V,F
- b) V,V,F,F
- c) V,F,F,V
- d) F,V,V,V
- e) V,V,F,V

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

706. (IBFC/2016/EBSEH)

O sistema nervoso simpático é responsável pela resposta ao estresse, relacionado à resposta para fuga de algum perigo, como agitação e fuga. Esse sistema regula os órgãos internos como:

- a) Contração da pupila
- b) Diminuição da frequência respiratória
- c) Diminuição da frequência cardíaca
- d) Inibição do peristaltismo
- e) Aumento do suco gástrico

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

707. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSEH)

Lesão da articulação causada por um movimento violento sem fraturas, porém causa muita dor e edema, necessitando de imobilização. Pode causar rompimento de vasos sanguíneos, tendões e ligamentos. O enunciado refere-se à:

- a) convulsão.
- b) infecção.
- c) luxação.
- d) fratura.
- e) entorse.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

708. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSEH)

A obesidade é um agravo multifatorial originado, na maioria dos casos, pelo desbalanço energético, quando o indivíduo consome mais energia do que gasta. Esse desbalanço energético positivo resulta em:

- a) ganho de peso.
- b) ganho de massa magra.
- c) ganho de proteína.
- d) ganho de minerais.
- e) ganho de albumina.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

709. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSEH)

Paciente de 80 anos, internado na UTI há 02 dias, apresenta sangramento digestivo baixo (sangramento pelo ânus) com presença de coágulos. Foi avaliado com sonda nasogástrica, cujo aspirado revelou bile clara. Seus sinais vitais estão estáveis. De acordo com o caso clínico, é correto afirmar que:

- a) deve ser realizada endoscopia.
- b) a causa mais provável é neoplasia do cólon.
- c) a causa mais provável é sangramento por divertículos.
- d) deve ser realizada colonoscopia.
- e) em caso de piora hemodinâmica deve ser solicitada tomografia computadorizada do abdômen para localizar o ponto de sangramento.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

710. (AOCP/2015/EBSEH)

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

O fluxo sanguíneo cerebral é _____ proporcional à pressão de perfusão cerebral e _____ proporcional à resistência vascular cerebral; e, considera-se que a pressão de perfusão cerebral é _____ à diferença entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana.

- a) igualmente / igualmente / igual
- b) diretamente / inversamente / diferente
- c) inversamente / diretamente / diferente
- d) diretamente / inversamente / igual
- e) inversamente / diretamente / igual

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

711. (AOC/2015/EBSERH)

Pacientes portadores de proteinúria nefrótica estão predispostos a ter qual das complicações a seguir?

- a) Desidratação.
- b) Litíase biliar.
- c) Trombose vascular.
- d) Glaucoma.
- e) Esterilidade masculina.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

712. (INSTITUTO AOC/2015/EBSERH)

A redução da viscosidade causada pela hemodiluição e o fluxo contínuo emitido pela bomba de roletes são os principais responsáveis pela hipotensão arterial no início da perfusão. A redução da viscosidade sanguínea e a indução da hipotermia estimulam o organismo a liberar:

- a) catecolaminas.
- b) serotonina.
- c) ocitocina.
- d) prostaglandina.
- e) progesterona.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

713. (INSTITUTO AOC/2015/EBSERH)

Paciente masculino com 65 anos de idade e 70 Kg está sendo submetido à revascularização do miocárdio. O oxigenador utilizado é o de membrana capilar. Após 40 minutos de perfusão, a temperatura nasofaríngea está em 34°C, o fluxo arterial é 4200 mL/min, o hematócrito é 24% e o resultado de gasometria arterial é o seguinte: pH 7,48 – PaCO₂ 23 mmHg – PaO₂ é 230 mmHg. Qual é a melhor conduta a ser adotada pelo perfusionista para elevar a PaCO₂?

- a) Aumentar o fluxo arterial.
- b) Reduzir o fluxo arterial.
- c) Aumentar o fluxo de gás.
- d) Reduzir o fluxo de gás.
- e) Adicionar sangue no reservatório.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

714. (INSTITUTO AOC/2015/EBSERH)

As proteínas se aderem à superfície dos oxigenadores e circuitos logo após o início da perfusão. A proteína que inicia o processo de aderir aos circuitos denomina-se:

- a) fibrinogênio.
- b) betaglobulina.
- c) miosina.
- d) colágeno.
- e) catecolamina.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

715. (INSTITUTO AOC/2015/EBSERH)

A passagem de oxigênio do gás instalado no oxigenador para o sangue, através da membrana microporosa dos oxigenadores depende:

- a) do fluxo arterial.
- b) da concentração do gás.
- c) do fluxo do gás.
- d) do hematócrito.
- e) do fluxo de água no trocador de calor.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

716. (INSTITUTO AOC/2015/EBSERH)

O distúrbio do equilíbrio ácido base que pode deprimir a contratilidade do miocárdio, causar depressão do tônus vascular e favorecer o aparecimento de arritmias dificultando a saída de circulação extracorpórea é a:

- a) acidose metabólica.
- b) alcalose metabólica.
- c) alcalose respiratória.
- d) acidose respiratória.
- e) alcalose mista.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

717. (INSTITUTO AOC/2015/EBSERH)

Após 90 minutos de perfusão, para uma cirurgia de troca valvar aórtica e revascularização do miocárdio, o nível do perfusado do oxigenador começa a diminuir rapidamente e o perfusionista necessita de mais volume para manter os parâmetros de perfusão. O paciente tem 75 anos e o hematócrito está em 20%. Nesse caso, a conduta do perfusionista deve ser adicionar:

- a) ringer lactato no reservatório.
- b) plasma fresco no reservatório.
- c) concentrado de hemácias no reservatório.
- d) heparina no reservatório.
- e) soro glicosado no reservatório.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

718. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A resposta inflamatória sistêmica do organismo ou estado inflamatório sistêmico é uma entidade clínica bem definida, que pode ocorrer em resposta a diversos tipos de agressões, inclusive durante a circulação extracorpórea. As proteínas que participam da resposta inflamatória são:

- a) sistema complemento, sistema cianótico e sistema de coagulação.
- b) sistema caliceína, sistema de coagulação e sistema cianótico.
- c) sistema caliceína, sistema complemento e sistema de coagulação.
- d) sistema complemento, sistema cinina e sistema de coagulação.
- e) sistema de coagulação e sistema caliceína.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

719. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Durante a perfusão, se um paciente mantém a pressão arterial elevada, sob um adequado plano anestésico, o procedimento mais adequado é:

- a) administrar diuréticos.
- b) administrar noradrenalina.
- c) aumentar o fluxo arterial.
- d) administrar vasodilatadores.
- e) abrir a recirculação do oxigenador.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

720. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A circulação extracorpórea (CEC), em um significado mais amplo, compreende o conjunto de máquinas, aparelhos, circuitos e técnicas mediante o qual se substitui temporariamente as funções de órgãos vitais. Considerando-se essa informação, conclui-se que:

- a) coração e rim estão excluídos da circulação.
- b) coração e pulmão estão excluídos da circulação normal.

c) as funções de oxigenação e bombeamento do indivíduo em CEC ocorrem internamente ao seu organismo.

d) as funções de oxigenação e bombeamento do indivíduo em CEC ocorrem simultaneamente ao seu organismo.

e) coração, pulmões e rins estão excluídos da circulação normal.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

721. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Na circulação normal, o sangue venoso chega ao átrio direito, segue para o ventrículo direito e é bombeado aos pulmões através da artéria pulmonar. Na circulação extracorpórea, o sangue venoso é desviado do coração e do pulmão por meio da canulação de qual vaso?

- a) Artéria pulmonar.
- b) Aorta descendente.
- c) Veias cavas superiores e inferiores.
- d) Aorta ascendente.
- e) Veias pulmonares.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

722. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O sangue, ao entrar em contato com outra superfície que não seja vasos ou superfícies internas do coração, inicia um processo de coagulação. Paciente, 48 anos, 80 Kg, será submetido à Revascularização do Miocárdio com CEC. Para iniciar a anticoagulação a fim de que o procedimento de circulação extracorpórea seja realizado, deverá ser feita uma dose de heparina, imediatamente antes da inserção das cânulas arterial e venosa, na dose de:

- a) 24000 a 32000 UI.
- b) 5000 a 15000 UI.
- c) 1000 a 5000 UI.
- d) 5000 a 18000 UI.
- e) 800 a 16000 UI.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

723. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A perfusão, com frequência, é acompanhada de dificuldades com a homeostasia e a coagulação, mesmo após a neutralização adequada da heparina administrada para o procedimento.

Qual é o percentual aceitável para uma coagulação adequada, após a circulação extracorpórea?

- a) 15 a 25 % do normal.
- b) 35 a 45 % do normal.
- c) 45 a 55 % do normal.
- d) 65 a 70 % do normal.
- e) 75 a 80 % do normal.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

724. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O reservatório arterial é o compartimento do oxigenador em que o sangue oxigenado e desborbulhado é coletado para reinfusão no paciente. Em relação a este componente da circulação extracorpórea, assinale a alternativa correta.

- a) É um elemento dispensável do circuito.
- b) É um elemento utilizado para auxiliar a oxigenação do sangue.
- c) É um elemento de segurança contra o bombeamento acidental de ar no sistema arterial do paciente.
- d) É um elemento que predispõe a maior produção de bolhas.
- e) É o compartimento mais interno dos oxigenadores concêntricos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

725. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O método de drenagem do sangue venoso de um paciente que é drenado pela linha venosa e coletado no reservatório venoso, é conhecido como:

- a) selagem.
- b) drenagem espontânea.
- c) drenagem anômala.
- d) sifagem.
- e) sifonagem.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

726. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Assim que se estabiliza a perfusão uma amostra do sangue arterial deve ser analisada e os valores do PO₂ e do PCO₂ indicarão a necessidade de alterações da ventilação do oxigenador. Os ajustes devem ser feitos em alterações na concentração de oxigênio e no fluxo do gás, nos limites que variam:

a) em torno de 5% na concentração de O₂ e em torno de 10% no fluxo do gás.

b) em torno de mais ou menos 10% na concentração de O₂ e em torno de 5% no fluxo do gás.

c) em torno de mais ou menos 20% na concentração de O₂ e em torno de 10% no fluxo do gás.

d) em torno de mais ou menos 10% na concentração de O₂ e em torno de 20% no fluxo do gás.

e) em torno de mais ou menos 10% na concentração de O₂ e em torno de 10% no fluxo do gás.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

727. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Após qualquer alteração na ventilação do oxigenador, os gases arteriais devem ser analisados. Relacione o resultado da gasometria com a conduta a ser tomada e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. PO₂ alta (acima de 200mmHg).
2. PO₂ baixa (abaixo de 100mmHg).
3. PCO₂ baixa (abaixo de 35 mmHg).
4. PCO₂ alta (acima de 40mmHg).

() Aumentar o fluxo do gás.

() Aumentar a FiO₂.

() Reduzir o fluxo do gás.

() Reduzir a FiO₂.

a) 1 – 2 – 3 – 4.

b) 4 – 3 – 2 – 1.

c) 1 – 3 – 2 – 4.

d) 4 – 1 – 3 – 2.

e) 4 – 2 – 3 – 1.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

728. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Em relação ao protocolo de heparinização durante a circulação extracorpórea, é correto afirmar que

a) recomenda-se administrar de 3 a 4 mg/Kg, como dose inicial de heparinização, após a determinação do TCA basal, para controle.

b) recomenda-se administrar doses de 10 mg/Kg, a cada hora de perfusão ou da administração da dose inicial.

Enfermagem em Central de Material Esterilizado

c) recomenda-se subtrair a heparina administrada ao paciente da heparina colocada no perfluato, para a neutralização, pela protamina, na proporção de 3:1.

d) recomenda-se controlar o TCA em intervalos fixos, durante a perfusão e ao seu final, que geralmente as equipes verificam de hora em hora.

e) a heparinização independe do peso do paciente e é recomendado 1000UI por hora.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

729. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A tonsilite apresenta as seguintes manifestações clínicas, que leva à indicação da Tonsilectomia:

a) Odinofagia; Febre; Rouquidão; Deglutição difícil.

b) Egofonia; Febre; Rouquidão; Deglutição difícil.

c) Pectorilóquia; Febre; Rouquidão; Deglutição difícil.

d) Rouquidão; Deglutição difícil; Pectorilóquia.

e) Egofonia; Febre; Rouquidão; Deglutição difícil; Pectorilóquia.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

730. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O reflexo oculoencefálico (movimento dos olhos de boneca) avalia:

a) confusão mental.

b) nível de consciência.

c) lesão cerebelar.

d) lesão em tronco cerebral.

e) lesão em base de crânio.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

731. (CESPE/2018/EBSERH)

No que se refere a tipos de processos de esterilização de produtos médico-hospitalares, julgue o item subsequente.

A limpeza prévia dos produtos médico-hospitalares deve ser rigorosa para garantir a eficácia da esterilização, independentemente do material e do método de esterilização.

c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

732. (CESPE/2018/EBSERH)

No que se refere a tipos de processos de esterilização de produtos médico-hospitalares, julgue o item subsequente.

O processo de esterilização por vapor saturado sob pressão é o mais utilizado em hospitais e o mais econômico para a esterilização de artigos termorresistentes.

c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

733. (CESPE/2018/EBSERH)

No que se refere a tipos de processos de esterilização de produtos médico-hospitalares, julgue o item subsequente.

A esterilização de pós e pomadas deve ser feita em estufas e em vapor saturado sob pressão (autoclaves).

c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

734. (IBFC/2017/EBSERH)

Um hospital adotou métodos de esterilização por calor seco e óxido de etileno. É correto afirmar que para esses dois tipos de métodos de esterilização devem ser utilizadas a(s) seguinte(s) embalagem(ns).

- a) Caixas metálicas.
- b) Não tecidos (SMS).
- c) Tecidos de algodão.
- d) Papel grau cirúrgico.
- e) Filmes.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

735. (IBFC/2017/EBSERH)

Assinale a alternativa correta que contemple um item que o sistema de climatização da área de limpeza do Centro de Material de Esterilização Classe II e da empresa processadora devem atender, além do disposto nas normatizações pertinentes.

- a) Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m³ /h/m² .
- b) Manter temperatura ambiente entre 22o e 28o C.
- c) Manter um diferencial de pressão positiva entre os ambientes adjacentes, com pressão diferencial mínima de 4,5 Pa.
- d) Não permitir exaustão forçada de todo ar da sala com descarga para o exterior da edificação.
- e) O ar de reposição não pode ser proveniente dos ambientes vizinhos.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

736. (IBFC/2017/EBSERH)

Assinale a alternativa correta que contemple um exemplo de artigo considerado crítico.

- a) Inaladores.
- b) Peças de mão de motores.
- c) Termômetro.
- d) Comadres.
- e) Baldes.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

737. (IBFC/2016/EBSERH)

Analise as alternativas abaixo e assinale a que apresenta um exemplo de material crítico.

- a) Aparelhos de cistoscopia.
- b) Válvulas de ambú com componentes metálicos.
- c) Termômetro.
- d) Comadres.
- e) Endoscópios do trato digestivo e respiratório.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

738. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre o teste de Bowie & Dick, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() Realizar o teste no último ciclo do dia da autoclave.

() Quando a mudança na coloração da folha for uniforme em toda a sua extensão, demonstrando não haver ar residual, o teste será considerado positivo (+).

() Deve-se colocar a folha teste no meio de uma pilha de campos de tecido com 25 a 28 cm de altura. Esta pilha pode ser embalada em tecido ou papel, podendo ser atada com fita adesiva.

() Iniciar o ciclo, que poderá ser interrompido antes da fase de secagem e após o tempo determinado pela temperatura.

- a) F,V,F,V
- b) V,V,V,V
- c) V,F,V,F
- d) F,F,V,V
- e) V,V,F,F

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

739. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre a monitorização dos processos de esterilização, assinale a alternativa que contemple um exemplo de meio biológico.

- a) Observação de pressão, tempo e temperatura.
- b) Teste de Bowie & Dick em autoclaves pré-vácuo.
- c) Integradores químicos.
- d) Indicadores na parte externa das embalagens.
- e) Testes biológicos.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

740. (IBFC/2016/EBSERH)

O Enfermeiro tem um papel fundamental na Central de Material e Esterilização (CME) e deve ter o conhecimento a respeito da compatibilidade de embalagens disponíveis no mercado e os métodos de esterilização. Para os métodos de vapor sob pressão e calor seco, são embalagens compatíveis, respectivamente:

- a) Tecido de algodão e caixa metálica.
- b) Papel grau cirúrgico e papel crepado.
- c) Filmes e Tyvek.
- d) Não tecido (SMS) e papel grau cirúrgico.
- e) Contêiner rígido e não tecido (SMS).

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

741. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre Centro de Material e Esterilização (CME), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() É um conjunto de áreas destinadas à recepção, limpeza, secagem, preparo, desinfecção ou esterilização, guarda e distribuição do material para as unidades do estabelecimento de saúde.

() Independentemente do seu tamanho, o CME deve estar separado em duas partes: a “suja” e a “limpa”.

() A sala de depósito de material de limpeza pode ser comum às áreas “sujas” e “limpas”, se o acesso a ele for interno.

() Em todas as áreas do CME devem estar disponíveis, além de pias para lavagem das mãos, dispensadores de solução alcoólica em gel a 70%.

- a) F,V,F,V
- b) V,V,V,V
- c) V,F,V,F
- d) V,V,F,V
- e) F,V,V,V

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

742. (IBFC/2016/EBSERH)

Para cumprimento da Resolução nº 15, de 15 de Março de 2012, do Ministério da Saúde, o Centro de Material e Esterilização (CME) passa a ser classificado em classes. O CME _____ é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa, passíveis de processamento. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Classe I.
- b) Classe II.
- c) Classe III.
- d) Classe IV.
- e) Classe V.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

743. (IBFC/2016/EBSERH)

Os indicadores biológicos (IB) para controlar ciclos de esterilização são preparações padronizadas de esporos bacterianos comprovadamente resistentes ao método que se propõe monitorar. É correto afirmar que o IB:

a) Apresenta menor custo em relação ao indicador químico.

b) É considerado um método tradicional e pioneiro no controle do sucesso da esterilização, sendo aceito consensualmente como padrão-ouro no controle de resultados de um ciclo de esterilização.

c) Não necessita de pacote-teste, podendo ser colocado nos pontos críticos dentro dos próprios pacotes e caixas instrumentais a serem esterilizados.

d) Não depende de tempo de incubação, nem de estufas com temperaturas controladas, permitindo leitura rápida.

e) Não é um método mais utilizado para controle de esterilização, sendo substituído pelo indicador químico.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

744. (IBFC/2016/EBSERH)

O enfermeiro é quem geralmente exerce a função de chefe do Centro de Material e Esterilização (CME). Sobre as funções do enfermeiro no CME, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. Planejar, coordenar e implementar rotinas para a realização dos processos de limpeza, preparo, esterilização, armazenagem e distribuição dos artigos.

II. Preparar as caixas de instrumental cirúrgico de acordo com a listagem padronizada.

III. Fazer a leitura dos indicadores biológicos conforme a rotina da instituição.

IV. Estabelecer um sistema de prevenção de riscos de trabalho.

- a) I e IV, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) I apenas
- d) I, II, III e IV
- e) I e III, apenas

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

745. (IBFC/2016/EBSERH)

A equipe de enfermagem do Centro de Material e Esterilização necessita esterilizar os materiais embalados em tecido de algodão. Assinale a alternativa que apresenta o método de esterilização ideal:

- a) Calor seco.
- b) Vapor sob pressão.
- c) Óxido de etileno.
- d) Plasma de peróxido de hidrogênio.
- e) Radiação ionizante.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

746. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre a Resolução nº 15, de 15 de Março de 2012, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

a) Produtos para saúde críticos produtos que entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente.

b) Desinfecção de alto nível é o processo físico ou químico que destrói microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies.

c) Desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.

d) Produtos para saúde não-críticos são produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, e sistema vascular, incluindo também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas.

e) Produtos para saúde semi-críticos produtos que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

747. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre Centro de Material e Esterilização (CME), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() É um conjunto de áreas destinadas à recepção, limpeza, secagem, preparo, desinfecção ou esterilização, guarda e distribuição do material para as unidades do estabelecimento de saúde.

() Independentemente do seu tamanho, o CME deve estar separado em duas partes: a “suja” e a “limpa”.

() A sala de depósito de material de limpeza pode ser comum às áreas “sujas” e “limpas”, se o acesso a ele for interno.

() Em todas as áreas do CME devem estar disponíveis, além de pias para lavagem das mãos, dispensadores de solução alcoólica em gel a 70%.

- a) V,F,V,F
- b) V,V,V,V
- c) F,V,F,V
- d) V,V,F,F
- e) V,V,V,F

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

748. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Ao verificar o material utilizado durante o procedimento cirúrgico, o técnico de enfermagem aponta como um dos instrumentos utilizados para diérese dos tecidos:

- a) a tesoura de Mayo curva.
- b) o afastador de Farabeuf.
- c) a pinça de Kocher.
- d) a pinça de Backaus.
- e) o porta agulhas de Hegar.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

749. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Compete especialmente ao Técnico de Enfermagem da Central de Material e Esterilização, exceto:

- a) preparar as caixas cirúrgicas.
- b) fazer listagem e encaminhamento de artigos e instrumental cirúrgico para conserto.

- c) atuar na coordenação do setor.
- d) monitorar cada lote ou carga nos processos de esterilização.
- e) fazer a leitura dos indicadores biológicos, de acordo com as rotinas da instituição.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

750. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 A lavadora ultrassônica é indicada principalmente para:

- a) esterilizar instrumentais delicados, como os bisturis com ponta de rubi.
- b) descontaminar instrumentais cirúrgicos cuja formatação seja menos complexa.
- c) esterilizar artigos de assistência respiratória.
- d) limpeza de instrumentais que possuem conformações complexas e lumes.
- e) realizar testes para avaliação do processo de limpeza de outras lavadoras.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

751. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Quanto ao método de esterilização tipo flash, assinale a alternativa correta:

- a) É um método que deve ser usado sempre que houver procedimento cirúrgico com dispositivos implantáveis.
- b) Neste método, para que haja eficiência na esterilização, os materiais devem ser empacotados em campo duplo.
- c) É um sistema de esterilização em baixa temperatura, usado em materiais intrincados e delicados.
- d) É um método usado em salas de cirurgias para atender uma necessidade urgente de esterilização.
- e) É o método rápido de esterilização por meio seco.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

752. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 Os materiais hospitalares, na sua maioria, têm uma associação importante com a infecção hospitalar e medidas eficazes devem ser estabelecidas no processamento destes artigos, visando minimizar o risco de infecção hospitalar. Entre os processos a seguir, assinale aquele que antecede a desinfecção e a esterilização:

- a) enxágue.
- b) limpeza.
- c) secagem.
- d) desencrostamento
- e) empacotamento.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

753. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 A unidade funcional destinada ao processamento de produtos para saúde dos serviços de saúde é:

- a) o centro de material e esterilização.
- b) a barreira técnica.
- c) o centro de controle de infecção.
- d) o consultório individual.
- e) o serviço de limpeza organizada.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

754. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 No processo de esterilização de materiais, o calor úmido, na forma de vapor saturado sob pressão, é o processo mais seguro, eficiente, rápido e econômico disponível. Utiliza-se para o processo de esterilização por calor úmido:

- a) estufa.
- b) álcool.
- c) autoclave.
- d) radiação.
- e) filtração.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

755. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 Central de Material de Esterilização é a área destinada à instalação de equipamentos utilizados para esterilização de materiais hospitalares. Os diferentes métodos usados são:

- a) métodos físicos, químicos e físico-químicos.
- b) métodos biológicos, geográficos e químicos.
- c) métodos históricos, químicos e físicos.
- d) métodos físicos, químicos e físicos-biológicos.
- e) métodos físicos químicos e biológicos.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

756. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A esterilização deve ser monitorizada para que se garanta que seu objetivo seja atingido. Quanto ao invólucro, exigem-se algumas características, como permeabilidade ao agente esterilizante, resistência ao calor, à tração e ao manuseio, impermeabilidade a partículas microscópicas e isenção de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos. Considerando os processos de esterilização a vapor e óxido de etileno, assinale a alternativa que apresenta invólucros que podem ser utilizados em ambos os processos.

- a) Algodão cru; papel grau cirúrgico.
- b) Papel crepado; papel grau cirúrgico.
- c) Papel kraft; papel crepado.
- d) Algodão cru; TNT.
- e) Algodão cru; papel crepado.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

757. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O controle de qualidade em saúde é um processo contínuo e se aplica a qualquer área implicada com a assistência, incluindo-se as Centrais de Esterilização. Tendo em vista a prevenção de infecções é importante a atualização dos profissionais envolvidos com o reprocessamento de materiais e o controle de infecção. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- a) O Teste de BOWIE & DICK testa a eficácia do sistema de vácuo da autoclave e pode ser utilizado indistintamente em autoclaves gravitacionais ou pré-vácuo.
- b) O indicador químico da classe Integrador controla temperatura e tempo do processo de esterilização.
- c) Tiras impregnadas com tinta termoquímica, que mudam de coloração quando expostas à temperatura, evidenciam a passagem do material pelo processo, com garantia da eficácia da esterilização.
- d) Indicadores biológicos são preparações padronizadas de microrganismos, comprovadamente resistentes e específicos para um particular processo de esterilização, a fim de demonstrar a efetividade do processo.
- e) Indicadores multiparamétricos controlam a temperatura, o tempo e a qualidade do vapor durante o processo de esterilização.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

758. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Os artigos de uso médico hospitalar podem ser classificados, de acordo com o risco e o potencial de contaminação, em:

- a) críticos, não críticos e contaminados.
- b) estéreis, não estéreis e contaminados.
- c) sujos, laváveis e não laváveis.
- d) críticos, não estéreis e semicríticos.
- e) críticos, não críticos e semicríticos.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Infecção Hospitalar

759. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item a seguir, referente a infecção hospitalar.

O programa de controle de infecção hospitalar compreende um conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de reduzir ao máximo possível a incidência de infecções hospitalares.

- c) CERTO
- e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

760. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item a seguir, referente a infecção hospitalar.

Apesar de altamente relevante, a existência de comissão de controle de infecção hospitalar em serviços de saúde é facultativa.

- c) CERTO
- e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

761. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item a seguir, referente a infecção hospitalar.

Em ambiente hospitalar, o uso de solução alcoólica para a higienização das mãos (álcool em gel) pode substituir o uso de lavatórios ou pias com água corrente em dias de racionamento no fornecimento de água público.

- c) CERTO
- e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

762. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item a seguir, referente a infecção hospitalar.

A fonte endógena, como a microbiota presente na flora da boca e na pele do paciente, é fator associado à etiologia de infecções hospitalares.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

763. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item a seguir, referente a infecção hospitalar.

Durante a higienização das mãos, é importante que o visitante mantenha adornos como anéis e alianças nos dedos, para garantir que tanto a pele quanto os acessórios estarão livres de contaminantes após o contato com a água ou com o álcool.

- c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

764. (IBFC/2016/EBSERH)

O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() Para a adequada execução do PCIH os hospitais deverão constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar.

() Os membros executores da CCIH representam o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e, portanto, são encarregados da execução das ações programadas de controle de infecção hospitalar.

() Os membros executores serão, no mínimo, 4 (quatro) técnicos de nível superior da área de saúde para cada 200 (duzentos) leitos ou fração deste número com carga horária diária, mínima, de 6 (seis) horas para o técnico de enfermagem e 4 (quatro) horas para médicos e enfermeiros.

() Um dos membros executores deve ser, preferencialmente, um técnico de enfermagem.

- a) V,F,V,F
b) V,V,V,V
c) F,F,V,V
d) V,V,F,F
e) F,V,F,V

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

765. (IBFC/2016/EBSERH)

As infecções hospitalares são todas as infecções adquiridas durante a internação hospitalar ou então relacionadas a algum procedimento realizado no hospital, podendo inclusive se manifestar após a alta. Essas infecções aumentam a morbidade, o tempo de internação e os custos. Leia as afirmativas a seguir.

I. Atualmente o termo infecção hospitalar está sendo substituído por Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS).

II. Essa mudança abrange não só a infecção adquirida no hospital, mas também aquela relacionada a procedimentos feitos em ambulatórios, durante os cuidados domiciliares e à infecção ocupacional adquirida por profissionais da saúde.

III. A ocorrência de infecção não depende das condições clínicas do paciente, da virulência e inoculo dos microorganismos e de fatores relacionados à internação.

Assinale a alternativa correta:

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
b) Apenas a afirmativa I está correta
c) As afirmativas I e II estão corretas
d) Apenas a afirmativa III está correta
e) As afirmativas I e III estão corretas

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

766. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

A infecção hospitalar, principalmente a causada por bactérias multirresistentes, é um problema que vem crescendo diariamente. Sua prevenção e controle exigem um Sistema de Controle de Infecção Hospitalar equipado, atuante e competente, capaz de planejar e implantar as medidas adequadas a cada situação. Quanto às precauções e medidas de isolamento, assinale a alternativa correta:

a) Precauções Padrão – Devem ser estendidas a todos os pacientes internados, independente do diagnóstico.

b) Precauções Contato - Indicadas para doenças transmitidas por partículas < 5µ dispersas pelo ar em longas distâncias e por período prolongado, sendo alguns exemplos os casos de tuberculose, sarampo e varicela.

c) Precauções Gotículas – Evita a transmissão de infecções cuja a transmissão ocorre por meio de contato direto ou indireto, como a infecção ou colonização por bactérias multirresistentes.

d) Precauções Aéreas – Indicadas para doenças transmitidas por “droplets”, perdigotos e/ou gotículas (partículas > 5µ) expelidos na tosse, conversa, espirros, etc, sendo alguns exemplos os casos de meningite, coqueluche e rubéola.

e) Precauções Expandidas – Devem ser estendidas a todos os pacientes internados, independente do diagnóstico, substituindo as precauções-padrão.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

767. (2015/ INSTITUTO AOCP/ EBSEERH)

Para a adequada execução do Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH), os hospitais deverão constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar. Em relação à sua composição, é correto afirmar que:

a) a CCIH deverá ser composta por profissionais da área de saúde, de nível médio ou superior, formalmente designados.

b) presidente ou coordenador da CCIH será qualquer um de seus membros, indicado pela direção do hospital.

c) os membros consultores serão representantes dos seguintes serviços: serviço médico, serviço de enfermagem, serviço de limpeza e serviço de farmácia.

d) os membros executores serão, no mínimo, 2 (dois) técnicos de nível superior da área de saúde para cada 100 (cem) leitos ou fração deste número.

e) nessa condição, a carga horária diária mínima é de 8 (oito) horas para o enfermeiro e 4 (quatro) horas para os demais profissionais.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

768. (IBFC/2016/EBSEERH)

Considerando os conceitos de infecção hospitalar, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I. É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital.

II. É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.

III. A infecção que está associada com complicação ou extensão da infecção já presente na admissão, a menos que haja troca de microrganismos com sinais ou sintomas fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção.

IV. As infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota superior a 24 (vinte e quatro) horas.

- a) Apenas a frase II está correta
- b) Apenas a frase I está correta
- c) As frases I, III e IV estão corretas
- d) As frases III e IV estão corretas
- e) Apenas as frases II e IV estão corretas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

769. (IBFC/2016/EBSEERH)

São medidas específicas que devem ser adotadas para a prevenção das pneumonias hospitalares e da mortalidade relacionadas à ventilação mecânica:

- a) Manter os pacientes com a cabeceira elevada entre 30 e 45°.
- b) Manter a sedação do paciente sempre que possível.
- c) Aspirar a secreção abaixo do balonete (abaixo da glote).
- d) Higiene oral sem antissépticos.
- e) Higienização das mãos exclusivamente com álcool gel.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

770. (IBFC/2016/EBSERH)

Baseando-se no modo de aquisição de infecção neonatal, é considerada uma infecção hospitalar precoce:

- a) Transplacentária (Exemplo: Toxoplasmose).
- b) Hospitalar propriamente dita, com início de quadro com menos de 96 horas (Exemplo: Estafilococo coagulase-negativa).
- c) Congênita (Exemplo: Sífilis).
- d) Canal de parto (Exemplo: Streptococo do grupo B).
- e) Hospitalar propriamente dita, com início de quadro com mais de 48 horas (Exemplo: Fungos).

<input checked="" type="checkbox"/>	□ TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	□ REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	□ RELER O COMENTÁRIO	□ ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

771. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 07 de 24 de Fevereiro de 2010, no que se refere à Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I. A equipe da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) é a responsável exclusiva pelas ações de prevenção e controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).

II. A CCIH deve estruturar uma metodologia de busca ativa das infecções relacionadas a dispositivos invasivos, dos microrganismos multirresistentes e outros microrganismos de importância clínico-epidemiológica, além de identificação precoce de surtos.

III. Os resultados da vigilância das infecções e perfil de sensibilidade dos microrganismos são informações exclusivas da CCIH, e devem ser divulgados apenas aos supervisores médico e enfermeiro da unidade de terapia intensiva.

IV. Os lavatórios para higienização das mãos devem estar disponibilizados na entrada da unidade, no posto de enfermagem e em outros locais estratégicos definidos pela CCIH e possuir dispensador com sabonete líquido e papel toalha.

- a) As frases II e IV estão corretas
- b) As frases I, II e III estão corretas
- c) As frases II, III e IV estão corretas
- d) Apenas a frase II está correta
- e) Apenas a frases I está correta

<input checked="" type="checkbox"/>	□ TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	□ REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	□ RELER O COMENTÁRIO	□ ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

772. (IBFC/2016/EBSERH)

A investigação de surtos tem o objetivo de evitar o surgimento de novos casos, conhecendo os mecanismos que levaram a eles, bloqueando-os e desta forma visa controlar a epidemia. Considerando os surtos e sua investigação, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

I. No caso das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), estas já estão presentes nos hospitais e quando o número de casos excede o esperado na curva epidêmica, ou ocorrem casos de um novo agente etiológico, pode-se estar diante de um surto hospitalar.

II. Os surtos de fonte comum são aqueles que surgem lentamente e a transmissão do agente deve ser interpessoal ou por meio de fômites. Geralmente o agente etiológico multiplica-se no hospedeiro antes de infectar outra pessoa. Exemplo: dieta parenteral contaminada.

III. Espera-se 1 (um) surto para cada 1.000 (um mil) admissões, o que pode ser uma orientação quanto à subnotificação.

IV. A implantação de medidas de controle devem ser imediatas ao reconhecimento do surto. Uma das medidas gerais a ser adotada é a intensificação da higienização das mãos.

- a) As frases I, II, III e IV estão corretas
- b) As frases I, II e III estão corretas
- c) Apenas a frase IV está correta
- d) Apenas as frases I e IV estão corretas
- e) Apenas a frase III está correta

<input checked="" type="checkbox"/>	□ TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	□ REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	□ RELER O COMENTÁRIO	□ ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

773. (IBFC/2016/EBSERH)

As infecções da corrente sanguínea (ICS) são multifatoriais e apresentam fisiopatologia, critérios diagnósticos, implicações terapêuticas, prognósticas e preventivas distintas. Leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I. A infecção de corrente sanguínea secundária (ICSS) é a ocorrência de hemocultura positiva ou sinais clínicos de sepsis; e deverá ser notificada como ICS, independente da presença de sinais de infecção em outro sítio.

II. Um dos critérios para definição de Infecções Primárias da Corrente Sanguínea (IPCS) laboratorial é pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas: febre ($>38^{\circ}\text{C}$), tremores, oligúria (volume urinário <20 ml/h), hipotensão (pressão sistólica ≤ 90 mmHg), e esses sintomas não estão relacionados com infecção em outro sítio; e duas ou mais hemoculturas (em diferentes punções com intervalo máximo de 48h) com contaminante comum de pele (ex.: difteroides, Bacillus spp, Propionibacterium spp, estafilococos coagulase negativo, micrococcos).

III. As Infecções relacionadas ao acesso vascular (IAV) são infecções que ocorrem no sítio de inserção do cateter, com repercussões sistêmicas.

IV. As infecções primárias da corrente sanguínea (IPCS) são aquelas infecções de consequências sistêmicas graves, bacteremia ou sepse, sem foco primário identificável.

- a) As frases I, III e IV estão corretas
- b) Apenas as frases II e IV estão corretas
- c) Apenas as frases II e III estão corretas
- d) Apenas a frase IV está correta
- e) Apenas as frases III e IV estão corretas

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

774. (IBFC/2016/EBSERH)

A Infecção do Trato Urinário (ITU) relacionada à assistência à saúde (ITU-RAS), no adulto, é definida como:

- 1- Qualquer infecção ITU relacionada a procedimento urológico; e
- 2- ITU não relacionada a procedimento urológico diagnosticada após a admissão em serviço de saúde e para a qual não são observadas quaisquer evidências clínicas e não está em seu período de incubação no momento da admissão.

Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() A ITU relacionada a procedimento urológico, mais frequentemente é o cateterismo vesical.

() A urina coletada em paciente já cateterizado deve ser aspirada assepticamente do local próprio no circuito coletor e a cultura processada de forma quantitativa. Não há indicação de troca do cateter para obter urina para cultura.

() A cultura de ponta de cateter urinário é um teste laboratorial aceitável para o diagnóstico de ITU.

() ITU-RAS sintomática é definida pela presença de ao menos um dos seguintes critérios: paciente está ou esteve com um cateter vesical (CV) em até 7 dias antes da urinocultura, apresenta urinocultura positiva com $\geq 10^5$ UFC/mL de até duas espécies microbianas, com ou sem presença de sintomas como: febre ($>38^{\circ}\text{C}$), urgência, frequência, disúria, dor suprapúbica ou lombar.

Marque a alternativa correta:

- a) F,V,F,F.
- b) V,V,F,F.
- c) V,V,V,F.
- d) V,F,F,V.
- e) V,V,V,V.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

775. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Das medidas adotadas nas precauções padrão ou precauções universais, aquela que isoladamente mais contribui para o controle de infecções hospitalares é:

- a) a lavagem das mãos.
- b) o isolamento de contato.
- c) o uso de máscara bico de pato.
- d) o uso de duas luvas de procedimento.
- e) o uso de gorro e máscara em todos os procedimentos.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

776. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Paciente de 40 anos foi submetido à cirurgia para correção de uma hérnia inguinal e apresentou deiscência da incisão cirúrgica com exsudato purulento no 24º dia após a alta hospitalar, não sendo constatada a presença de abscesso ao ultrassom abdominal.

Com base nos critérios para a classificação de infecções, contidos na Portaria GM/MS nº 2616 de 12 de Maio de 1998, e os Critérios Nacionais de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, referentes ao sítio cirúrgico (ANVISA, 2009), é correto afirmar que o caso trata-se de:

- a) infecção comunitária.
- b) dermatite purulenta.
- c) infecção hospitalar incisional superficial.
- d) infecção hospitalar incisional de órgão/cavidade.
- e) infecção hospitalar incisional profunda.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

777. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Em relação às Infecções da Corrente Sanguínea, vários estudos demonstram que a aplicação conjunta de medidas preventivas por meio de pacote de medidas – bundles – reduziu as Infecções Primárias da Corrente Sanguínea de modo consistente e duradouro. O pacote de medidas compreende:

- a) avaliação diária documentada; desinfecção prévia de conectores; identificação da data de troca do sistema de infusão; troca correta de curativo; higiene das mãos antes e após o manuseio do acesso vascular.
- b) higiene das mãos; precauções de barreira máxima; preparo da pele com gluconato de clorexidina; seleção do sítio de inserção de CVC; revisão diária da necessidade de permanência do CVC.
- c) higiene das mãos; uso de gorro, máscara, avental estéril de manga longa, luvas estéreis e campo estéril ampliado; óculos de proteção.
- d) higiene das mãos; remoção dos pelos, quando necessária, com tesouras; degermação previamente à antissepsia da pele; estabilização do cateter; troca de curativo a cada 48h.
- e) higiene das mãos; precauções de barreira máxima; degermação da pele; seleção do sítio de inserção de CVC; troca de curativo com gaze a cada 48h.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

778. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

As infecções hospitalares causadas por germes multirresistentes são objeto de preocupação e interesse nacional. Com relação às medidas de prevenção, é correto afirmar que:

- a) é obrigatória a instituição de medidas de precaução por contato.
- b) é obrigatória a acomodação do paciente em quarto privativo.
- c) as visitas não devem ser restringidas ou receber orientação diferenciada.

d) os estetoscópios e os termômetros utilizados devem passar por desinfecção de alto nível após o uso.

e) os tecidos dos aparelhos de pressão, bem como os circuitos respiratórios e material de terapia inalatória, devem ser submetidos à esterilização.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

779. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Ao longo da história da Medicina e do Controle de Infecção, a higienização das mãos tem sido apontada como medida eficiente na prevenção e controle de infecções nos Serviços de Assistência à Saúde. As colunas a seguir apresentam alguns conceitos relacionados a essa prática e sua descrição, relacione-as e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Microbiota transitória.
2. Microbiota residente.
3. Infecção cruzada.
4. Antissepsia cirúrgica das mãos.
5. Efeito residual.

() Procedimento realizado pela equipe cirúrgica para eliminar a microbiota transitória e reduzir a microbiota residente das mãos.

() Atividade antimicrobiana prolongada ou estendida que previne ou inibe a proliferação ou sobrevida de microrganismos após aplicação do produto.

() Está aderida às camadas mais profundas da pele, mais resistente à remoção apenas por água e sabonete.

() Transferência de microrganismos de uma pessoa (ou objeto) para outra pessoa, resultando necessariamente em uma infecção.

() Coloniza a camada superficial da pele, sobrevive por curto período de tempo e é passível de remoção pela higienização simples das mãos, com água e sabonete, por meio de fricção mecânica.

- a) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.
- b) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- c) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.
- d) 4 – 5 – 1 – 3 – 2.
- e) 4 – 5 – 2 – 3 – 1.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

780. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A diretoria da Santa Casa constatou um aumento progressivo do consumo de antibióticos de largo espectro e alto custo nos últimos seis meses e solicitou à CCIH que apresentasse estratégias passíveis de realização para minimizar os custos com uso de antimicrobianos. Dentre as propostas descritas a seguir, assinale a alternativa que NÃO corresponde às recomendações para a efetividade de um programa de racionalização do uso de antibióticos.

a) Agendar reuniões com as equipes clínicas e cirúrgicas para apresentar a proposta, sua importância e os dispositivos legais relacionados, tendo em vista a elaboração conjunta das normatizações e a periodicidade de avaliação do programa quanto a custos e eficácia.

b) Implementar política de uso de antimicrobianos, otimizar o seu uso e instituir programa de educação dos profissionais no uso de agentes antimicrobianos.

c) Formar grupo de trabalho de caráter multiprofissional com representantes do corpo técnico administrativo e, particularmente, de especialistas em doenças infecciosas.

d) Formular diretrizes locais, divulgar periodicamente relatórios com os resultados dos programas, fazer concessões a médicos, serviços ou pacientes sempre que solicitadas, com ou sem justificativas.

e) Realizar auditoria de antimicrobianos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

781. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Para a adequada execução do Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH), os hospitais deverão constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar. Em relação à sua composição, é correto afirmar que:

a) a CCIH deverá ser composta por profissionais da área de saúde, de nível médio ou superior, formalmente designados.

b) o presidente ou coordenador da CCIH será qualquer um de seus membros, indicado pela direção do hospital.

c) os membros consultores serão representantes dos seguintes serviços: serviço médico, serviço de enfermagem, serviço de limpeza e serviço de farmácia.

d) os membros executores serão, no mínimo, 2 (dois) técnicos de nível superior da área de saúde para cada 100 (cem) leitos ou fração deste número.

e) nessa condição, a carga horária diária mínima é de 8 (oito) horas para o enfermeiro e 4 (quatro) horas para os demais profissionais.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

782. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Duas enfermeiras recém-formadas são contratadas por uma instituição hospitalar para atuar junto ao controle de infecção. Como membros da CCIH, deverão cumprir várias funções relacionadas à minimização dos riscos de infecção. Referente a essas funções, assinale a alternativa correta.

a) Implantação de um Sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares e Comunitárias.

b) Adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnico-operacionais, visando à prevenção e controle das infecções hospitalares.

c) Realização de investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado ou rotineiramente a cada seis meses e implantação de medidas imediatas de controle.

Assistência de Enfermagem em Feridas e Curativos

d) Definição de política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para a instituição e, posteriormente, comunicação à Comissão de Farmácia e Terapêutica.

e) Aprovação e imposição de respeito ao regimento interno da CCIH.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

773. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Atuar no Controle de Infecções exige a realização e manutenção de parceria com os diferentes serviços hospitalares de apoio à assistência à saúde. Assinale a alternativa que não corresponde a um serviço de apoio direto para a CCIH:

- a) Unidade de Alimentação, Nutrição e Lactário.
- b) Lavanderia Hospitalar.
- c) Serviço de Arquivo Médico e Estatística.
- d) Serviço de Farmácia.
- e) Limpeza e Desinfecção de Superfícies.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

784. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Qual é a Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre a normatização do Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH)?

- a) Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998.
- b) Portaria nº 2.615, de 01 de maio de 1998.
- c) Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 2000.
- d) Portaria nº 3.088, de 23 de janeiro de 2011.
- e) Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

785. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece o fenômeno das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) como um problema de saúde pública e preconiza que as autoridades desenvolvam ações com vistas à redução do risco desses agravos. Entre as IRAS mais frequentes estão:

- a) infecções primárias de corrente sanguínea.
- b) abscessos secundários.
- c) úlceras de pressão.
- d) infecções do trato gastrointestinal.
- e) distúrbios ginecológicos.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

786. (CESPE/2018/EBSERH)
Acerca do uso de curativos na enfermagem, julgue o item a seguir.
Curativos favorecem a rápida epitelização, a diminuição da dor e a aceleração da destruição de tecidos necrosados.

- c) CERTO
- e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

787. (CESPE/2018/EBSERH)
Acerca do uso de curativos na enfermagem, julgue o item a seguir.
As coberturas de alginatos são um tipo de curativo indicado para feridas com pouca exsudação; por isso, seu uso pode prolongar-se por até sete dias.

- c) CERTO
- e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

788. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)

Após ter sido submetida a uma cirurgia de pequeno porte, uma paciente feminina apresenta uma incisão limpa e seca na região inguinal direita de aproximadamente cinco (5) centímetros. O tempo decorrido da cirurgia é de 48 horas.

Nesse caso, o curativo deve ser preferencialmente:

- a) aberto.
- b) compressivo.
- c) com aproximação de bordas.
- d) semioclusivo.
- e) úmido.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

789. (IBFC/2017/EBSERH)

Paciente, sexo feminino, 76 anos, apresentando uma úlcera de pressão (UP) em região sacral com perda da espessura total da pele, com comprometimento de músculo, ossos, tendões e nervos. Com essas características, a UP é classificada em:

- a) Estágio I.
- b) Estágio II.
- c) Estágio IV.
- d) Estágio III.
- e) Estágio V.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

790. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)

Paciente, 52 anos, sexo feminino, comparece ao ambulatório de feridas apresentando lesão ulcerativa em região dorsal de pé esquerdo. No exame físico do membro, observou-se ainda a presença de dermatite ocre, eczema, lipodermatoesclerose e edema. Os achados clínicos sugerem que se trata de:

- a) úlcera venosa.
- b) úlcera arterial.
- c) úlcera por leishmaniose.
- d) úlcera por diabetes.
- e) úlcera por pressão.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

791. (IBFC/2017/EBSERH)

Um local com intensa reação inflamatória e microrganismos que podem produzir exsudato purulento com odor fétido, como por exemplo na deiscência de sutura, é uma ferida classificada como _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Limpa.
- b) Infectada.
- c) Contaminada.
- d) Potencialmente contaminada.
- e) Crônica.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

792. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre a fisiologia da cicatrização, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() Na cicatrização por terceira intenção não há perda tecidual.

() Na cicatrização por primeira intenção, as bordas da ferida são aproximadas por sutura, fita adesiva ou outros mecanismos.

() Na cicatrização por segunda intenção há perda tecidual.

() Na cicatrização por segunda intenção não acontece aproximação de superfícies.

- a) F,F,V,V
- b) V,V,V,V
- c) F,V,V,V
- d) V,V,F,F
- e) V,F,V,V

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

793. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

No que se refere à finalidade dos curativos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() Devem proporcionar ambiente favorável à cicatrização.

() São utilizados apenas para feridas com cicatrização por terceira intenção.

() Evitam contaminação bacteriana exógena.

() No período pós-operatório, devem ser sempre oclusivos e compressivos nas primeiras 48 horas.

- a) V - F - V - F.
- b) F - V - F - V.
- c) V - F - F - V.
- d) F - F - V - V.
- e) V - V - V - V.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

794. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

O profissional de enfermagem obteve a informação de que um paciente sofreu uma ruptura total da ferida operatória em virtude de uma infecção. Nesse caso, é correto afirmar que ocorreu:

- a) obstipação.
- b) queloide.
- c) evisceração.
- d) deiscência.
- e) obstrução.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

795. (IBFC/2016/EBSERH)
 Considerando as intervenções de enfermagem e cuidados gerais de curativo de ferida cirúrgica, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I. Deixar a ferida cirúrgica aberta após 24 horas da cirurgia e/ou quando apresentar saída de secreções.

II. Realizar o curativo com técnica asséptica 24 horas após a sutura e mantê-lo ocluído por mais 24 horas, desde que o curativo esteja seco.

III. Iniciar o curativo pela ferida mais limpa quando o paciente apresentar múltiplas suturas e outros tipos de lesões.

IV. Em caso de ferida cirúrgica que apresenta, após a cirurgia, exsudato sanguinolento, tornando-se, após 24 horas, serosanguinolento e posteriormente seroso, é indicativo de infecção de sítio cirúrgico.

- a) As afirmativas II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa III está correta

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

796. (IBFC/2016/EBSERH)

O tipo de curativo que tem ação de promoção de quimiotaxia e angiogênese, mantém o meio úmido e acelera a granulação é:

- a) Colagenase.
- b) Alginato de cálcio.
- c) Hidrocolóide.
- d) Filme transparente.
- e) AGE (Ácidos Graxos Essenciais).

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

797. (IBFC/2016/EBSERH)
 Uma lesão de surgimento previsível, de origem não traumática, que apresenta um tempo maior para cicatrização, com maior risco para infecção e complicações, recebe a denominação de _____, segundo a classificação de feridas. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Superficial.
- b) Aguda.
- c) Profunda.
- d) Crônica.
- e) Potencialmente contaminada.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

798. (IBFC/2016/EBSERH)
 Assinale a alternativa que contemple a caracterização de gastroplastia, segundo a classificação de feridas e quanto ao conteúdo microbiano.

- a) Contaminada.
- b) Potencialmente contaminada.
- c) Infectada.
- d) Limpa.
- e) Asséptica.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

799. (INSTITUTO AACP/2016/EBSERH)
 Um paciente de 76 anos está internado na Unidade de Clínica Médica há 32 dias. Durante exame físico, o enfermeiro observa, na região sacral, perda parcial da espessura da derme, que se apresenta como uma ferida superficial com leito vermelho e sem esfacelo. Apresenta-se, ainda, como uma úlcera brilhante, sem crosta ou equimose. Assim, o enfermeiro relata em prontuário que o paciente apresenta uma úlcera por pressão em estágio:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) V.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

800. (IBFC/2016/EBSERH)

O tipo de cobertura indicado para feridas limpas, pouco exsudativas e prevenção de ulcera por pressão (UPP) e que não deve ser utilizado como curativo secundário é chamado de:

- a) Carvão Ativado.
- b) Hidrocolóide.
- c) Hidrogel.
- d) Filme transparente.
- e) Sulfadiazina de prata a 1%.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

801. (IBFC/2016/EBSERH)

No âmbito da atenção básica, que recebe pacientes com queimaduras de extensão menor, a limpeza das áreas queimada deve ser realizada com jatos de soro fisiológico 0,9%. Considerando essa limpeza, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I. A temperatura da água ou soro deve ser fria ou gelada.

II. Os jatos de soro devem auxiliar na remoção de resíduos aderentes.

III. As bolhas íntegras, quando presentes no primeiro curativo, se o tempo decorrido da queimadura até o atendimento for menor que uma hora, devem ser aspiradas com agulha fina estéril, mantendo-se íntegra a epiderme como uma cobertura biológica à derme queimada.

IV. Se o tempo entre a queimadura e o atendimento for maior que uma hora, manter a flictena íntegra.

- a) As frases I, II, III e IV estão corretas.
- b) As frases II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as frases I e IV estão corretas.
- d) Apenas a frase II está correta.
- e) Apenas as frases II e III estão corretas.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

802. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Referente às coberturas utilizadas em curativos, assinale a alternativa que apresenta uma enzima proteolítica, sendo indicada para feridas com tecido desvitalizado:

- a) Ácidos graxos essenciais.
- b) Papaína.
- c) Hidrocoloide.
- d) Povidone tópic.
- e) Álcool 70%.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

803. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Homem, 65 anos, está internado na UTI em VM 50%, tetraplégico. O risco desse paciente desenvolver úlcera de pressão é grande. Diante deste caso, qual é a escala apropriada para avaliar o risco de UP (Úlcera Pressão)?

- a) Escala RASS.
- b) Escala SAS.
- c) Escala de Braden.
- d) Escala Cincinnat.
- e) Escala APACHE.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

804. (AOCP/2015/EBSERH)

Paciente internado na UTI apresenta deiscência de incisão cirúrgica abdominal, com exposição de tecido granulado e pequenas áreas com esfacelos, apresentando grande exsudação serossanguinolenta. Qual é o tipo de curativo passivo que induz hemostasia, absorve exsudatos e mantém o meio úmido com desbridamento autolítico para o tratamento desta ferida?

- a) Hidrogel.
- b) Alginato de cálcio.
- c) Papaína.
- d) Hidrocoloide.
- e) Carvão ativado com prata.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

805. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Paciente de 25 anos, sexo feminino, publicitária, relata que sentiu uma picada em região escapular sem dor no momento. Em menos de 24 horas, iniciou dor local de moderada a intensa, mal-estar e febre. Procurou o pronto atendimento no qual recebeu tratamento sintomático e permaneceu em observação, evoluindo com insuficiência renal aguda. No local da lesão, foi observada pequena vesícula de conteúdo escuro que evoluiu para lesão eritematovinhosa, entremeada por pequenas vesículas de conteúdo sero-hemorrágico, circundada por halo claro, sugestivo de placa marmórea e posterior área de necrose seca. O acidente descrito é compatível com:

- a) Loxoscelismo.
- b) Acidente Crotálico.
- c) Acidente Laquético.
- d) Acidente Botrópico.
- e) Escorpionismo.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

806. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

É/são considerado(s) tecido(s) viável(is) no processo de cicatrização das feridas:

- a) granulação e epiteliação.
- b) esfacelo, necrose úmida, granulação e epiteliação.
- c) apenas granulação.
- d) esfacelo, granulação e epiteliação.
- e) esfacelo e necrose úmida.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

807. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Quanto à escala de Braden, é correto afirmar que:

- a) é um método rápido e simples de avaliar a probabilidade de um doente cair.
- b) avalia a capacidade do indivíduo para realizar as atividades instrumentais de vida diária, avaliando as funções cognitivas e sociais.
- c) avalia o equilíbrio do idoso e risco para queda.
- d) é usada para avaliar o nível de consciência depois de trauma encefálico.
- e) avalia o risco de úlceras por pressão.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

808. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O processo de cicatrização das feridas envolve diferentes fases, independente do agente causador. A compreensão do processo é de grande importância, uma vez que a evolução da ferida depende do tratamento adequado a cada fase. Com base no processo das fases de cicatrização das feridas, assinale a alternativa correta.

- a) A fase inflamatória é a fase inicial e caracteriza-se pela homeostase e coagulação, ativa a resposta imune local e ocorre intenso desenvolvimento de células epiteliais e fibroblastos.
- b) Na fase proliferativa, ocorre o processo de maturação e estabilização da síntese de colágeno.
- c) A fase de proliferação é responsável pela produção de colágeno.
- d) A presença de túneis ou fístulas define a fase de hemostasia.
- e) O aparecimento de tecido conjuntivo e fibroblastos caracteriza a fase de remodelamento.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

809. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Em relação ao curativo compressivo realizado no local do acesso vascular para o procedimento do Serviço de Hemodinâmica, assinale a alternativa correta.

- a) Não evita o aparecimento de infecção no local.
- b) Não impede a propagação de infecção local.
- c) Previne sangramento local excessivo.
- d) Pode ser retirado em poucas horas (2 ou 3 horas).
- e) Permite deambulação precoce do paciente (2 ou 3 horas).

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

810. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Qual dessas coberturas promove barreira térmica, a gases e líquidos, microbiana e mecânica, além de manter pH ácido e meio úmido, estimulando o desbridamento autolítico?

- a) Hidrocoloide.
- b) Papaína.
- c) Carvão ativado e prata.
- d) Hidrogel.
- e) Alginate de cálcio.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

811. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Referente ao tratamento de feridas oncológicas, o objetivo principal no tratamento de uma lesão tumoral GIII é:

- a) refazer tecido de granulação.
- b) cicatrizar a ferida.
- c) diminuir o tamanho do tumor.
- d) controlar a dor e o odor.
- e) diminuir o tamanho da ferida.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

812. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Os pacientes ostomizados necessitam de um plano terapêutico individual, portanto conhecer as características do estoma e do efluente eliminado pela alça intestinal exteriorizada auxilia na elaboração deste plano. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta:

- a) O tipo de efluente não está relacionado ao tipo de estoma, mas sim ao que o paciente ingere.
- b) Nas colostomias, as fezes são moldadas e periódicas, ocasionando menos irritação ao contato com a pele.
- c) Nas ileostomias, o efluente é o menos agressivo quando em contato com a pele.

d) O efluente urinário nunca apresenta sinais de complicação, tais como sedimentos ou piúria, quando eliminado por estoma.

e) As ileostomias podem ser usadas para alimentação e não só para excreção.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

813. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Sobre a úlcera por pressão, acerca do eritema reativo, assinale a alternativa incorreta.

a) Desaparece após certo tempo em que a pressão é removida.

b) É um eritema que embranquece quando a área é comprimida.

c) Significa que a carga mecânica ou pressão não está sendo adequadamente distribuída.

d) Não é considerado como UP em estágio I.

e) Indica dano muscular irreversível.

e) V,F,V,V

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Doenças Infecciosas e parasitárias

814. (IBFC/2017/EBSERH)

Sobre a coqueluche, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() Doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade, de distribuição universal.

() Importante causa de morbimortalidade infantil.

() Compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca.

() Em lactentes, pode resultar em um número elevado de complicações e até em morte.

a) V,V,V,V

b) F,F,V,V

c) F,V,F,V

d) V,F,V,F

e) V,F,V,V

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

815. (IBFC/2017/EBSERH)

Sobre a leptospirose, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() A leptospirose relacionada ao trabalho tem sido descrita em trabalhadores que exercem atividades em contato direto com águas contaminadas.

() A transmissão pode ocorrer pelo contato com solo contaminado pela urina dos animais portadores, mais raramente pelo contato direto com sangue, tecido, órgão e urina destes animais.

() Não há transmissão inter-humana, exceto a intrauterina para o feto.

() A leptospirose pode ser considerada como doença relacionada ao trabalho, do Grupo I da Classificação de Schilling, na qual o trabalho é causa necessária.

a) V,V,V,V

b) V,V,V,F

c) F,V,F,V

d) V,F,V,F

e) F,V,F,F

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

816. (IBFC/2017/EBSERH)

Sobre a doença Zika vírus, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. O principal modo de transmissão descrito do vírus é por vetores.

II. Está descrito na literatura científica, a ocorrência de transmissão ocupacional em laboratório de pesquisa, perinatal e sexual, além da possibilidade de transmissão transfusional.

III. A febre por vírus Zika é descrita como uma doença febril crônica, com duração de 10 a 17 dias, com complicações graves e alguns registros de mortes.

IV. A taxa de hospitalização é potencialmente alta.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV
- b) I, III e IV, apenas
- c) III e IV, apenas
- d) I e II, apenas
- e) I, II e III, apenas

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

817. (IBFC/2017/EBSERH)

A febre amarela é uma doença febril aguda, de curta duração (no máximo 12 dias) e gravidade variável. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Na Febre Amarela Urbana (FAU), o mosquito *Aedes aegypti* é o principal vetor e reservatório e o homem, o único hospedeiro de importância epidemiológica.

II. A vacina contra febre amarela é a medida mais importante para prevenção e controle da doença.

III. Não é uma doença de notificação compulsória imediata.

IV. É importante o controle do *Aedes aegypti* para eliminação do risco de reurbanização.

- a) As afirmativas I,II,III e IV estão corretas
- b) As afirmativas II e IV estão corretas
- c) As afirmativas I está correta
- d) As afirmativas I, II e IV estão corretas
- e) As afirmativas II e III estão corretas

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

818. (IBFC/2017/EBSERH)

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa viral aguda, caracterizada por um quadro de paralisia flácida, de início súbito, que ocorre em cerca de 1% das infecções causadas pelo poliovírus. Sobre este assunto, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. O déficit motor instala-se subitamente e sua evolução, frequentemente, não ultrapassa 3 dias.

II. Acomete em geral os membros inferiores, de forma simétrica, tendo como principais características: a flacidez muscular, com perda da sensibilidade, e a arreflexia no segmento atingido.

III. O reservatório é o ser humano, especialmente crianças.

IV. O modo de transmissão ocorre por contato direto pessoa a pessoa, pela via fecal-oral (mais frequentemente), por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou portadores, ou pela via oral-oral, através de gotículas de secreções da orofaringe (ao falar, tossir ou espirrar). A falta de saneamento, as más condições habitacionais e a higiene pessoal precária constituem fatores que favorecem a transmissão do poliovírus.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV
- b) I, II e III, apenas
- c) II e IV, apenas
- d) I, III e IV, apenas
- e) II, III e IV, apenas

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

819. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Uma técnica de enfermagem trabalha no setor de Clínica Médica de um Hospital Universitário há 2 anos. Ao realizar uma punção venosa em um paciente com suspeita de hepatite B (HBV), ela acabou se perfurando com uma agulha contaminada. Diante desse caso, assinale a alternativa correta que apresenta os critérios necessários que devem ser avaliados quanto ao potencial de transmissão da HBV durante a exposição ocupacional a material biológico.

a) Investigar apenas o tipo de exposição, o tipo e a quantidade de fluido e tecido em que o profissional foi exposto; avaliar o status sorológico da fonte e do acidentado.

b) Investigar apenas o tipo de exposição, o tipo e a quantidade de fluido e tecido em que foi exposto e verificar a susceptibilidade do profissional exposto.

c) É necessário apenas verificar a susceptibilidade do profissional exposto e o tipo e a quantidade de fluido e tecido em que foi exposto.

d) É necessário apenas verificar a susceptibilidade do profissional exposto e investigar o tipo de exposição.

e) Investigar o tipo de exposição o tipo e a quantidade de fluido e tecido em que foi exposto, avaliar o status sorológico da fonte e do acidentado e verificar a susceptibilidade do profissional exposto.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

820. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre as manifestações clínicas da Varicela, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() O período prodrômico se inicia com febre baixa, cefaléia, anorexia e vômito, podendo durar de horas até três dias.

() Na infância, os pródromos não costumam ocorrer, sendo o exantema o primeiro sinal da doença.

() No período prodrômico as lesões comumente aparecem em surtos sucessivos de máculas que evoluem para pápulas, vesículas, pústulas e crostas.

() Nos adultos imunocompetentes, a doença cursa de modo mais grave do que nas crianças, apesar de ser bem menos frequente (cerca de 3% dos casos). A febre é mais elevada e prolongada, o estado geral é mais comprometido, o exantema mais pronunciado e as complicações mais comuns podem levar a óbito, principalmente devido à pneumonia primária.

- a) F,V,V,V
- b) V,V,V,V
- c) V,F,V,F
- d) F,V,F,V
- e) V,V,F,V

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

821) (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Um paciente masculino foi diagnosticado com Sífilis há 02 anos e fez o tratamento completo, porém vem ocorrendo a persistência de exames reagentes que pode ser devido à reinfecção pelo *Treponema Pallidum* ou:

- a) uma cicatriz sorológica.
- b) um erro inato do metabolismo.
- c) uma coinfeção pelo vírus HIV.
- d) um teste cruzado para hepatite B.
- e) um armazenamento prolongado da amostra.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

822. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Paciente masculino, 18 anos, procurou a unidade de pronto atendimento apresentando sintomas de febre alta de início rápido, dores intensas nas articulações dos pés e mãos, e manchas vermelhas na pele. Foi diagnosticado como caso suspeito de Chikungunya. Em relação a essa doença, assinale a alternativa correta:

a) É causada por uma bactéria que é transmitida pela picada do mosquito *Aedes aegypti*.

b) O tratamento é específico com uso de poliquimioterapia para Chikungunya mais ácido acetil-salicílico.

c) Não se trata de doença de notificação compulsória, pois já é considerada endêmica no Brasil.

d) Já foi identificada a transmissão sexual dessa doença.

e) Como prevenção, é fundamental implementar ações para eliminação de focos do vetor que transmite a doença.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

823. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Paciente, 26 anos, sexo masculino, proveniente do Estado da Bahia, procurou a unidade de saúde apresentando exantema maculopapular pruriginoso, febre intermitente, hiperemia conjuntival não purulenta e sem prurido, artralgia, mialgia e cefaleia, com diagnóstico médico de ZIKA vírus. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta:

a) A grande maioria dos casos evolui para insuficiência respiratória aguda grave.

b) O tratamento é específico e se dá com antibioticoterapia de amplo espectro.

c) Deve-se proceder à vacinação dos familiares e contatos próximos.

d) As medidas de prevenção e controle dessa doença são semelhantes às da dengue e chikungunya.

e) A principal via de transmissão dessa doença é por contato direto da pessoa saudável com pessoas infectadas.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

824. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre a doença Varicela, assinale a alternativa correta:

a) A principal característica clínica é o polimorfismo das lesões cutâneas, que se apresentam nas diversas formas evolutivas, acompanhadas de prurido.

b) Caracterizada por febre baixa e exantema maculopapular, que se inicia na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se para tronco e membros.

c) O exantema é, precedido, em 5 a 10 dias, por linfadenopatia generalizada, principalmente suboccipital, pós-auricular e cervical posterior.

d) Adolescentes e adultos podem apresentar poliartralgia, poliartrite, conjuntivite, coriza e tosse.

e) O modo de transmissão é indireto, ocorre principalmente através de contato com as lesões e, raramente pelo contato com secreções nasofaríngeas de pessoas infectadas.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

825. (IBFC/2016/EBSERH)

São doenças causadas por vírus:

a) Sarampo, Cólera e Sifilis.

b) Variola, Coqueluche e Histoplasmoze.

c) Caxumba, Hepatites e Raiva.

d) Difteria, Tuberculose e Aspergilose.

e) Hanseníase, Tétano e Paracoccidiodomicose.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

826. (IBFC/2016/EBSERH)

A Leptospirose é uma doença generalizada, febril, causada por espiroquetas patogênicas do gênero *Leptospira*. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

() Acomete exclusivamente o homem.

() Caracterizada por uma vasculite generalizada.

() O principal animal reservatório das leptospiras é o rato.

() O período de incubação é variável, usualmente de 30 a 45 dias.

a) V,F,V,F

b) V,V,V,V

c) F,V,V,F

d) F,F,V,V

e) V,F,F,V

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

827. (IBFC/2016/EBSERH)

O Sarampo é RNA vírus pertencente ao gênero Morbillivirus, família Paramyxoviridae. Sobre esta doença, assinale a alternativa correta.

a) A doença ocorre de forma indireta e é considerada de baixa contagiosidade.

b) Lactentes, cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas, possuem imunidade passiva conferida por anticorpos transmitidos pela via transplacentária.

c) De um modo geral, apenas as crianças são suscetíveis ao vírus do sarampo.

d) O período de incubação é de geralmente 5 dias, podendo variar de 3 a 7 dias, desde a data da exposição até o aparecimento da febre, e cerca de 7 dias até o início do exantema.

e) A imunidade via transplacentária é permanente, razão pela qual não causa interferência na resposta à vacinação em menores de 12 meses de vida.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

828. (IBFC/2016/EBSERH)

O vírus chikungunya é originário da África, onde foi identificado originalmente na Tanzânia em casos humanos febris e em mosquitos *Aedes Aegypti*. Sobre a Febre de Chikungunya, assinale a alternativa correta.

a) Os principais hospedeiros dos arbovírus são humanos e primatas não humanos, além de outros vertebrados como roedores, pássaros e pequenos mamíferos.

b) O período de incubação extrínseco, que ocorre no ser humano, é em média de 10 a 14 dias (podendo variar de 5 a 28 dias).

c) O período de incubação intrínseco, que ocorre no vetor, dura em média 20 dias.

d) Depois do período de incubação intrínseco, o mosquito é capaz de transmitir o vírus a um hospedeiro suscetível, como o ser humano. Em seguida, o mosquito permanece infectante por apenas 4 semanas.

e) O período de viremia no ser humano pode perdurar por até 30 dias e, geralmente, inicia-se 10 dias antes da apresentação dos sintomas.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

829. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)
Paciente masculino, 52 anos, é etilista e portador de Hepatite C crônica não tratada. Foi atendido no serviço de saúde e se apresenta icterício, com abdome ascítico e queixas de mal-estar geral. Sobre a Hepatite C crônica, assinale a alternativa correta.

a) Na hepatite C crônica, o Anti-HCV apresenta-se reagente por menos de seis meses.

b) Pode ocorrer progressão para cirrose e descompensação hepática nos casos mais graves.

c) Comorbidades como o etilismo não influenciam na evolução natural da hepatite C e nos resultados de seu tratamento.

d) Nos pacientes com cirrose hepática instalada, o tratamento e erradicação do HCV remove o risco de hepatocarcinoma.

e) Devido às características fisiopatológicas da infecção crônica pelo HCV, é preciso que as consultas sejam realizadas no mínimo 2 vezes ao ano.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

830. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Um paciente chegou ao serviço de saúde prostrado, pálido, queixando-se de dor de garganta e febre não muito elevada (37,5 - 38,5°C). Ao exame físico, apresentava placas pseudomembranosas branco-acinzentadas nas amígdalas. De acordo com este quadro, possivelmente, o paciente está apresentando qual das seguintes doenças transmissíveis?

- a) Rubéola.
- b) Coqueluche.
- c) Difteria.
- d) Sarampo.
- e) Doença meningocócica.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

831. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Mulher de 35 anos, enfermeira, tem apresentado mal-estar, cefaleia, febre baixa, anorexia, astenia, fadiga, artralgia, náuseas, vômitos, colúria, hipocolia fecal, desconforto no hipocôndrio direito e aversão a alguns alimentos e ao cigarro. Nega patologias pregressas e/ou comorbidades, refere acidente com perfurocortante prévio com paciente fonte desconhecido. Após avaliação clínica e realização de sorologias, é diagnosticada Hepatite B. Sobre essa patologia, assinale a alternativa correta.

a) O agente etiológico é o vírus da Hepatite B (HBV). Um vírus RNA, da família Hepadnaviridae.

b) O reservatório é o homem. Experimentalmente, chimpanzés, espécies de pato e esquilo.

c) Dentre as complicações, destacam-se a cronicização da infecção e a cirrose hepática, não havendo relação desse tipo de hepatite com o carcinoma hepatocelular.

d) O período de incubação é de 60 a 360 dias.

e) O período de transmissibilidade é de 4 a 8 semanas após os primeiros sintomas, mantendo-se durante a evolução clínica da doença. O portador crônico pode transmitir por vários anos.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

832 (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Indivíduo de 34 anos, trabalhador em uma empresa extrativista de madeira, apresenta quadro abrupto de febre, calafrios, cefaleia intensa, dor lombossacral, mialgia generalizada, anorexia, náuseas, vômitos e epistaxe. Seus exames laboratoriais demonstram leucopenia, provas hepáticas e testes de coagulação alterados e ECG com alterações no segmento ST-T. Após realização de testes virológicos e sorológicos, confirma-se o diagnóstico de febre amarela, sendo relacionada à atividade ocupacional. Diante dessa situação, são ações pertinentes, exceto:

a) suspender indicação de vacinação aos trabalhadores não vacinados, para evitar hipersensibilização.

b) examinar os expostos, visando identificar outros casos que devem ser tratados.

c) notificar aos sistemas de informação do SUS, por se tratar de doença de notificação compulsória.

d) notificar o caso à DRT/MTE e ao sindicato da categoria; alimentando o sistema de informação de saúde do trabalhador.

e) orientar o empregador para que ocorra a adoção de medidas para eliminação ou controle dos fatores de risco.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

833. (AOC/2015/EBSERH)

Na assistência a casos suspeitos e confirmados de infecção pelo vírus Ebola, recomenda-se que seja(m) instituída(s):

- a) apenas medidas de precaução padrão.
- b) apenas medidas de precaução de contato.
- c) apenas medidas de precaução para gotículas.
- d) precaução padrão e para aerossóis.
- e) precaução padrão, de contato e para gotículas.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

834. (INSTITUTO AOC/2015/EBSERH)

Paciente procurou o serviço de saúde relatando febre baixa, mal-estar e coceira no corpo. Ao exame físico, o enfermeiro constatou exantema maculopapular róseo na face, couro cabeludo e tronco, em alguns locais evoluindo com máculas, pápulas, vesículas e crostas com aspecto polimorfo. Relatou também que foi à casa de um primo há 2 semanas, e que este apresentava os mesmos sinais e sintomas. Diante do caso, o enfermeiro suspeitou de:

- a) escabiose.
- b) sarampo.
- c) herpes simples.
- d) escarlatina.
- e) varicela.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

835. (INSTITUTO AOC/2015/EBSERH)

Sobre a Malária, é correto afirmar que:

- a) é também chamada de paludismo, impaludismo ou febre intermitente.
- b) o morcego é o principal reservatório de importância epidemiológica para a malária humana.
- c) seus agentes etiológicos são bactérias altamente resistentes.
- d) seus vetores são mamíferos domesticados.

e) seu período de incubação é de 48 horas.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

836. (INSTITUTO AOC/2015/EBSERH)

Mediante a introdução do Zika vírus no país, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS) orienta a notificação dos casos confirmados por meio da Ficha de Notificação do SINAN. Uma das complicações em decorrência dessa doença é:

- a) a síndrome hemorrágica.
- b) a paralisia tônica aguda unilateral.
- c) a síndrome de Guillain-Barré.
- d) o exantema multifocal.
- e) o megacólon.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

837. (INSTITUTO AOC/2015/EBSERH)

Sobre a Hepatite B, assinale a alternativa correta:

- a) O rastreamento para hepatite B deve ser oferecido somente para mulheres grávidas que apresentam situações de risco.
- b) O antígeno de superfície da hepatite B (HBsAg) deve ser solicitado nos exames pré-concepcionais, na primeira consulta de pré-natal, e ser repetido no terceiro trimestre.
- c) Toda gestante HBsAg reagente deve receber a vacina para hepatite B.
- d) As gestantes com vacinação incompleta devem iniciar o esquema vacinal.
- e) Nos casos de mãe HBsAg não reagente e HBeAg não reagente, verificar se foi aplicada a 1ª dose da vacina para hepatite B e a imunoglobulina específica contra a hepatite B, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

838. (INSTITUTO AOC/2015/EBSERH)

No Brasil, o registro mais antigo de ações de prevenção e controle de doenças é referente à adoção de medidas para conter qual epidemia, no século XVII, no porto de Recife?

- a) Aids.
- b) Dengue.
- c) Malária.
- d) Febre amarela.
- e) Esquistossomose.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

839. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que corresponde a uma doença transmissível erradicada.

- a) Varíola.
- b) Varicela.
- c) Coqueluche.
- d) Tuberculose.
- e) Hanseníase.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

840. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Os casos suspeitos de Chikungunya devem ser comunicados/notificados:

- a) após confirmação laboratorial da doença.
- b) em 48 horas após sorologia positiva.
- c) em até 24 horas a partir da suspeita inicial.
- d) diretamente ao Ministério da Saúde, via telefone.
- e) em, no máximo, 72 horas após isolamento viral compatível.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

841. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Os parâmetros para inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória devem obedecer alguns critérios, dentre eles:

- a) disseminação – contaminação – agravante.
- b) exposição – período de incubação – pré-disposição.
- c) magnitude – transcendência – vulnerabilidade.
- d) circulação – parâmetro – responsabilidade.
- e) abordagem – requisito – confiabilidade.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Administração em Enfermagem

842. (CESPE/2018/EBSERH)

A respeito de avaliação do desempenho hospitalar, julgue o item que se segue.

A obtenção de uma ou mais hemoculturas positivas por microrganismos não contaminantes da pele e não relacionados à outra infecção podem indicar a ocorrência de uma infecção primária sanguínea.

- c) CERTO
- e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

843. (CESPE/2018/EBSERH)
Acerca dos indicadores hospitalares, julgue o próximo item.
O tratamento de risco em unidades de saúde pode ser realizado por partilhamento ou transferência do risco para outra instituição por meio de contrato.

- c) CERTO
- e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

844. (CESPE/2018/EBSERH)

Acerca dos indicadores hospitalares, julgue o próximo item.
O coeficiente de mortalidade hospitalar mede a porcentagem dos pacientes que morrem após 48 h de internação com relação às saídas (altas + óbitos).

- c) CERTO
- e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

845. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)

O papel que um elemento assume no grupo é determinado pelas necessidades do próprio grupo, pelas características próprias de cada um dos elementos desse grupo e pela forma como essas características são percebidas pelos demais elementos. O enunciado refere-se ao estilo de liderança:

- a) democrática.
- b) situacional.
- c) permissiva.
- d) autocrática
- e) laissez-faire.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

846. (IBFC/2017/EBSERH)

De acordo com as abordagens utilizadas no processo de apuração e análise de custos, é correto afirmar que, a apropriação de custos por centro de custos e o custeio de procedimentos hospitalares representam as duas formas mais usuais de expressão do custo de um serviço gerado por uma instituição hospitalar do sistema de:

- a) Custeio padrão
- b) Custeio indireto
- c) Custeio direto
- d) Custeio baseado em atividade ABC (Activity Based Costing)
- e) Custeio por absorção

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

847. (IBFC/2017/EBSERH)

Todo prontuário médico deverá ser arquivado no mínimo por _____ e, nos casos de hospitalar maternidade, os prontuários de parto deverão ser arquivados por _____ conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Decorrido esses prazos, os originais podem ser substituídos por métodos de registro capazes de assegurar a restauração plena das informações nele contidas. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) 5 anos; 18 anos
- b) 10 anos; 35 anos
- c) 15 anos; 70 anos
- d) 25 anos; 25 anos
- e) 20 anos; 21 anos

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

848. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Qual é o nome dado ao processo cooperativo que se desenvolve entre um profissional gestor de caso, uma pessoa portadora de uma condição de saúde muito complexa e sua família, e que tem como objetivos propiciar atenção de qualidade, humanizada, diminuindo a fragmentação da Atenção à Saúde, aumentando a capacidade funcional e preservando a autonomia individual e familiar?

- a) Abordagem primária.
- b) Projeto interdisciplinar.
- c) Projeto terapêutico.
- d) Gestão de caso.
- e) Estratificação de risco.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

849. (IBFC/2016/EBSERH)

Muitos enfermeiros têm ocupado cargos de liderança nos serviços de saúde. O enfermeiro que tem característica de trabalhar em conjunto ou de forma participativa, permitindo ao grupo efetuar sugestões e participar nas decisões, ao mesmo tempo em que a autoridade é exercida com o subordinado, é denominado:

- a) Líder Democrático
- b) Líder Autocrático
- c) Líder Liberal
- d) Líder Coercitivo
- e) Líder Facilitador

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

850. (IBFC/2016/EBSERH)

O Enfermeiro chefe da Unidade de Oncologia possui um estilo de liderança que se caracteriza pelo trabalho com excesso de liberdade permitida aos subordinados, possibilitando uma situação em que os trabalhadores não conhecem os objetivos e conseqüentemente acabam não desempenhando suas tarefas. Essa liderança é chamada de:

- a) Autocrática
- b) Democrática
- c) Coercitiva
- d) Controladora
- e) Laissez-faire (Liberal)

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

851. (IBFC/2016/EBSERH)

Em uma unidade de Hemodinâmica, o Enfermeiro utilizará o método da curva ABC para classificação dos materiais com a finalidade de melhorar a organização e o controle gerencial.

É correto afirmar que os materiais em menor número de itens, entretanto, de maior custo ou investimento, possuem maior importância quanto à forma de gerenciá-los, sendo denominados:

- a) Classe B.
- b) Classe C.
- c) Classe O.
- d) Classe Y.
- e) Classe A.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

852. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Analisando o contexto de concepção de gestão voltada para a Gestão do Sistema e das Políticas de Saúde e diante dos avanços e constantes mudanças no setor saúde, torna-se imprescindível que o (a) enfermeiro (a) desenvolva as suas habilidades de:

- a) organização do ambiente de cuidado.
- b) implementação da SAE.
- c) domínio técnico.
- d) liderança.
- e) padronização de materiais.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

853. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

No que se refere à segurança do paciente, a aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional é denominada:

- a) gestão de risco.
- b) inclusão processual.
- c) avaliação de resultados.
- d) desempenho de qualidade.
- e) sistematização de recursos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

854. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Os manuais são instrumentos de sistema de informação da organização e transmitem, por escrito, orientações aos elementos da equipe de enfermagem para desenvolvimento das atividades. Para formulação destes manuais, devemos obedecer as seguintes etapas:

- a) diagnóstico da instituição, determinação dos assuntos, estruturação e confecção dos instrumentos, implantação e avaliação.
- b) planejamento, descrição das tarefas da empresa e execução das mesmas, estruturação e confecção dos instrumentos, implantação.
- c) planejamento, execução e avaliação dos manuais.
- d) determinação dos assuntos, estruturação e confecção dos instrumentos, implantação e avaliação.
- e) diagnóstico da instituição, estruturação e confecção dos instrumentos, implantação e avaliação.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

855. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Não se pode organizar os serviços de Saúde sem considerar que os profissionais vão errar. Errar é humano e cabe ao sistema criar mecanismos para evitar que o erro atinja o paciente. Para isso, algumas mudanças são requeridas para iniciar a jornada, com vistas a uma cultura da segurança. Faz parte dessas mudanças:

- a) buscar os erros como falhas individuais.
- b) o fato de que o cuidado deve deixar de ser centrado no paciente para ser centrado na equipe de saúde.
- c) mudar de um ambiente punitivo para uma cultura justa.
- d) não diferenciar os trabalhadores cuidadosos e competentes que cometem erros dos que têm um comportamento de risco consciente.
- e) adotar modelos de cuidado baseados na excelência do desempenho individual.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

856. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Pode-se dizer que, de uma forma geral, o objetivo final da Avaliação é:

- a) balancear os sistemas de gastos públicos.
- b) individualizar ações de saúde.
- c) estabelecer as políticas de saúde.
- d) posicionar as etapas de planejamento.
- e) ajudar na tomada de decisões.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

857. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

“Na enfermagem, pode-se definir este tipo de liderança como a capacidade de influenciar as outras pessoas a tomar decisões de modo que possibilitem a continuidade da instituição a longo prazo e a estabilidade financeira da organização a curto prazo”.

O enunciado refere-se à:

- a) Liderança estratégica.
- b) Liderança gerencial.
- c) Liderança situacional.
- d) Liderança motivacional.
- e) Liderança direcional.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

858. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
A administração em Enfermagem possui dois objetivos principais, alcançar a eficiência, como cumprir tarefas e obrigações, bem como alcançar a eficácia, como:

- a) obter resultados.
- b) fazer corretamente as coisas.
- c) resolver problemas.
- d) treinar subordinados.
- e) salvaguardar recursos.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

859. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
“Os funcionários de enfermagem deverão estar na unidade onde trabalham, devidamente uniformizados, até as 7 horas”. Pode-se dizer que o enunciado é um exemplo de:

- a) Norma.
- b) Regimento.
- c) Regulamento.
- d) Portaria.
- e) Lei.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

860. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Nos serviços de enfermagem, a rotina é definida como o conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividades devem ser realizadas. Existem alguns tipos de rotinas, como aquelas que representam graficamente as ações a serem realizadas, utilizando símbolos identificados em uma legenda. A qual tipo de rotina o enunciado se refere?

- a) Coluna.
- b) Fluxograma.
- c) Textual.
- d) Diagonal.
- e) Vertical.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

- a) Combate ao estresse e ao assédio moral.
- b) Campanhas de orientação quanto ao etilismo e uso de drogas ilícitas.
- c) Campanhas de detecção do diabetes e da hipertensão arterial.
- d) Vacinação contra o tétano e hepatite B.
- e) Orientação quanto aos riscos biológicos para profissionais de saúde.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

862. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)
Paciente compareceu à Unidade Básica de Saúde com caso suspeito de determinada doença. Lá o profissional de saúde, ao realizar o atendimento, necessitou fazer a notificação compulsória imediatamente. Nesse caso, o paciente estava apresentando a suspeita de qual das doenças listadas a seguir?

- a) Hanseníase.
- b) Sífilis adquirida.
- c) Febre hemorrágica da dengue.
- d) Tuberculose.
- e) Tétano.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

863. (IBFC/2016/EBSERH)
A Rede de Atenção às Urgências prioriza as linhas de cuidados:

- a) Da Gestante e da puérpera.
- b) Cardiovascular e pediátrica.
- c) Pediátrica, Geriátrica e traumatológica.
- d) Das Doenças crônicas.
- e) Cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Atenção Básica e Saúde da Família

861. (IBFC/2016/EBSERH)
Considerando os ambientes de trabalho, assinale a alternativa que contém uma estratégia que tipicamente é de proteção à saúde:

864. (IBFC/2016/EBSERH)
Os profissionais da Atenção Básica, por manterem um contato mais próximo com as comunidades nas quais trabalham, especialmente com as crianças e suas famílias, têm oportunidades únicas durante as visitas domiciliares para realizar ações educativas de como evitar e prevenir acidentes. Sobre cuidados para garantir a segurança das crianças, a fim de evitar acidentes, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. Para crianças de 0 a 6 meses, deve-se proteger o berço e o cercado com grades baixas com no máximo 2cm entre elas. Nunca deixe a criança sozinha em cima de qualquer móvel, nem por um segundo, mas se não for possível deixe ao menos a criança sob os cuidados de outra criança.

II. Para crianças de 6 meses a 1 ano de idade, O Código de Trânsito Brasileiro determina que a criança deve ser transportada no bebê-conforto ou no assento infantil conversível para carros e veículos de trânsito automotivo (uma cadeira especial em forma de concha, levemente inclinada, que deve ser colocada no banco de trás, voltada para o vidro traseiro, conforme as orientações do fabricante).

III. Para evitar atropelamento em crianças de 1 a 2 anos de idade, deve-se segurar a criança pelo pulso, impedindo assim que ela se solte e corra em direção à rua. Não permita que a criança brinque em locais com trânsito de veículos (garagem e rua) e escolha lugares seguros para as crianças brincarem (parques, ciclovias, praças e outros lugares próprios para o lazer infantil).

IV. Em crianças de 6 a 10 anos, para evitar acidentes, deve-se utilizar corretamente o assento de elevação até ela completar 6 anos. A partir desta idade, as crianças deverão usar o cinto de segurança de três pontos no banco de trás. Sentar-se no banco da frente só é permitido pela lei a partir dos 8 anos de idade e com o uso do cinto de segurança.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I, II e III, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) I, II e IV, apenas.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

865 (INSTITUTO AOC/2015/EBSEH)

Na abordagem familiar, considera-se que a saúde da família vai além da soma da saúde dos indivíduos; sendo assim, espera-se que a equipe de Atenção Básica à Saúde seja capaz de identificar e desenvolver a seguinte especificidade:

- a) trabalhar com todos da família, exceto, obviamente, os sadios.

b) cuidar com base na experiência da família ao longo do tempo, ou seja, sua história progressa, atual e perspectivas futuras.

c) reconhecer que a pessoa mais sintomática (doente) da família não pode mudar com o tempo.

d) reconhecer que a família enquanto um sistema não é afetada pela mudança de qualquer um de seus membros.

e) desconsiderar o contexto social e cultural da família na facilitação de suas relações com a comunidade.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

866. (INSTITUTO AOC/2015/EBSEH)

As visitas domiciliares são ferramentas fundamentais para o cuidado à família; entre as questões importantes de se trabalhar nas visitas domiciliares, é importante que o profissional

a) identifique quem são os cuidadores da pessoa com sofrimento psíquico e/ou uso de álcool e drogas, procurando excluí-los da conversa.

b) faça com os cuidadores uma lista dos cuidados que a pessoa com sofrimento psíquico e/ou uso de álcool e drogas recebe deles.

c) organize a lista de cuidados, classificando-os de acordo com prioridades não discutidas e sem acordo entre todos: membros da equipe de Saúde e cuidadores familiares.

d) não converse com os cuidadores familiares, para que não atrapalhem os Profissionais da equipe de saúde.

e) apenas observe quais são os cuidados que estão faltando, sem a necessidade de qualquer registro.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

867. (INSTITUTO AOC/2015/EBSEH)

Sobre o atendimento da demanda espontânea na atenção básica, assinale a alternativa incorreta.

a) São exemplos de situações não programadas que podem ser acolhidas na atenção básica: usuário com cefaleia ou tontura; pessoa com ardência ou dor ao urinar; criança com febre e mulher com sangramento genital.

b) É fundamental que a demanda apresentada pelo usuário seja acolhida, escutada, problematizada e reconhecida como legítima, pois os momentos de sofrimento dos usuários são fundamentais para a criação e fortalecimento de vínculos.

c) Mesmo os usuários que são acompanhados regularmente pelas ações programáticas podem apresentar exacerbações em seu quadro clínico e demandar atenção em momentos que não o de acompanhamento agendado. Nesse caso, eles devem ser encaminhados para a UPA.

d) Ao atender à demanda espontânea, as equipes podem se deparar com a não efetividade de algumas condutas e projetos terapêuticos prévios, ou com situações novas que requerem invenção de novas estratégias de cuidado e de reorganização do serviço.

e) A atenção básica precisa ser resolutiva e deve ter tanto a capacidade ampliada de escuta (e análise) quanto um repertório, um escopo ampliado de ofertas para lidar com a complexidade de sofrimentos, adoecimentos, demandas e necessidades de saúde às quais as equipes estão constantemente expostas.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

868. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Uma singularidade das Redes de Atenção em Saúde (RAS) é que seu centro de comunicação situa-se na:

- a) atenção primária em saúde.
- b) atenção ambulatorial especializada.
- c) rede de urgência e emergência.
- d) centralização do território sanitário.
- e) terceirização dos serviços médicos.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

869. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (Ministério da Saúde, 2010). Dessa forma, qual das alternativas a seguir não representa uma rede prioritária de saúde?

- a) Rede Cegonha.
- b) Rede de Atenção às Urgências e Emergências.
- c) Rede de Atenção Psicossocial.
- d) Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência.
- e) Rede de Apoio ao Câncer de Útero.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

870. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Um dos atributos da Rede de Atenção à Saúde é:

- a) população e território indefinidos com conhecimento da oferta de serviços de saúde.
- b) atenção Básica à Saúde estruturada como último nível de atenção.
- c) restrita participação social.
- d) gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico.
- e) financiamento bipartite, garantido e suficiente, alinhado com as metas da rede.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

871. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Um paciente que necessita de cuidados de menor complexidade, incluídos os de recuperação nutricional, de menor frequência, com menor necessidade de recursos de saúde, em que a equipe prestadora de cuidado é a equipe de atenção básica, pode ser enquadrado em qual modalidade de atenção domiciliar (AD)?

- a) AD3.
- b) AD2.
- c) AD1.
- d) AD4.
- e) AD5.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

872. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Na abordagem familiar, a compreensão da família pode não ser suficiente, pois ela se relaciona com o meio e com outros atores sociais, e essas relações são fundamentais para se atingir e preservar o equilíbrio biopsicossociossocial da unidade familiar. Neste contexto, qual é o instrumento utilizado que consiste na representação gráfica dos contatos dos membros da família com os outros sistemas sociais, das relações entre a família e a comunidade?

- a) Ecomapa.
- b) Gráfico de famílias.
- c) Fluxograma.
- d) Sistema de famílias.
- e) Esquema de famílias.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

873. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 O que é considerado a base do trabalho das equipes de atenção básica para a prática da vigilância em saúde, caracterizando-se por um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde?

- a) Integralidade.
- b) Centralização.
- c) Territorialização.
- d) Universalidade.
- e) Descentralização.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

874. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 A Vigilância em Saúde, visando à integralidade do cuidado, deve inserir-se na construção das redes de atenção à saúde, sendo coordenada:

- a) pela atenção Primária à Saúde.
- b) pela atenção Secundária à Saúde.
- c) pela atenção Terciária à Saúde.
- d) por serviços Especializados de Saúde.
- e) por clínicas Especializadas em Saúde.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

875. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 Dentre os diversos espaços dos serviços de saúde, destaca-se como um contexto privilegiado para desenvolvimento de práticas educativas em saúde:

- a) a atenção primária em saúde.
- b) as unidades de terapia intensiva.
- c) os albergues e casas de repouso.
- d) os centros de referência em serviço social.
- e) os ambulatórios de consultas especializadas.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

876. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 As visitas domiciliares apresentam-se como uma importante estratégia de acompanhamento das famílias na atenção básica à saúde.

Para o recém nascido e sua família, destacam-se os seguintes benefícios, exceto:

- a) estabelecimento de apego entre família e equipe de saúde.
- b) melhoria de alguns tipos de comportamentos de algumas crianças.
- c) melhoria no desenvolvimento cognitivo de alguns grupos específicos como prematuros e RN de baixo peso.
- d) melhoria da prática de amamentação.
- e) melhoria da detecção e manejo da depressão pós-parto.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

877. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 São atributos relacionados à Atenção Primária em Saúde no Brasil, exceto:

- a) primeiro contato.
- b) descentralização de serviços especializados.
- c) longitudinalidade do cuidado.
- d) orientação para comunidade.
- e) foco na família.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

878. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A implantação da Estratégia Saúde da Família significou um ciclo de desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (APS) na saúde pública brasileira. Sofreu influências internas dos modelos brasileiros de APS referidos e externas das diferentes propostas de APS, em especial dos modelos canadense, cubano e inglês. Contudo suas origens mais significativas estão:

a) na Escola de Saúde Pública de Ribeirão Preto, que instituiu o Programa Saúde para Todos, em 1994.

b) no Relatório das Nações Unidas sobre as condições de saúde no mundo e as propostas estabelecidas, em 2002.

c) no Programa de Agentes de Saúde, instituído pela Secretaria Estadual de Saúde do Ceará, em 1987.

d) na primeira Conferência de Alma Ata, realizada em 1979, que impunha os cuidados voltados à família como a base do Programa de Saúde da Família.

e) nas experiências com Agentes de Endemias, no início dos anos 80, principalmente nos estados do Sul do Brasil.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

879. (INSTITUTO AOC/P/2015/EBSEH)
Sobre a Visita Domiciliar, é correto afirmar que:

a) deve ser realizada apenas aos pacientes acamados.

b) é importante para realização de ações de promoção e educação à saúde.

c) é uma atribuição exclusiva dos Agentes Comunitários de Saúde.

d) deve ser realizada para conhecer o quadro clínico do usuário, ignorando aspectos sociais e familiares.

e) desfavorece o vínculo entre o profissional de saúde e o usuário.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Cuidados de Enfermagem

880. (2018/ CESPE/ IFF)

Os distúrbios e problemas musculoesqueléticos encontram-se atualmente no topo dos indicadores de doenças ocupacionais, caso enfoquem perturbações na saúde dos trabalhadores. Acerca das doenças relacionadas ao trabalho, assinale a opção correta. Nesse sentido, considere que as siglas LER e DORT, sempre que empregadas, referem-se, respectivamente, a lesões por esforço repetitivo e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho.

a) LER e DORT são incuráveis em qualquer estágio após o surgimento.

b) Os fatores de risco são independentes e devem ser sempre analisados de forma isolada.

c) A sintomatologia de LER e de DORT é bastante limitada e tem foco na dor localizada.

d) De acordo com a proposta de intervenção para a prevenção de LER e de DORT, os distúrbios relacionados ao trabalho não são reconhecidos como doenças ocupacionais.

e) Os distúrbios ocupacionais incluem altos índices de perturbações posturais, causadas por agressões diversas, incluindo fatores psicossociais e emocionais.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

881. (CESPE/2018/EBSEH)

Julgue o item seguinte, relacionado a distúrbios hidreletrolíticos frequentemente presentes em pacientes críticos e que requerem cuidados e conhecimentos especiais de enfermagem.

O potássio é um cátion predominantemente intracelular, e sua maior concentração encontra-se no músculo esquelético.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

882. (CESPE/2018/EBSEH)

Julgue o item seguinte, relacionado a distúrbios hidreletrolíticos frequentemente presentes em pacientes críticos e que requerem cuidados e conhecimentos especiais de enfermagem.

O magnésio, que é o segundo cátion intracelular mais comum, apresenta efeito antagonista ao cálcio e está envolvido na contratilidade muscular e na transmissão neuronal.

c) CERTO
e) ERRADO

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

883. (IBFC/2016/EBSEH)

Não causar lesão ao paciente durante o cuidado é uma preocupação constante do profissional de saúde. Sobre este assunto, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. São chamados eventos adversos em saúde “as injúrias intencionais decorrentes da atenção à saúde relacionada à evolução natural da doença de base, que ocasionam lesões nos pacientes acometidos, prolongamento do tempo de internação e/ou morte.”

II. A avaliação de risco de queda, de flebite e de úlcera de pressão, sua prevenção e medidas corretivas para evitar que estes eventos ocorram repetidas vezes são indicadores de qualidade da assistência de enfermagem. Para todos estes eventos, a avaliação do risco do paciente a qualquer destes eventos é a principal forma de prevenção.

III. O potencial de risco para erros de medicação na urgência e emergência está associado à grande quantidade de medicamentos administrados por vias diversas, entre elas a endovenosa, exigindo que o profissional esteja atento ao cálculo preciso e ao preparo de drogas vasoativas.

- a) II e III, apenas
- b) I, II e III
- c) I e II, apenas
- d) I e III, apenas
- e) II apenas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

884. (INSTITUTO AOC/2016/EBSERH)

Paciente, 2 anos, admitido na UTI pediátrica com história de hipertermia, irritabilidade, insuficiência respiratória, oligúria e acidose láctica, caracterizando um quadro séptico. Devido à instabilidade hemodinâmica, é iniciada a infusão de drogas vasoativas (DVA). Em relação aos cuidados de enfermagem referentes à infusão de DVA, assinale a alternativa correta.

- a) Devem ser administradas com equipo macrogotas, controlando a velocidade de infusão se necessário.
- b) É necessário conhecer a ação, estabilidade e a interação medicamentosa das drogas vasoativas.
- c) É necessário realizar preparo da droga após o término da infusão atual da DVA.
- d) É necessário administrar drogas vasoativas preferencialmente em acesso venoso periférico.

e) É necessário administrar medicações em bólu preferencialmente na via utilizada para infusão das drogas vasoativas.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

885. (INSTITUTO AOC/2016/EBSERH)

Paciente, 5 anos, com história clínica de cardiopatia congênita, apresenta apatia e fadiga, cianose periférica, comprometimento hemodinâmico, oligúria e precórdio hipoativo, evidenciando sinais de baixo débito e choque. Sem melhora após atendimento inicial, evolui para intubação orotraqueal (IOT), ventilação mecânica (VM), infusão de droga vasoativa (DVA) e monitorização hemodinâmica invasiva. Referente aos cuidados de enfermagem em relação à pressão arterial média invasiva, assinale a alternativa correta.

- a) Nivelar (zero hidrostático) a pressão arterial média invasiva ao nível da linha hemiclavicular com o paciente em decúbito lateral direito.
- b) Antes de efetuar o procedimento realizar manobra de Allen, se houver sinais de má perfusão, utilizando técnica séptica para manipulação do sistema.

c) Manter cuidados com o local de inserção do cateter, avaliando-se sinais flogísticos, sangramento, perfusão periférica, presença de trombos ou obstrução do cateter.

d) Atentar para as indicações da pressão arterial média invasiva: embolização arterial, insuficiência vascular, necrose, isquemia de extremidades, infecções, teste de Allen positivo e exérese de cisto sebáceo.

e) Manter o cateter o máximo de tempo possível, sendo indicada permanência de 20 dias.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

886. (AOC/2015/EBSERH)

Os cateteres arteriais periféricos permitem monitorar continuamente a pressão arterial e coletar sangue para análise de gases arteriais. Dentre os cuidados preconizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2013) para manutenção deste tipo de cateter, está incluído:

- a) utilizar transdutores reprocessáveis para monitorização da pressão arterial invasiva.

b) trocar rotineiramente os cateteres arteriais periféricos.

c) manter o cateter arterial periférico por no máximo 5 dias.

d) trocar transdutores descartáveis a cada 72 horas e os acessórios e soluções para flush a cada 24 horas.

e) realizar flush manual com solução heparinizada em seringa de 20ml a cada 4 horas.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

887. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
A correta manipulação do dreno de tórax pode acarretar ao paciente uma série de complicações que podem resultar em aumento da morbidade, prolongamento da hospitalização e, em alguns casos, a morte. É um cuidado adequado a esta condição clínica:

a) pinçar o dreno por alguns minutos enquanto realiza a troca do sistema de drenagem do dreno de tórax.

b) observar a oscilação da câmara de selo d'água.

c) fixar a extensão do dreno no berço ou na cama do paciente.

d) desprezar o conteúdo drenado a cada 6 horas, sem necessidade de registrar o volume ou aspecto deste.

e) manter o sistema de drenagem acima do nível do tórax.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

888. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

É/são cuidado(s) de Enfermagem na Sala de Exames da Hemodinâmica:

a) colocar o paciente em posição (sentado) para realizar o exame.

b) checar a identificação do paciente.

c) observar o traçado do ECG e trombolisar se necessário for.

d) cobrir o paciente para o exame, sem necessidade de campos estéreis.

e) realizar curativo simples não compressivo no local da punção ao término do procedimento.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

889. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Em relação ao Acolhimento, assinale a alternativa incorreta:

a) Caracteriza-se como um modo de operar os processos de trabalho em saúde, de forma a dar atenção a todos(as) que procuram os serviços de saúde.

b) O acolhimento é um espaço, ou um local, que pressupõe hora ou um profissional específico para fazê-lo.

c) Caracteriza-se em ouvir a necessidade da população por meio da escuta qualificada.

d) Assume no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas com os(as) usuários(as).

e) O acolhimento é uma ferramenta da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS – HumanizaSUS.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

890. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

São complicações das traqueostomias, exceto:

a) lesão do nervo facial.

b) obstrução prematura de vias aéreas (edema de glote reflexo).

c) falso trajeto da cânula traqueal.

d) broncoaspiração de sangue.

e) lesão do esôfago.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

891. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A incidência de infecção de trato urinário (ITU) associada ao uso de cateter vesical de demora pode ser reduzida por meio de qual das seguintes medidas?

a) Manutenção da urina alcalina.

b) Manutenção da ingestão hídrica adequada.

c) Promoção do cuidado do meato urinário com sabão antibacteriano duas vezes ao dia.

d) Troca do cateter de demora mensalmente (uma vez) e as bolsas de drenagem a cada duas semanas.

e) Realização da limpeza do meato uretral com antisséptico duas vezes ao dia.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

892. (IBFC/2017/EBSERH)
Sobre o direito à informação, em bioética, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() Na área da saúde, o acesso à informação constitui condição indispensável para que a pessoa possa consentir, de maneira esclarecida, aos procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos que sejam necessários segundo sua situação clínica.

() Cabe informação simples mas ininteligível e leal, ou seja, disposta dentro de padrões de entendimento de compreensão psicológica e intelectual do usuário, sendo necessário precisar especificações técnicas.

() O trabalhador tem o direito de receber informações quanto aos riscos físicos, químicos ou biológicos aos quais está exposto e sobre como prevenir possíveis danos ou proceder em caso de exposição accidental.

() O trabalhador não terá direito de receber informações quando houver segredo industrial, ou seja, esconde-se a quais substâncias os trabalhadores estão expostos, pois revelá-lo equivaleria a tornar a informação de conhecimento público, e, consequentemente, dar ciência à concorrência acerca dos componentes dos produtos.

- a) V,F,V,F
- b) V,V,V,V
- c) F,V,F,V
- d) V,V,V,F
- e) V,F,V,V

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

893. (IBFC/2017/EBSERH)
_____ é a quantidade em mg/kg de peso corpóreo necessária para provocar a morte de 50% de um lote de animais submetidos a um experimento. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Concentração Letal 50 (CL50)
- b) Dose Letal 50 (DL50)

- c) Dose Efetiva 50 (DE50)
- d) Concentração Efetiva 50 (CE50)
- e) Concentração Ativa 50 (CA50)

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

894. (IBFC/2017/EBSERH)
Sobre o consentimento livre e esclarecido, em bioética, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() O consentimento livre e esclarecido é a expressão formal do direito que toda pessoa autônoma e competente tem de consentir ou de recusar o que lhe é proposto, sejam atos de caráter diagnóstico, terapêutico ou profilático.

() É primordial que os profissionais de enfermagem compreendam que o consentimento livre e esclarecido não é um processo e sim um mero evento que ocorre de maneira isolada precedendo alguns procedimentos, em geral, os mais invasivos.

() Além de livre e esclarecido, o consentimento é renovável e irrevogável.

() Há algumas situações nas quais podem ser impostos limites à autonomia em nome da não maleficência ou da proteção da saúde da comunidade, como nas campanhas de vacinação ou de restrições ao fumo em ambientes fechados de uso coletivo.

A sequência correta é:

- a) V,V,V,V
- b) V,F,F,V
- c) F,V,F,V
- d) V,V,F,F
- e) V,F,V,F

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

895. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)

Um sistema de saúde é passível de questões e dilemas éticos que, se não resolvidos adequadamente, podem comprometer a atuação profissional, a qualidade do atendimento ou a autonomia dos usuários. Nesse sentido, sobre a hemotransfusão em pacientes Testemunhas de Jeová, assinale a alternativa correta.

a) Deve ocorrer em qualquer situação independentemente da existência ou não de risco de morte e aceitação do paciente.

b) No Brasil, ainda não existem instituições que ofereçam serviço de hemoterapia alternativa a esses pacientes.

c) Na iminência de risco de morte, caso seja realizada a hemotransfusão, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, essa ação pode ser considerada crime.

d) Caso esteja prescrita pelo médico, o enfermeiro deve realizar a hemotransfusão, independentemente da situação e consentimento do paciente.

e) Quando o procedimento for eletivo, com necessidade de hemotransfusão, compete ao hospital requisitar decisão jurídica para proceder a hemoterapia, caso ela seja recusada.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

896. (IBFC/2017/EBSERH)

Sobre o princípio da não maleficência, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() É a obrigação de “não causar danos”, de “não prejudicar” intencionalmente.

() O “dano” se restringe apenas aos aspectos físicos, como a dor, as incapacidades e a morte.

() Não se pode esquecer de que, em função da autonomia, o que representa dano para uma pessoa pode não ser para outra, pois os entendimentos de bem-estar e os interesses de cada um ou de grupos são distintos.

- a) V,V,V
- b) V,F,V
- c) V,F,F
- d) F,V,V
- e) F,V,F

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

897. (IBFC/2017/EBSERH)

Considerando os princípios da Bioética, é correto afirmar que fazer o bem aos outros significa:

- a) Benemerência
- b) Benevolência
- c) Autonomia
- d) Beneficência
- e) Indulgência

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

898. (IBFC/2016/EBSERH)

Você se depara com a seguinte situação: A família de um trabalhador vítima de traumatismo crânio-encefálico, em coma profundo, considerado sem prognóstico positivo por parte da equipe médica. Os familiares solicitam para essa equipe que não sejam realizados mais procedimentos invasivos em seu familiar. Do ponto de vista bioético, essa decisão:

a) Contrariou o princípio da autonomia do paciente

b) É concordante principalmente com o princípio da justiça

c) É concordante principalmente com o princípio da beneficência

d) É concordante principalmente com o princípio da não-maleficência

e) Contrariou o princípio da compaixão ao paciente

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

899. (IBFC/2016/EBSERH)

Não é um dos princípios fundamentais da Bioética a:

- a) Humanização.
- b) Não maleficência.
- c) Justiça.
- d) Autonomia.
- e) Beneficência.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

900. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Profissionais de saúde que atuam junto ao controle de infecção se deparam, diariamente, com dilemas éticos relacionados à assistência. Além disso, enfrentam reclamações e/ou denúncias e processos relacionados principalmente a falhas técnicas no diagnóstico e tratamento, erros administrativos e defeitos na organização e omissão de socorro.

À tentativa de alcançar procedimentos seculares consensuais para formular, analisar, e, talvez, atenuar os dilemas que a pesquisa médica e biológica moderna suscita, dá-se o nome de:

- a) Ética do Cuidado.
- b) Ética Profissional.
- c) Cuidado Holístico.
- d) Bioética.
- e) Ética Biomédica.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

901. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
É importante pautar a atuação profissional nos princípios bioéticos. Sobre a bioética, assinale a alternativa correta.

a) Respeito à autonomia: as pessoas têm o direito, em partes, de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida. Na atenção à saúde, as ações devem ser autorizadas pelos profissionais.

b) Beneficência: à obrigação ética de minimizar o benefício e maximizar o prejuízo.

c) Não maleficência: a finalidade é reduzir os efeitos adversos ou indesejáveis das ações diagnósticas e terapêuticas no ser humano.

d) Consentimento informado: qualquer procedimento deve ser informado, desde que o profissional ache necessário.

e) Justiça: todas as pessoas devem ser tratadas com igual consideração, porém a situação socioeconômica, cultural, étnica, orientação sexual, religião e profissão podem sugerir preferências de atendimento.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

902. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
É importante pautar a atuação profissional seguindo quais princípios bioéticos?

a) Respeito à autonomia: as pessoas têm o direito de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida. Na atenção à saúde, as ações não necessitam ser autorizadas pelas pessoas.

b) Beneficência: refere-se à obrigação ética de maximizar o prejuízo e minimizar o benefício.

c) Não maleficência: refere-se à ação que faz o mal: a finalidade é reduzir os efeitos adversos ou indesejáveis das ações diagnósticas e terapêuticas no ser humano.

d) Justiça e equidade: todas as pessoas devem ser tratadas com igual consideração. Por sua vez, as especificidades das pessoas e dos grupos devem ser levadas em conta, a partir do que os recursos e esforços devem ser direcionados em maior proporção àqueles que precisam mais ou estão em maior risco de adoecer/morrer, sem prejuízo da atenção à população como um todo.

e) Consentimento informado: a pessoa faz escolhas com autonomia, compreendendo o que será realizado, exceto em situação de risco de morte. Nesta situação, o profissional decide o melhor para os indivíduos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Exames Laboratoriais

903. (IBFC/2017/EBSERH)
A coleta de amostra de urina para urocultura é a obtenção de amostra de urina esterilizada. Considerando os cuidados de enfermagem com a coleta de amostra de urina para urocultura em crianças, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Encaminhar a amostra para urocultura ao laboratório logo após a coleta, não devendo ultrapassar 30 minutos após a micção urinária. Ou refrigerar a urina coletada, quando o tempo de envio for maior do que 30 minutos.

II. Realizar a antisepsia da região genital e trocar o saco coletor a cada 30 minutos, se não houver micção.

III. A coleta de amostra de urina das crianças deve ser realizada exclusivamente por meio de cateterismo vesical intermitente.

IV. Evitar o uso de soluções antissépticas alcoólicas ou iodadas na genitália de crianças

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
- e) Apenas as afirmativas III está correta

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

904. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre as recomendações para uso adequado do torniquete para punção e coleta de sangue venoso assinale a alternativa incorreta:

- a) Não usar torniquete, continuamente, por mais de um minuto.
- b) Ao garrotear, não pedir para o paciente fechar a mão.
- c) Posicionar o torniquete com o laço para cima.
- d) Não usar o procedimento “bater na veia com dois dedos” no momento da seleção venosa.

e) Posicionar o braço do paciente, inclinándolo para baixo, a partir da altura do ombro.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

905. (IBFC/2016/EBSERH)

A técnica na coleta de urina depende do tipo de exame solicitado. Sobre este assunto, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. Do tipo 1, sedimento quantitativo, não deve ser realizada a higiene prévia dos genitais externos e nem desprezar o primeiro jato da urina. Pode ser colhido a qualquer momento do dia.

II. Para o exame de cultura de urina, deve ser orientado a realização da higiene prévia dos genitais externos e desprezar o primeiro jato da urina, coletando o jato médio em recipiente esterilizado.

III. O teste de gravidez não requer cuidados específicos, deve-se coletar a amostra, identificar o frasco e encaminhar ao laboratório, com o pedido do exame.

IV. Glicosúria e cetonúria: quando realizada na unidade, verificar logo após a micção, imergir a fita reagente na urina e comparar com o padrão definido no rótulo do frasco, no tempo estipulado pelo fabricante.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II, III e IV, apenas
- b) I, II, III e IV
- c) I e II, apenas
- d) I, II e IV, apenas
- e) II e IV, apenas

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

906. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

No exame de cultura de urina, dentre os descritos a seguir, os procedimentos de coleta utilizados podem ser, exceto:

- a) jato médio.
- b) sonda vesical.
- c) sondagem de alívio.
- d) uso de coletores plásticos em crianças.
- e) frasco de urina de 24 horas.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

907. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

A coleta de sangue com seringas vem sendo substituída pelo uso de tubos a vácuo. Além da facilidade e rapidez, esse sistema contribui para a qualidade e preservação da amostra. Assim, o tubo com a cor da tampa cinza, que tem como anticoagulante o fluoreto de sódio, é o mais utilizado para a dosagem de:

- a) hematócrito.
- b) reticulócito.
- c) glicemia.
- d) tipagem sanguínea.
- e) sorologias.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

908. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Solicitou-se, ambulatorialmente, a um paciente a coleta do exame Urina tipo I. Para coleta desse exame, o técnico de enfermagem repassou corretamente ao paciente as seguintes orientações, exceto:

- a) desprezar o primeiro jato de urina.
- b) colher o jato médio da micção diretamente no frasco coletor.
- c) colher a primeira urina da manhã, preferencialmente.
- d) coletar a urina em 4 recipientes em intervalos de 6/6 horas.
- e) antes da coleta, realizar higiene íntima, enxaguar e secar.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

909. (IBFC/2016/EBSERH)

O diagnóstico precoce da gestação é fundamental para uma assistência pré-natal de qualidade. O diagnóstico é baseado em dados clínicos e testes laboratoriais. Considerando o diagnóstico laboratorial da gravidez, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I. É baseado na detecção de HCG (gonadotrofina coriônica humana).

II. O HCG é produzida pelo trofoblasto e aparece na circulação materna pouco após a implantação trofoblástica, tornando-se detectável no plasma e na urina de 8 a 9 dias após a ovulação.

III. O níveis de HCG crescem, exponencialmente, a partir da 10a semana, atingindo um pico por volta da 28a semana de gestação.

IV. Níveis plasmáticos de HCG maiores que 5 mUI/mL é considerado resultado positivo de gravidez.

- a) As frases I, II, III e IV estão incorretas.
- b) As frases I e II estão corretas
- c) Apenas a frase I está correta
- d) Apenas a frase IV está correta
- e) As frases III e IV estão corretas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

910. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre a indicação da coleta para a realização de exame de fezes, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Detectar presença de parasitos.
- II. Detectar infecção.
- III. Pesquisa de sangue oculto.
- IV. Detectar gordura nas fezes.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III, apenas
- b) I e III, apenas
- c) I, II, III e IV
- d) I e IV, apenas
- e) I apenas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

911. (IBFC/2016/EBSERH)

São meios recomendados para a cultura das amostras do trato respiratório:

- a) Salina Tamponada, Ágar MacConkey e Cari Blair.
- b) Ágar nutriente, Salina Tamponada e ágar sangue.
- c) Ágar sangue, Ágar MacConkey e Ágar chocolate.
- d) Ágar chocolate, Ágar Salmonella-Shigella (ss) e Ágar sangue.
- e) Cari Blair, Ágar Nutriente e Ágar Salmonella-Shigella (SS).

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

912. (AOCP/2015/EBSERH)

Homem de 44 anos de idade é encaminhado para avaliar função renal. Não apresenta queixas, seu exame físico mostra PA-130/80, peso 81kg e o restante do exame físico é normal. Exames laboratoriais:

Creatinina sérica=1,0 mg/dL, volume urinário de 24 horas= 320mL

Clearance de creatinina= 15mL/min

Qual observação é correta a respeito da coleta da urina para clearance de creatinina de 24 horas?

- a) O exame pressupõe que a coleta foi adequada, pois a diurese foi maior que 300mL/24 horas.
- b) O resultado de clearance indica que, certamente, o paciente é renal crônico.
- c) A coleta da urina toda deve ser confirmada, pois erro de coleta implica em falsos resultados.
- d) O valor de creatinina sérica de 1mg/dL é compatível com clearance de 15ml/min.
- e) É necessário um ultrassom de rins para confirmar o resultado do clearance.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

913. (AOCP/2015/EBSERH)

Uma paciente de 35 anos comparece à unidade de saúde para investigação de edema. Para a coleta de exame de urina rotina (tipo 1), ela deve receber a seguinte orientação:

- a) evitar realizar atividades físicas intensas nas 72 horas que precedem o exame.
- b) coletar urina por sondagem vesical caso a mesma não possa fazer a higiene de genitália.
- c) para mulheres não é necessário colher a urina do jato médio.
- d) a urina deve somente ser colhida pela manhã e em jejum.
- e) a paciente deveria colher urina de 24 horas, e não urina rotina (tipo 1).

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

914. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Assinale a alternativa correta.

- a) a atualização e a automação do laboratório.
- b) a adequação do processo para a rápida liberação dos resultados das culturas.
- c) a baixa qualificação de pessoal técnico para as diferentes funções.
- d) o empenho na construção de um banco de dados sob resistência bacteriana para orientar a terapêutica empírica das infecções hospitalares.
- e) a identificação do agente etiológico e a avaliação da sua susceptibilidade aos antimicrobianos.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Teorias da Enfermagem

915. (CESPE/2018/EBSERH)

Com referência às concepções teórico-práticas da assistência em enfermagem em políticas públicas, julgue o item subsequente.

A humanização da assistência em enfermagem pressupõe a separação de fatores humanos — como acolhimento e boas condições de trabalho — e fatores físicos — tais como novas tecnologias e melhores ambientes de cuidado.

- c) CERTO
- e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

916. (CESPE/2018/EBSERH)

Com referência às concepções teórico-práticas da assistência em enfermagem em políticas públicas, julgue o item subsequente.

A assistência humanizada em enfermagem deve se integrar ao trabalho em equipe multiprofissional, com valorização da transdisciplinaridade.

- c) CERTO
- e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

917. (CESPE/2018/EBSERH)

Com referência às concepções teórico-práticas da assistência em enfermagem em políticas públicas, julgue o item subsequente.

Uma das razões pelas quais se devem definir protocolos clínicos para a assistência humanizada em enfermagem é a de eliminar ações e intervenções desnecessárias.

- c) CERTO
- e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

918. (CESPE/2018/EBSERH)

Com referência às concepções teórico-práticas da assistência em enfermagem em políticas públicas, julgue o item subsequente.

Usuário com quadro clínico de alta vulnerabilidade deve receber atenção especial quanto à elaboração de plano terapêutico de forma conjunta por equipe multiprofissional.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

919. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item que se segue, acerca da sistematização da assistência de enfermagem.

A operacionalização do processo de enfermagem é possibilitada pela sistematização da assistência de enfermagem, que organiza o trabalho profissional.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

920. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item que se segue, acerca da sistematização da assistência de enfermagem.

Na atuação domiciliar, o processo de saúde de enfermagem difere da consulta de enfermagem: o primeiro é metodologicamente sistematizado, ao passo que a segunda, não.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

921. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item que se segue, acerca da sistematização da assistência de enfermagem.

A primeira etapa do processo de enfermagem é o planejamento, em que se delineiam os resultados esperados das ações ou intervenções de enfermagem.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

922. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item que se segue, acerca da sistematização da assistência de enfermagem.

O suporte teórico que fundamenta o processo de enfermagem deve ser capaz tanto de fornecer a base para a avaliação dos resultados quanto de orientar o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

923. (CESPE/2018/EBSERH)

Julgue o item que se segue, acerca da sistematização da assistência de enfermagem.

O registro formal de execução do processo de enfermagem será desnecessário quando o trabalho for realizado somente pelo enfermeiro responsável.

- c) CERTO
e) ERRADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

924. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A Teoria das Relações Interpessoais introduziu um novo paradigma para enfermagem, que se processa entre a enfermeira e o paciente. A autora dessa teoria é:

- a) Hildegard Peplau.
b) Wanda Horta
c) Madeleine Leininger.
d) Imogene King.
e) Dorothea Orem.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

925. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Os modelos teóricos e as teorias de enfermagem são ferramentas que possibilitam a operacionalização da sistematização da assistência de enfermagem por meio da aquisição de um referencial teórico. No Brasil, Wanda Horta, fundamentada na teoria da motivação humana de Maslow, elaborou o modelo conceitual:

- a) do déficit do autocuidado.
b) da ciência humanista da enfermagem.
c) das necessidades humanas básicas.
d) do cuidado transcultural.
e) do processo interpessoal.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

926. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Considerando as teorias de enfermagem, é correto afirmar que a Teoria Ambientalista foi proposta por

- a) Hildegard Peplau.
- b) Florence Nightingale.
- c) Madeleine Leiningher.
- d) Imogene King.
- e) Dorothea Orem.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Assistência de Enfermagem no Processo Nutricional

927. (IBFC/2017/EBSERH)

Sobre vitaminas, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () São substâncias orgânicas, necessárias em pequenas quantidades e essenciais para a vida, não sendo sintetizadas pelo corpo.
- () Normalmente, as vitaminas têm uma função construtora e não reguladora.
- () As vitaminas hidrossolúveis são A, D, E, K.
- () As vitaminas lipossolúveis, na maioria das vezes, são absorvidas com outros lipídios e estocadas em vários tecidos corpóreos.

A sequência correta é:

- a) V,F,F,V
- b) V,V,V,V
- c) F,V,V,V
- d) F,F,V,V
- e) F,V,F,V

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

928. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre a intoxicação alimentar causada pelo agente Estafilococo, assinale a alternativa correta.

- a) Início entre 12 e 24 horas após a ingestão do alimento contaminado.
- b) São bactérias presentes no ar, na poeira e no chão, disseminadas pelas moscas.
- c) A doença que esse agente causa é a Gastroenterocolite Aguda (Geca).
- d) A diarreia está sempre presente.
- e) É sempre mais leve em crianças e idosos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

929. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre os lipídios, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () Os alimentos que contêm lipídios são fontes de energia.
- () Os lipídios dos alimentos são convertidos no corpo humano em outros componentes essenciais de tecidos e podem ser transportados para depósitos de energia como reserva de gordura em tecido adiposo.
- () Mesmo com dietas pobres em lipídios, o corpo irá sintetizar grande quantidade de ácidos graxos a partir das proteínas e dos carboidratos.
- () Os lipídios são encontrados em carnes, produtos lácteos e em algumas frutas e vegetais, como abacate, nozes, amêndoas, soja e oliva.

- a) F,V,V,V
- b) V,V,V,V
- c) V,F,V,F
- d) F,V,F,V
- e) V,V,F,V

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

930. (IBFC/2016/EBSERH)

Assinale a alternativa que contemple um exemplo de fator que favorece o apetite.

- a) Condições patológicas
- b) Conforto físico
- c) Hipertermia
- d) Fraqueza
- e) Dor

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

931. (IBFC/2016/EBSERH)

Apesar das medidas individuais e populacionais adotadas no Brasil, mantém-se elevada a prevalência de anemia. Sobre os fatores que facilitam ou prejudicam a absorção do ferro, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. O ácido ascórbico facilita a absorção do ferro.
II. Os ácidos orgânicos presentes na casca do feijão, nos cereais crus e nos farelos prejudicam a absorção do ferro.

III. O cálcio prejudica a absorção do ferro.

IV. Os polifenóis facilitam a absorção do ferro.
Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) I apenas
- d) I e IV, apenas
- e) I e III, apenas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

932. (AOC/2015/EBSERH)

Em relação à ingestão de carambola (Averrhoa carambola) por pacientes renais crônicos podemos afirmar que:

- a) a carambola é principalmente nefrotóxica, podendo piorar a função renal de pacientes em hemodiálise.
- b) a carambola é rica em potássio e, como qualquer fruta, deve ser evitada por pacientes em diálise.
- c) a fruta carambola possui substância neurotóxica, e a ingestão pode levar a convulsões e coma.
- d) a ingestão de carambola imediatamente após à diálise pode ser liberada, pois a “toxina” será rapidamente removida.

e) o suco de carambola, diferentemente da fruta, pode ser usado por pacientes em hemodiálise sem oferecer riscos.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

933. (INSTITUTO AOC/2015/EBSERH)

Referente ao procedimento de Gastróclise, é correto afirmar que:

a) a alimentação parenteral é indicada quando o recém-nascido não tolera a gavagem simples ou quando ele apresenta refluxo gastroesofágico.

b) é a introdução de alimentos por meio de uma sonda gástrica introduzida pelo nariz até o duodeno através de bomba infusora gota a gota.

c) é o método fisiológico no qual alimentos são introduzidos por meio de uma sonda gástrica através de bomba infusora gota a gota.

d) é a administração de dieta utilizando a força da gravidade, consiste em técnica de alimentação via oral e de estimulação oral. É indicada para recém-nascidos que não suportam volumes maiores de uma única vez.

e) é o método não fisiológico, no qual os alimentos são introduzidos por meio de uma sonda gástrica através de bomba infusora gota a gota. É indicado para recém-nascidos que não suportam volumes maiores de uma única vez, recém-nascidos em ventilação mecânica ou recém-nascidos que apresentam refluxo gastroesofágico.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

934. (INSTITUTO AOC/2015/EBSERH)

Maria estava comendo uma torta de frango, comprada em uma padaria próxima a sua residência. Em certo momento, ao morder um pedaço da torta, sentiu uma forte dor no dente, e percebeu que havia mordido um pedaço de metal que estava no meio da torta. O alimento consumido por Maria estava contaminado, sendo essa contaminação classificada como:

- a) física.
- b) biológica.
- c) por agrotóxicos.
- d) de higiene.
- e) química.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

935. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Rejeitar latas de alimentos em conserva estufadas, adquirir alimentos de boa procedência e aquecer os alimentos até a fervura são medidas mais adequadas para a prevenção de qual doença transmitida por alimentos?

- a) Salmonelose.
- b) Shigelose.
- c) Botulismo.
- d) Colibacilose.
- e) Brucelose.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

936. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O verão e as festas de fim de ano aumentam o número de surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) no país. São recomendações para aumentar a segurança dos alimentos consumidos as citadas a seguir, exceto:

- a) lavar as mãos antes de iniciar a preparação dos alimentos e frequentemente, durante todo o processo.
- b) utilizar os mesmos equipamentos e utensílios, como facas ou tábuas de corte para alimentos crus e para alimentos cozidos.
- c) ao reaquecer os alimentos já cozidos, assegurar-se que todas as partes do alimento sejam aquecidas igualmente.
- d) não deixar alimentos cozidos por mais de duas horas à temperatura ambiente.
- e) não descongelar alimentos à temperatura ambiente. O descongelamento deve ser efetuado em condições de refrigeração à temperatura inferior a 5°C.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

937. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Para evitar as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), é indicado que após o alimento ser preparado, o prazo máximo de consumo seja de:

- a) 12 horas, se mantido em temperatura ambiente.
- b) 24 horas, se mantido em temperatura ambiente.
- c) 05 dias, mesmo que conservado sob refrigeração.
- d) 12 dias, se conservado sob refrigeração.
- e) 02 horas, mesmo se conservado sob refrigeração.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

938. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A eficácia da terapia nutricional está relacionada com a conservação e a manutenção das vias de acesso, sendo necessária uma avaliação constante do paciente submetido à terapia nutricional, incluindo controle de sinais vitais, que possa indicar sinais de infecção ou alteração metabólica. As vias de administração da dieta enteral são:

- a) ileostomia; nasoenteral; gastrostomia.
- b) nasogástrica; nasoenteral; gastrostomia; colostomia.
- c) nasoenteral; gastrostomia; jejunostomia; colostomia.
- d) gastrostomia; jejunostomia; nefrostomia.
- e) nasogástrica; nasoenteral; gastrostomia; jejunostomia.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

939. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A maioria dos nutrientes, vitaminas e minerais são absorvidos no:

- a) estômago.
- b) íleo.
- c) jejuno.
- d) duodeno.
- e) ceco.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Anatomia

940. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

São classificadas em congênitas e adquiridas por parada do desenvolvimento da parede abdominal e obliteração do anel umbilical, respectivamente. O enunciado refere-se a hérnias:

- a) umbilicais.
- b) incisionais.
- c) inguinais.
- d) retais.
- e) torácicas.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

941. (IBFC/2016/EBSERH)

Considerando a anatomia cardíaca e coronariana, analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I. O coração adulto é, aproximadamente, do tamanho de um punho fechado, semelhante a um cone. Apresenta as dimensões: altura entre 13 e 15 centímetros (cm), largura, em torno de 9 cm e espessura de 6 cm.

II. O coração possui três camadas: pericárdio, miocárdio e endocárdio. O miocárdio é a camada mais espessa do coração, sendo responsável pela função de bombear o sangue.

III. Os átrios são separados pelo septo interatrial. Na parte posterior do átrio direito encontram-se os ósteos das veias pulmonares e no átrio esquerdo, os ósteos da veia cava.

IV. Os vasos das coronárias constituem um conjunto de artérias e veias responsáveis pela irrigação e oxigenação do coração. O óstéo das coronárias situa-se na base da veia cava e ao lado da aorta.

- a) As afirmativas II, III e IV estão corretas
- b) As afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- d) As afirmativas III e IV estão corretas
- e) Apenas a afirmativa II está correta

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

942. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre a osteomielite, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() A osteomielite é uma infecção do osso, que se torna infectado por uma extensão da infecção dos tecidos moles, como por exemplo úlcera vascular.

() Uma das causas da osteomielite é a contaminação óssea direta a partir da cirurgia óssea, fratura exposta ou lesão traumática.

() A osteomielite não ocorre por disseminação hematogênica.

() Os pacientes que se encontram em alto risco de osteomielite incluem apenas os mal nutridos ou obesos.

- a) F,V,F,V
- b) V,V,V,V
- c) F,F,V,V
- d) V,V,F,F
- e) V,F,V,F

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

943. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Os principais componentes do Sistema Cardiovascular são:

- a) coração, fígado e rins.
- b) coração, pulmões e artérias.
- c) coração, pulmões e veias.
- d) coração e vasos sanguíneos.
- e) coração, pâncreas e pulmões.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

944. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Os principais componentes do Sistema Respiratório são:

- a) cavidades nasais, faringe e laringe.
- b) cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e pulmões.
- c) cavidades nasais, faringe, laringe e coração.
- d) cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e esôfago.
- e) cavidades nasais, faringe, esôfago e pulmões.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

945. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O médico romano e filósofo (129 - D.C) que estudou anatomia e fisiologia do sistema nervoso e concluiu que este era a sede da alma denomina-se:

- a) Galeno.
- b) Hipócrates.
- c) Sócrates.
- d) Empédocles.
- e) Kraepelin.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

946. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O esôfago penetra no abdome através de uma abertura no diafragma e desemboca a sua extremidade inferior dentro da parte superior do estômago;

Aparecem na linha média do abdome, como resultado do afastamento dos músculos retos abdominais; Porção do intestino ou uma estrutura da cavidade abdominal que atravessa os forâmens inguinais; Surgem na zona de junção entre a coxa e a parte inferior do abdome e pode estender-se até os testículos. Essas definições são, respectivamente, de:

- a) Hérnia epigástrica; Hérnia de hiato; Hérnia inguinal; Hérnia inguinoescrotal.
- b) Hérnia inguinoescrotal; Hérnia de hiato; Hérnia epigástrica; Hérnia inguinal.
- c) Hérnia de hiato, Hérnia epigástrica; Hérnia inguinal; Hérnia inguinoescrotal.
- d) Hérnia de hiato, Hérnia inguinal; Hérnia epigástrica; Hérnia inguinoescrotal.
- e) Hérnia epigástrica; Hérnia inguinal; Hérnia de hiato; Hérnia inguinoescrotal.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

947. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A demarcação do local do estômago é fator essencial para a reabilitação da pessoa estomizada. Quais são, dentre os citados a seguir, os aspectos mais importantes a serem considerados na realização desse procedimento?

- a) A localização do músculo reto-abdominal e a operação a ser realizada.

b) A localização do músculo pélvico e a presença de aparelhos ortopédicos.

c) A localização do músculo reto-abdominal e o hábito intestinal prévio.

d) A localização do músculo reto-abdominal e o tipo de alimentação.

e) A localização do músculo pélvico e a atividade laboral desempenhada.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde

948. (IBFC/2017/EBSERH)

Assinale a alternativa que contemple o grupo ao qual pertencem os resíduos potencialmente infectados:

- a) D.
- b) A.
- c) C.
- d) B.
- e) E.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

949. (IBFC/2017/EBSERH)

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) a ser elaborado nas diversas instâncias deverá ter como base os resíduos gerados em suas centrais.

Sobre os resíduos resultantes de atividade de vacinação, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. Os resíduos classificados no Grupo D são aqueles resultantes da administração de imunobiológicos que contêm, na formulação, resíduos com micro-organismos vivos atenuados, incluindo frascos de imunobiológicos com expiração do prazo de validade, frascos vazios com restos do produto ou conteúdo inutilizado.

II. Os resíduos provenientes de campanhas e de vacinação extramuros ou intensificações, quando não puderem ser submetidos ao tratamento nos locais de geração, devem ser recolhidos e devolvidos às secretarias de Saúde competentes, em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura, vazamento com tampa e, devidamente identificados, de forma a garantir o transporte seguro até a unidade de tratamento.

III. Os resíduos gerados a partir de atividades da Rede de Frio, como as caixas de poliuretano e/ou poliestireno expandido (isopor), as bobinas reutilizáveis, os papéis e derivados, são classificados no Grupo A1 e devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final.

Estão corretas as afirmativas.

- a) II, apenas
- b) I e II, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e III, apenas
- e) I, II e III

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

950. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Em relação à Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde estabelecidos pelo Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), assinale a alternativa correta.

- a) Grupo A: são medicamentos apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos contendo metais pesados.
- b) Grupo C: são placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas (membros), tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue.
- c) Grupo D: são sobras de alimentos e do preparo de alimentos, resíduos das áreas administrativas.
- d) Grupo E: são materiais resultantes de atividades humanas em serviços de medicina nuclear e radioterapia.
- e) Grupo B: são lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

951. (IBFC/2016/EBSERH)
Sobre o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Grupo A: São os materiais perfurocortantes ou escarificantes (seringas, agulhas, bisturis) e todos os utensílios de vidro quebrados.
- II. Grupo B: São os resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente.
- III. Grupo C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
- IV. Grupo E: São os resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e IV, apenas.
- d) I, II e III, apenas.
- e) III e IV, apenas.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

952. (IBFC/2016/EBSERH)
Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) classificados como Grupo A são:

- a) Rejeitos radioativos.
- b) Substâncias químicas.
- c) Riscos biológicos.
- d) Rejeitos perfurocortantes.
- e) Materiais perfurocortantes.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

953. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
Entende-se como resíduos industriais aqueles provenientes dos processos industriais, na forma sólida, líquida ou gasosa ou combinação dessas formas, e que por suas características físicas, químicas ou microbiológicas não se assemelham aos resíduos domésticos. Sobre esses resíduos, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os resíduos líquidos e sólidos produzidos por processos e operações industriais devem ser adequadamente coletados, acondicionados, armazenados, transportados, tratados e encaminhados à adequada disposição final pela empresa.
- b) Os resíduos industriais devem ter destino adequado sendo proibido o lançamento ou a liberação no ambiente de trabalho de quaisquer contaminantes que possam comprometer a segurança e a saúde dos trabalhadores.

- c) Os resíduos sólidos e líquidos de alta toxicidade e periculosidade devem ser dispostos com o conhecimento, aquiescência e auxílio de entidades especializadas/públicas e no campo de sua competência.
- d) A empresa deve buscar a redução da geração de resíduos por meio da adoção das melhores práticas tecnológicas e organizacionais disponíveis.
- e) Os trabalhadores envolvidos na coleta, manipulação, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição de resíduos devem procurar as entidades de classe para capacitação, de forma continuada, sobre os riscos e as medidas de controle adequados.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

954. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 Sobre resíduos sólidos urbanos, assinale a alternativa correta.

- a) Metal pesado é um termo coletivo para um grupo de metais e metalóides que apresenta densidade atômica maior que 0,5 g/cm³.
- b) Lâmpadas a led contêm mercúrio que é liberado na forma líquida para a atmosfera quando tem o vidro quebrado.
- c) Como componentes biológicos presentes nos resíduos urbanos, destacam-se: *Escherichia coli*, *Staphylococcus sp.* e *Pseudomonas sp.*
- d) Componentes eletrônicos de alta tecnologia (chips, fibra ótica, semicondutores, tubos de raios catódicos, baterias), frequentemente, liberam arsênio e berilo, benzeno, selênio e zinco.
- e) Frascos pressurizados quando rompidos liberam ar atmosférico, não poluindo o meio ambiente.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

955. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 De acordo com a classificação da ANVISA, para Resíduos Sólidos, os rejeitos radioativos são classificados em qual dos grupos a seguir?

- a) Grupo A.
 b) Grupo B.
 c) Grupo C.
 d) Grupo D.
 e) Grupo E.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

956. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 Sobre a coleta e transporte dos Resíduos de Serviços de Saúde, assinale a alternativa correta.

- a) Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia e nas salas de parto não necessitam de tampa para vedação.

- b) Para armazenamento temporário é permitida a disposição direta dos sacos sobre o piso ou sobrepiso.
- c) A coleta deve ser feita separadamente, de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes específicos a cada grupo de resíduos.
- d) O veículo coletor deve sofrer limpeza e desinfecção simultânea em postos de abastecimento comuns, ao fim de cada turno de trabalho.
- e) É vedado, em quaisquer circunstâncias, o encaminhamento direto ao armazenamento para coleta externa, dispensando assim o armazenamento temporário.

957. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 De acordo com a RDC ANVISA nº 306/04 e Resolução CONAMA nº 358/05, os RSS são classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E. Ao elaborar o PGRSS, a enfermeira Marina descreveu os resíduos pertencentes a cada um desses grupos. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Grupo A - lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares.
- b) Grupo B - medicamentos apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos contendo metais pesados, dentre outros.
- c) Grupo C - sobras de alimentos e do preparo de alimentos, resíduos das áreas administrativas etc.
- d) Grupo D - quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, como os serviços de medicina nuclear e radioterapia etc.
- e) Grupo E - placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas (membros), tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outras.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

958 (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)
 O enfermeiro Valmir, do SCIH de um Hospital Universitário, precisa adequar as embalagens para os RSS gerados neste estabelecimento. De acordo com os procedimentos recomendados para o acondicionamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Acondicionamento do grupo A.
2. Acondicionamento do grupo B.
3. Acondicionamento do grupo C.
4. Acondicionamento do grupo D.
5. Acondicionamento do grupo E.

() Devem ser acondicionados em sacos impermeáveis, de acordo com as orientações dos serviços locais de limpeza urbana.

() O pré-acondicionamento destes resíduos deve ser em recipiente rígido, estanque, resistente à punctura, ruptura e vazamento, impermeável, com tampa contendo simbologia da substância. Eles devem ser acondicionados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso.

() Os sacos para estes resíduos devem estar contidos em recipiente lavável, resistente e impermeável, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e também devem ser identificados com a simbologia das substâncias infectantes.

() Devem ser acondicionados com base nas recomendações específicas do fabricante que se encontra nas etiquetas de cada produto. Devem ser acondicionados em recipientes de material rígido para cada tipo de substância química perigosa (Corrosivas, Tóxicas, Explosivas e Inflamáveis.)

() Devem ser acondicionados em recipientes de chumbo, com blindagem adequada ao tipo e ao nível de radiação emitida, com simbologia de radioativo.

- a) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.
- b) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.
- c) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.
- d) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- e) 5 – 3 – 1 – 4 – 2.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

959. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)

O declínio físico apresenta-se como uma das principais características do envelhecimento e pode ser consequência de processos distintos: a senescência e a senilidade. Sobre a senescência, é correto afirmar que:

- a) se caracteriza principalmente pela perda de capacidade de memorização.
- b) se caracteriza por afecções que acometem o indivíduo idoso.
- c) acomete os idosos, mas também pode estar presente em jovens.
- d) é o envelhecimento fisiológico do organismo.
- e) também é conhecida como demência.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

960. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Sobre as orientações que o profissional de saúde deve fornecer ao paciente quanto à prevenção de quedas de pessoas idosas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Se na casa existem escadas, deve-se colocar um corrimão fixado à parede ou ao chão para apoio.
- II. Deve-se remover os tapetes soltos no chão, dar preferência aos tapetes que sejam antiderrapantes e fixos ao chão.
- III. Deve-se colocar tudo que se precisa ao alcance e evitar subir em banquinhos ou escadas para pegá-lo.
- IV. Deve-se cuidar do piso da casa para evitar as quedas, utilizando cera ou outro produto que dê polimento.
- V. É importante que se coloque no banheiro barras de apoio ao lado do vaso e dentro do box.

- a) Apenas I, II, III e V.
- b) Apenas I, II, IV e V.
- c) I, II, III, IV e V
- d) Apenas II, III, IV e V.
- e) Apenas I, III, IV e V.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

961. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O Vulnerable Elders Survey (VES-13) ou Protocolo de Identificação do Idoso Vulnerável é um instrumento simples e eficaz, capaz de identificar o idoso vulnerável (aquele indivíduo que tem risco de declínio funcional ou morte em dois anos). Com relação ao VES-13, é correto afirmar que:

- a) sua aplicação exige o uso de dados administrativos ou de sistemas operacionais complexos ou informações médicas específicas, como doenças, medicamentos ou exames laboratoriais.
- b) é composto por 13 itens. Cada item recebe uma determinada pontuação e o somatório final pode variar de zero a seis pontos.
- c) a pontuação igual ou superior a três significa um risco 4,2 vezes maior de declínio funcional ou morte em dois anos, quando comparado com idosos com pontuação menor ou igual a dois, independentemente do sexo e do número ou tipo de morbidades presentes.

d) a idade é o principal fator de risco para o desenvolvimento de incapacidades e óbito e as alterações associadas ao envelhecimento por si só não estão associadas à maior vulnerabilidade.

e) a somatória dos pontos finais da VES-13 entre 3 e 6 corresponde à classificação do idoso robusto.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

962. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

A diminuição das capacidades sensorio-perceptivas, que ocorre no processo de envelhecimento, pode afetar a comunicação das pessoas idosas, e se não for adequadamente administrada, poderá levar ao isolamento do indivíduo. Em relação ao processo de comunicação com a pessoa idosa, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas:

I. O declínio da audição é comumente acompanhado de diminuição na compreensão de fala por parte do idoso, dificultando sua comunicação com outras pessoas.

II. Ao conversar com pessoas idosas, deve-se falar de forma clara e pausada e aumentar o tom de voz somente se for realmente necessário.

III. A perda da capacidade de escrever, falar, ler ou entender o que os outros dizem interfere no desempenho social do idoso sem comprometer sua identidade, autoestima e qualidade de vida.

IV. A comunicação não verbal tem por objetivo completar, substituir ou contradizer a comunicação verbal, além de não deixar transparecer os sentimentos das pessoas.

V. O tipo de linguagem que se estabelece com os idosos depende da observação da sua habilidade cognitiva e de seu nível de orientação, considerando seus déficits sensoriais e o uso de medicações.

- a) Apenas III e IV.
- b) Apenas I, II e V.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas I e IV.
- e) I, II, III, IV e V.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

963. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

As quedas estão entre os principais eventos adversos a serem prevenidos em instituições de saúde. Entre os pacientes idosos hospitalizados ou em cuidados domiciliares, as quedas estão entre as causas mais comuns de injúrias, provocando traumas teciduais, fraturas e até mesmo a morte. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta:

- a) As quedas diminuem o tempo de hospitalização e os gastos nos serviços de saúde.
- b) As condições do ambiente, como uso de piso antiderrapante e grades nos leitos, contribuem para a ocorrência de quedas.
- c) Um adequado quadro de pessoal de enfermagem tem influência positiva para a redução das taxas de quedas entre pacientes hospitalizados.

d) O índice de quedas de pacientes em um serviço de saúde não faz parte dos chamados indicadores de segurança do paciente.

e) A equipe de enfermagem não tem um papel importante na vigilância dos pacientes e na identificação de fatores de risco dos pacientes e do ambiente que contribuem para a ocorrência de quedas.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

964. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Existe uma elevada incidência de fraturas de quadril entre as pessoas idosas que possuem ossos frágeis, principalmente, em virtude da osteoporose. A meta do tratamento cirúrgico destas fraturas é obter fixação satisfatória de modo que o paciente possa ser mobilizado rapidamente evitando, assim, complicações secundárias. São exemplos de fixação interna para as fratura de quadril:

a) Conjunto de Pinos de Massie; Pino de Jewett com placa de superposição; Fixador Ilizarov.

b) Pino de Smith-Peterson com placa de McLaughlin; Fixador Ilizarov; Pino de Neufeld; Conjunto de Pinos de Massie; Placa intertrocanterica de Moe.

c) Pino de Smith-Peterson com placa de McLaughlin; Pino de Jewett com placa de superposição; Pino de Neufeld; Conjunto de Pinos de Massie; Fixador Ilizarov.

d) Fixador Ilizarov; Pino de Jewett com placa de superposição; Pino de Neufeld; Conjunto de Pinos de Massie; Placa intertrocanterica de Moe.

e) Pino de Smith-Peterson com placa de McLaughlin; Pino de Jewett com placa de superposição; Pino de Neufeld; Conjunto de Pinos de Massie; Placa intertrocanterica de Moe.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

965. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

O teste rápido para avaliação cognitiva da pessoa idosa consiste em:

a) solicitar à pessoa que faça cálculos de subtração, soma e divisão e avaliar as respostas comparando a um questionário específico.

b) aplicar um questionário com as principais atividades realizadas durante o dia e repeti-lo após dois dias.

c) solicitar à pessoa que repita o nome dos objetos: mesa, maçã e dinheiro. Após 3 minutos, pedir que os fale novamente.

d) observar como a pessoa idosa utiliza os meios de transporte e tarefas domésticas.

e) medir a habilidade da pessoa em desempenhar suas atividades cotidianas de forma independente.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

966. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Assinale a afirmativa que representa uma das principais causas de morbimortalidade por causas externas em pessoas idosas.

a) Neoplasias.

b) Doenças do aparelho circulatório.

c) Quedas.

d) Diabetes.

e) Doenças infectocontagiosas.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

967. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Em relação às alternativas a seguir, qual delas não condiz com as diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa?

a) Promoção do envelhecimento ativo e saudável.

b) Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa.

c) Estímulo às ações setoriais, visando à fragmentação da atenção.

d) Estímulo à participação e fortalecimento do controle social.

e) Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Acidentes com Animais Peçonhentos

968. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)

Homem de 54 anos deu entrada no Pronto-Socorro, com história de picada por serpente em região maleolar de pé direito há um dia, apresentando dor e edema endurecido até a altura do joelho do membro afetado, infartamento ganglionar em região inguinal direita e diurese hematúrica. Após avaliação do paciente, este recebeu o diagnóstico de picada por jararaca, sendo-lhe indicado administração de soro

- a) anticrotálico.
- b) antibotrópico.
- c) antilaquético.
- d) antielapídico.
- e) antiloxoscélico.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

969. (IBFC/2017/EBSERH)

Os acidentes por serpentes de importância médica no Brasil são divididos em quatro tipos. Assinale a alternativa que apresenta a serpente responsável pelo acidente Elapídico:

- a) Surucucu-pico-de-jaca.
- b) Coral verdadeira.
- c) Cobra-verde.
- d) Sucuri.
- e) Jibóia.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

970. (IBFC/2016/EBSERH)

Sobre acidentes mais comuns causados por aranhas e escorpiões, analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

() O veneno da aranha marrom tem ação proteolítica. O cuidado e tratamento requerem soro antiloxoscélico e soro antiaracnídico.

() O veneno da aranha armadeira tem ação proteolítica. É comum o acidente no momento de calçar o sapato ou a bota.

() O veneno da aranha viúva negra tem ação neurotóxica. O cuidado e tratamento controle da dor com analgésico potente, anestésico tipo lidocaína e soro antilatrodéctico.

() O veneno dos escorpiões preto e amarelo tem ação neurotóxica. Recomenda-se aplicar compressas mornas e administrar analgésicos para alívio da dor até chegar a um serviço de saúde.

() As aranhas caranguejeiras e as tarântulas, apesar de muito comuns, causam envenenamento grave.

- a) V,F,V,V,F.
- b) V,V,V,V,V.
- c) F,V,F,F,V.
- d) F,V,V,V,F.
- e) V,V,V,V,F.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

971. (IBFC/2016/EBSERH)

Assinale a alternativa que contemple um exemplo de aranha cujo veneno tem ação proteolítica:

- a) Armadeira
- b) Marrom
- c) Viúva Negra
- d) Caranguejeira
- e) Tarântula

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

972. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Na administração de Soro Antiescorpionico (SAEes) ou Soro Antiaracnídico (SAAr), em casos de acidentes com escorpiões, quando o paciente apresenta manifestações clínicas graves, é necessário administrar:

- a) de duas a três ampolas de Soro Antiescorpionico ou Soro Antiaracnídico por via intravenosa.
- b) de quatro a sete ampolas de Soro Antiescorpionico ou Soro Antiaracnídico por via intramuscular.
- c) de quatro a seis ampolas de Soro antiescorpionico ou Soro Antiaracnídico por via intravenosa.
- d) uma ampola de Soro Antiescorpionico ou Soro Antiaracnídico por via intravenosa.
- e) duas ampolas de Soro Antiescorpionico ou Soro Antiaracnídico por via intramuscular.

973. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Após aplicação do soro antirrábico heterólogo, é necessário que o paciente seja observado pelo prazo de:

- a) 24 horas.
- b) 12 horas.
- c) 10 minutos.
- d) 30 minutos.
- e) 2 horas.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

974. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Acidentes por animais peçonhentos contribui para a difusão de conhecimentos acerca de um agravo usualmente pouco conhecido entre os profissionais de saúde. Quanto às medidas de prevenção e controle de acidentes por animais peçonhentos, assinale a alternativa correta.

a) Orientar a retirada de folhagens e plantas às áreas de estocagem de grãos e dedetizar quinzenalmente.

b) Realizar educação em saúde entre a população, orientando a limpeza periódica do Peridomicílio, tapar buracos e frestas de parede, inspecionar as roupas de cama antes de deitar.

c) Realizar educação em saúde, notificar os agravos, levar junto ao atendimento o animal causador para ser sacrificado e assim investigar o grau de toxicidade.

d) Estimular a população em relação à reciclagem de certos materiais, inclusive os resíduos de saúde.

e) Manter em sigilo os casos de infestação dos animais peçonhentos para que não haja manifestação da população.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

975. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Considerando as características epidemiológicas dos acidentes com aranhas marrons, é correto afirmar que a região do Brasil, cuja sua incidência é maior, é:

- a) a região Norte.
- b) a região Nordeste.
- c) a região Centro-oeste.
- d) o Distrito Federal.
- e) a região Sul.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Assistência de Enfermagem a Queimados

976. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)

Rapaz, 21 anos, após queimadura com água fervente, recebeu o primeiro atendimento pelo SAMU. Verificou-se presença de lesão térmica de segundo grau em face, pescoço, região anterior de hemitórax E e MSE, equivalente a:

- a) 18% de SCQ.
- b) 27% de SCQ.
- c) 36% de SCQ.
- d) 45% de SCQ.
- e) 54% de SCQ.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

977. (IBFC/2016/EBSERH)

Assinale a alternativa correta em relação à classificação das queimaduras.

a) Leve com lesões em até 20% da superfície corporal.

b) Pequeno queimado quando há o comprometimento de até 10% da superfície corporal.

c) Médio queimado com lesões em até 30 % da superfície corporal.

d) Grande apresenta lesões em até 40% da superfície corporal.

e) Grande queimado quando as lesões estão acima de 40% da superfície corporal.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

978. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

As queimaduras podem ser classificadas de acordo com a sua causa, profundidade, extensão, localização e gravidade. Quanto ao atendimento de pessoas vítimas de queimaduras de segundo grau, assinale a alternativa correta:

a) Irrigar a área afetada com solução PVPI, para evitar infecção local.

b) Aplicar gel hidratante com alginato 85g.

c) Aplicar pomadas à base de xilocaína, a fim de minimizar a dor local.

d) Fazer a remoção mecânica de roupas ou tecidos aderidos ao ferimento e irrigar o local com compressas geladas.

e) Resfriar o local afetado com soro fisiológico ou água à temperatura ambiente.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

Clínica Médica

979. (IBFC/2017/EBSERH)

Assinale a alternativa que contemple a vitamina que é importante no tratamento de anemia perniciosa e para o funcionamento normal do metabolismo das células, principalmente as do trato gastrointestinal, medula óssea e tecido nervoso. Ela é relativamente resistente ao calor e é sensível à luz.

- a) A
- b) D
- c) C
- d) B₁₂
- e) E

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

980. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Durante o internamento de uma paciente de 32 anos, foi constatado que ela apresentava um quadro de anemia megaloblástica. Sobre esse quadro, é correto afirmar que é caracterizado por:

- a) aumento dos níveis de creatina.
- b) carência de ferro sérico sanguíneo.
- c) deficiência de vitamina do complexo B12 e folatos.
- d) baixa de TGO e TGP.
- e) aumento dos níveis tireoidianos.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

981. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Paciente de 25 anos é internada na Unidade de Clínica Médica e a enfermeira de plantão, ao iniciar o exame físico de admissão, observa:

- Av. neurológica: sem alterações, ECGw: 15; - Pele e anexos: íntegros com moderada palidez cutânea;

- Mucosas descoradas: +++/4+;

- Sem edemas, pulsos palpáveis;

- SSVV: FC: 110 bpm; FR: 22 irpm; PA: 120X70 mmHg.

Com base nesses dados adicionais, espera-se quais alterações nos exames laboratoriais?

a) Diminuição de plaquetas, pois deve haver um sangramento interno e por isso a paciente apresenta palidez e mucosas descoradas.

b) Hemoglobina apresentando valor inferior ao valor normal, desencadeando o processo anêmico.

c) Leucometria deve estar aumentada devido ao processo de infecção instalada.

d) Coagulograma alterado, provocando sangramento e como consequência os sinais clínicos observados.

e) Nenhuma alteração no hemograma diante dos sinais clínicos observados.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

982. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Considerando o sistema ABO para as transfusões sanguíneas, os antígenos ABO estão presentes no seguinte componente do sangue:

- a) hemácias.
- b) plasma.
- c) plaquetas.
- d) leucócitos.
- e) blastos.

<input checked="" type="checkbox"/>	TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/>	REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/>	RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/>	ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

983. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Paciente de 35 anos, 43º DIH – Pancitopenia a/e, comunicativa, deambulando. Alimentação nula às refeições, perda ponderal de 5 quilos em 5 dias, IMC: 20. Refere não conseguir alimentar-se devido a úlceras e sangramento na boca desde um tratamento dentário. Ao exame físico da boca: mucosa hidratada, corada, apresentado ressecamento importante de lábios com fissuras em lábio inferior; apresenta sangramento gengival ativo; gengivas retraídas, edemaciadas e hiperemiadas. Eliminações fisiológicas: 2 episódios de fezes líquidas com presença de sangramento ativo. Diurese: hematúria, 2.100ml/24hs. Exames laboratoriais, coletados após 2 horas de infusão de Hemocomponentes: 2U de Concentrados de Glóbulos vermelhos; 07 U Plaquetas: Hb: 10.2g/dl; Ht: 40%; Plaquetas: 1000 mm³.

A partir do raciocínio sobre o mecanismo de coagulação, o sangramento que a paciente está apresentando deve-se prioritariamente à:

- a) ineficácia na fase 2 da cascata de coagulação.
- b) ineficácia na fase 1 da cascata de coagulação.
- c) deficiência na vasoconstrição reflexa.
- d) deficiência do fibrinogênio, envolvido na coagulação dos casos graves de plaquetopenia.
- e) ineficácia na fase final da cascata de coagulação.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

984. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Em um Hospital Universitário, foi realizado um estudo pelos enfermeiros da UTI Pediátrica avaliando que a média aritmética do tempo de permanência de um paciente nesse local era de 16,8 dias. De acordo com a bioestatística, essa se trata de uma medida de:

- a) probabilidade.
- b) variação.
- c) assimetria.
- d) posição.
- e) comparação.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

985. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Foi realizado um estudo em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Esse estudo teve como objetivo analisar o dimensionamento de pessoal, utilizando como instrumento de coleta de dados um questionário estruturado, fechado, sendo os resultados apresentados em gráficos. Dentre as metodologias de pesquisa, a que mais se aproxima do enunciado é a pesquisa:

- a) de natureza quantitativa.
- b) longitudinal.
- c) fenomenológica.
- d) dialética.
- e) retrospectiva exploratória.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

986. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

No limite entre teoria e filosofia da educação, o pensamento de Paulo Freire tem colaborado de forma significativa na construção de uma educação reflexiva na enfermagem, um dos principais conceitos anunciados por Freire, que são considerados mais significativos para a Enfermagem, é:

- a) fragmentação.
- b) teorização.
- c) opressão.
- d) diálogo.
- e) mistificação.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

987. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Considerando o conceito da distanásia (morte com sofrimento que poderia ser evitado), os profissionais devem reconhecer os limites da medicina e evitar o excesso de tratamento ou tratamento não adequado, seguindo os princípios citados a seguir, exceto:

- a) respeito pela autonomia.
- b) a beneficência.
- c) a não maleficência.
- d) a justiça.
- e) a imprudência.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

988. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Considerando a conceituação de cuidados paliativos, é correto afirmar que eles são prestados:

a) por meio do atendimento ao paciente em estágio terminal.

b) por meio do atendimento ao paciente nos seus últimos dias de vida.

c) por meio do atendimento ao indivíduo fora de possibilidade de cura, não necessariamente com morte iminente.

d) por meio do atendimento destinado somente à especialidade de Oncologia quando o paciente não tem mais prognóstico.

e) por meio de toda e qualquer intervenção destinada ao paciente oncológico.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

989. (INSTITUTO AOCP/2016/EBSERH)

Em relação ao programa de prevenção, tratamento e controle do tabagismo, assinale a alternativa correta.

a) As ações educativas são estratégias acessíveis, podendo ser pontuais e mais efetivas quando se tornam ações permanentes, por meio de educação continuada realizada apenas nos serviços de saúde.

b) A abordagem psicológica de base fenomenológica-existencial auxilia na detecção de situações de risco de recaída e no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento.

c) A população-alvo desse programa será somente indivíduos tabagistas com idade superior a 18 anos.

d) A detecção de situações de risco de recaída e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento são componentes essenciais durante a abordagem do usuários de tabaco.

e) A farmacoterapia deve ser evitada e somente deve ser utilizada, em situações bem definidas, para aqueles usuários que têm dúvida em parar de fumar.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

990. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Um paciente admite usar “Cristal”. Essa droga é classificada como um:

a) depressor.

b) estimulante.

c) alucinógeno.

d) antidepressivo.

e) anabolizante.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

991. (INSTITUTO AOCP/2017/EBSERH)

Paciente masculino, 56 anos, está com um quadro de disfunção erétil, que consiste na incapacidade de obter e/ou manter a ereção peniana suficiente para uma relação sexual satisfatória. Qual das substâncias apresentadas a seguir é a única que não causa problemas nesse quadro de disfunção?

a) Álcool.

b) Antidepressivos.

c) Anti-hipertensivos.

d) Opioides.

e) Inibidores da fosfodiesterase-5.

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

992. (IBFC/2017/EBSERH)

O mês de Novembro é internacionalmente dedicado às ações relacionadas:

a) Ao câncer de mama masculino

b) À prevenção do suicídio

c) À impotência sexual e à saúde do homem

d) Ao câncer de pele

e) Ao câncer de próstata e à saúde do homem

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

993. (IBFC/2017/EBSERH)

Sobre a cultura de segurança, descrita na Política Nacional de Segurança do Paciente, assinale a alternativa correta:

a) Cultura que prioriza as metas financeiras e operacionais acima de segurança.

b) Comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.

c) Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares.

d) Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.

e) Promoção de processos de capacitação de gerentes, profissionais e equipes de saúde em segurança do paciente.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

994. (IBFC/2016/EBSERH)

Segundo a Portaria nº 529, de 01/04/2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), adota como definição de _____, a aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Acidente
- b) Segurança do paciente
- c) Dano
- d) Gestão de risco
- e) Evento adverso

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

995. (IBFC/2017/EBSERH)

As doenças do aparelho digestivo relacionadas, ou não, ao trabalho estão entre as causas mais frequentes de absenteísmo e de limitação para as atividades sociais e ocupacionais. Sobre este assunto, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

I. Entre os fatores importantes para a ocorrência das doenças digestivas relacionadas ao trabalho estão agentes físicos, substâncias tóxicas, fatores da organização do trabalho, como estresse, situações de conflito, tensão, trabalho em turnos, fadiga, posturas forçadas, horários e condições inadequadas para alimentação.

II. O sistema digestivo é uma das portas de entrada dos agentes tóxicos no organismo e, apesar de mais vulnerável do que o trato respiratório, não apresenta papel essencial no metabolismo e excreção da substância tóxica.

III. Síndromes gastrointestinais graves podem decorrer da intoxicação por fósforo, arsênio e mercúrio, manifestando-se por vômito, cólica e evacuações mucosanguinolentas, podendo ser acompanhadas por danos hepáticos irreversíveis.

IV. Condições de fadiga física patológica, trabalho muito pesado, trabalho em turnos, situações de conflito e de estresse, exigências de produtividade, controle excessivo e relações de trabalho despóticas podem desencadear quadros de dor epigástrica, regurgitação e aerofagia, diarreia e, mesmo, úlcera péptica.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV
- b) I e IV, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I, III e IV, apenas
- e) I e III, apenas

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

996. (INSTITUTO AOCP/2015/EBSERH)

Paciente, 44 anos, masculino, raça negra, deu entrada no PA referindo fraqueza, perda de peso gradual, fezes líquidas com frequência. No momento apresenta-se icterício, abdome ascítico, hipotensão e demais SSVV estáveis. Refere ser tabagista e etilista há muitos anos. Qual é o provável diagnóstico?

- a) HDB.
- b) HDA.
- c) Icterícia.
- d) Cirrose Hepática.
- e) DM.

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

997. (2018/ CESPE/ EBSERH)

No que concerne a diabetes melito, julgue o item seguinte.

Recomenda-se a pessoas portadoras de diabetes melito do tipo II e usuárias de anti-diabéticos orais a monitorização da glicemia capilar três ou mais vezes ao dia.

- c) certo
- e) errado

<input checked="" type="checkbox"/> TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO	<input type="checkbox"/> REFAZER ESSA QUESTÃO
<input type="checkbox"/> RELER O COMENTÁRIO	<input type="checkbox"/> ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

998. (2018/ CESPE/ EBSERH)

No que concerne a diabetes melito, julgue o item seguinte.

A glicemia pós-prandial é o teste recomendado para o diagnóstico de diabetes melito gestacional, por apresentar a melhor relação sensibilidade-especificidade.

- c) certo
e) errado

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

999. (2018/ CESPE/ EBSERH)

No que concerne a diabetes melito, julgue o item seguinte.

Os sinais e sintomas característicos que levam à suspeita de diabetes são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicável de peso.

- c) certo
e) errado

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

1000. (2018/ CESPE/ EBSERH)

No que concerne a diabetes melito, julgue o item seguinte.

O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos.

- c) certo
e) errado

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

1001. (2018/ CESPE/ EBSERH)

Julgue o próximo item, relativo ao controle e acompanhamento de pessoas com diabetes melito (DM) ou com intolerância a glicose.

Na rotina do Sistema Único de Saúde, recomenda-se que o manejo clínico do uso de insulina pela pessoa com DM do tipo 2 que necessite de múltiplas doses diárias seja prioritariamente realizado no ambulatório de especialidades.

- c) certo
e) errado

TENHO DOMÍNIO DO ASSUNTO REFAZER ESSA QUESTÃO
 RELER O COMENTÁRIO ENCONTREI DIFICULDADE PARA RESPONDER

1	C	50	C	93	C
2	C	51	E	94	D
3	C	52	C	95	A
4	C	53	E	96	A
5	B	54	C	97	B
6	E	55	C	98	A
7	C	56	C	99	B
8	E	57	C	100	C
9	C	58	E	101	A
10	C	59	C	102	D
11	C	60	E	103	C
12	E	61	E	104	A
13	E	62	C	105	C
14	C	63	E	106	A
15	E	64	C	107	A
16	C	65	E	108	B
17	E	66	C	109	B
18	C	67	E	110	C
19	E	68	C	111	B
20	C	69	C	112	E
21	E	70	E	113	C
22	E	71	C	114	A
23	E	72	E	115	B
24	E	73	E	116	E
25	C	74	E	117	C
26	C	75	C	118	C
27	C	76	C	119	D
28	E	77	C	120	C
29	C	78	C	121	D
30	E	79	C	122	D
31	C	80	E	123	D
32	C	81	C	124	C
33	E	82	D	125	A
34	E	83	E	126	E
35	E	84	E	127	B
36	E	85	A	128	D
37	E	86	C	129	E
38	E	87	D	130	C
39	E	88	C	131	C
40	C	89	C	132	E
41	C	90	C	133	C
42	E	91	E	134	E
43	E	92	A	135	C
44	E				
45	C				
46	C				
47	C				
48	E				
49	C				

136	C	192	B	248	D	304	C	360	E	416	E
137	E	193	A	249	A	305	A	361	D	417	E
138	D	194	E	250	D	306	B	362	B	418	E
139	C	195	A	251	C	307	B	363	E	419	C
140	D	196	E	252	A	308	E	364	C	420	E
141	B	197	C	253	C	309	D	365	A	421	C
142	A	198	A	254	E	310	C	366	D	422	E
143	D	199	C	255	E	311	C	367	C	423	C
144	A	200	A	256	C	312	A	368	A	424	C
145	A	201	D	257	E	313	E	369	C	425	A
146	D	202	A	258	C	314	A	370	C	426	B
147	E	203	A	259	E	315	B	371	E	427	C
148	B	204	A	260	A	316	E	372	C	428	D
149	C	205	D	261	B	317	B	373	B	429	B
150	A	206	A	262	E	318	C	374	D	430	A
151	A	207	C	263	E	319	B	375	C	431	D
152	D	208	B	264	E	320	B	376	E	432	C
153	B	209	C	265	D	321	D	377	C	433	A
154	B	210	A	266	D	322	B	378	C	434	C
155	E	211	D	267	C	323	A	379	C	435	C
156	A	212	E	268	C	324	A	380	C	436	C
157	A	213	E	269	B	325	D	381	C	437	C
158	E	214	C	270	B	326	E	382	E	438	E
159	E	215	C	271	E	327	A	383	E	439	C
160	C	216	E	272	C	328	D	384	C	440	B
161	A	217	C	273	D	329	D	385	C	441	E
162	E	218	E	274	C	330	B	386	C	442	C
163	A	219	C	275	C	331	A	387	B	443	B
164	E	220	C	276	A	332	C	388	B	444	D
165	D	221	C	277	A	333	D	389	A	445	B
166	A	222	E	278	E	334	D	390	E	446	C
167	A	223	C	279	A	335	C	391	A	447	B
168	C	224	E	280	D	336	E	392	C	448	A
169	B	225	C	281	B	337	E	393	A	449	E
170	E	226	C	282	E	338	C	394	B	450	D
171	E	227	E	283	D	339	C	395	D	451	B
172	C	228	C	284	A	340	D	396	C	452	C
173	E	229	E	285	A	341	E	397	D	453	C
174	C	230	D	286	C	342	B	398	E	454	D
175	E	231	A	287	A	343	B	399	C	455	E
176	C	232	D	288	C	344	A	400	B	456	C
177	E	233	C	289	B	345	B	401	C	457	A
178	C	234	B	290	B	346	E	402	C	458	E
179	C	235	B	291	B	347	D	403	E	459	C
180	C	236	D	292	D	348	E	404	C	460	C
181	E	237	D	293	B	349	A	405	D	461	D
182	C	238	C	294	B	350	C	406	C	462	E
183	C	239	A	295	A	351	B	407	D	463	B
184	E	240	A	296	D	352	E	408	B	464	D
185	C	241	A	297	E	353	B	409	E	465	A
186	E	242	D	298	A	354	C	410	C	466	E
187	E	243	C	299	D	355	D	411	A	467	D
188	C	244	E	300	E	356	E	412	D	468	E
189	E	245	E	301	B	357	C	413	A	469	B
190	C	246	A	302	D	358	A	414	C	470	E
191	E	247	D	303	E	359	C	415	C	471	E

472	D	528	D	584	A	640	E	696	B	752	B
473	B	529	A	585	A	641	D	697	A	753	A
474	B	530	B	586	D	642	E	698	C	754	C
475	D	531	C	587	D	643	E	699	E	755	A
476	E	532	D	588	D	644	D	700	A	756	B
477	C	533	A	589	D	645	D	701	B	757	D
478	A	534	C	590	B	646	D	702	A	758	E
479	B	535	B	591	B	647	C	703	A	759	C
480	E	536	C	592	A	648	D	704	D	760	E
481	C	537	A	593	B	649	A	705	E	761	E
482	B	538	D	594	A	650	E	706	D	762	C
483	E	539	B	595	C	651	B	707	E	763	E
484	A	540	E	596	B	652	C	708	A	764	D
485	A	541	B	597	B	653	D	709	D	765	C
486	C	542	E	598	A	654	E	710	D	766	A
487	C	543	C	599	C	655	B	711	C	767	B
488	D	544	B	600	E	656	B	712	A	768	A
489	A	545	D	601	B	657	B	713	D	769	A
490	D	546	A	602	B	658	B	714	A	770	D
491	A	547	C	603	C	659	D	715	B	771	A
492	A	548	E	604	E	660	A	716	A	772	D
493	B	549	A	605	E	661	B	717	C	773	B
494	B	550	B	606	C	662	D	718	D	774	B
495	C	551	B	607	C	663	A	719	D	775	A
496	D	552	C	608	C	664	C	720	B	776	C
497	A	553	A	609	C	665	E	721	C	777	B
498	E	554	D	610	C	666	D	722	A	778	A
499	B	555	C	611	E	667	C	723	E	779	E
500	B	556	D	612	E	668	A	724	C	780	D
501	D	557	E	613	D	669	B	725	E	781	B
502	A	558	B	614	E	670	D	726	A	782	B
503	A	559	A	615	E	671	B	727	E	783	C
504	D	560	C	616	A	672	A	728	A	784	A
505	C	561	C	617	D	673	E	729	A	785	A
506	D	562	A	618	A	674	E	730	D	786	C
507	C	563	D	619	B	675	E	731	C	787	B
508	A	564	D	620	C	676	D	732	C	788	A
509	C	565	A	621	B	677	C	733	E	789	C
510	E	566	C	622	B	678	E	734	A	790	A
511	C	567	D	623	C	679	C	735	A	791	B
512	A	568	E	624	E	680	A	736	B	792	C
513	C	569	E	625	A	681	C	737	A	793	A
514	B	570	A	626	C	682	E	738	D	794	D
515	B	571	D	627	B	683	B	739	E	795	D
516	C	572	A	628	E	684	C	740	A	796	E
517	C	573	A	629	D	685	C	741	D	797	D
518	B	574	D	630	C	686	B	742	A	798	B
519	E	575	D	631	B	687	A	743	B	799	B
520	A	576	A	632	B	688	C	744	A	800	B
521	E	577	D	633	B	689	B	745	B	801	B
522	A	578	C	634	B	690	B	746	E	802	B
523	C	579	B	635	E	691	C	747	A	803	C
524	C	580	C	636	C	692	C	748	A	804	B
525	E	581	B	637	D	693	A	749	C	805	A
526	A	582	B	638	D	694	B	750	D	806	A
527	E	583	A	639	D	695	E	751	D	807	E

808	C	864	A	920	E	975	E
809	C	865	B	921	E	976	B
810	A	866	B	922	C	977	B
811	D	867	C	923	E	978	E
812	B	868	A	924	A	979	D
813	E	869	E	925	C	980	C
814	A	870	D	926	B	981	B
815	B	871	C	927	A	982	A
816	D	872	A	928	C	983	B
817	D	873	C	929	E	984	D
818	D	874	A	930	B	985	A
819	E	875	A	931	E	986	D
820	E	876	A	932	C	987	E
821	A	877	B	933	E	988	C
822	E	878	C	934	A	989	D
823	D	879	B	935	C	990	B
824	A	880	E	936	B	991	E
825	C	881	C	937	C	992	E
826	C	882	C	938	E	993	C
827	B	883	A	939	C	994	D
828	A	884	B	940	A	995	D
829	B	885	C	941	B	996	D
830	C	886	C	942	D	997	E
831	B	887	B	943	D	998	E
832	A	888	B	944	B	999	C
833	E	889	B	945	A	1000	C
834	E	890	A	946	C	1001	E
835	A	891	B	947	A		
836	C	892	A	948	B		
837	B	893	B	949	A		
838	D	894	B	950	C		
839	A	895	E	951	A		
840	C	896	B	952	C		
841	C	897	D	953	E		
842	C	898	D	954	C		
843	C	899	A	955	C		
844	C	900	D	956	A		
845	B	901	C	957	B		
846	E	902	D	958	C		
847	E	903	D	959	D		
848	D	904	B	960	A		
849	A	905	A	961	C		
850	E	906	E	962	B		
851	E	907	C	963	C		
852	D	908	D	964	E		
853	A	909	B	965	C		
854	E	910	C	966	C		
855	C	911	C	967	C		
856	E	912	C	968	B		
857	A	913	A	969	B		
858	A	914	C	970	A		
859	A	915	E	971	B		
860	B	916	C	972	C		
861	D	917	C	973	E		
862	C	918	C	974	B		
863	E	919	C				



www.enfconcursos.com

EnfConcursos